

INSECTICIDA - ACARICIDA

GRUPO 3A

ENTREVERO EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

bifentrin: (2-metil(1,1-bifenil) - 3-il) metil 3 - (-2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato...... 10 g

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscripto ante el SENASA con el Nº 36.695

your alternative

Lote No:

Vencimiento:

NO INFLAMABLE

ORIGEN: ARGENTINA

Contenido Neto:

Atanor SCA. Albarellos 4914(B1605AFR) Munro – Prov. De Bs. As. Tel. 011 4721-3400 - Fax: 011 4721-3480 www.albaugh.com.ar

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo.



Banda toxicológica de color Amarillo

Rev. 02

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

ENTREVERO EC

Página 1 de 10 PLANTA SAN NICOLAS

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629) Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951







RECOMENDACIONES DE USO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

ENTREVERO EC es un insecticida-acaricida piretroide que actúa por contacto e ingestión y a muy bajas dosis. Controla insectos del orden de lepidópteros, homópteros, hemípteros y otros que atacan los cultivos agrícolas.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: ENTREVERO EC es un concentrado emulsionable, para su correcta aplicación debe ser aplicado en agua limpia. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la dosis requerida de ENTREVERO EC, de acuerdo con la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto se mezcle completamente.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final. Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la emulsión. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

IMPORTANTE: El sistema de retorno debe funcionar en todo momento. No mezclar los productos puros.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

ENTREVERO EC puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres convencionales o aéreos.

Equipos terrestres: Los caudales de agua de 100 a 200 litros por ha.

Equipos aéreos: 15 a 20 litros de agua por ha. Utilizar picos que garanticen una distribución uniforme del pulverizado (50-70 gotas por cm2).

Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de botalón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Se sugiere no pulverizar cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, cuando el viento sople hacia cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).

ENTREVERO EC Página 2 de 10 Rev. 02

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Calle 3 y 8 - (1629) Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, TE: +54 (230) 4496-263/683/685 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400


PLANTA PILAR

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS







RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda para lograr un uso óptimo del producto:

- Respetar dosis indicadas.
- Cobertura correcta.
- Respetar momento de aplicación.
- Usar pastillas de cono hueco para insecticidas pudiendo elegir entre las que ofrece el mercado.
- Respetar la presión de trabajo en función del flujo y tamaño de la gota producida recomendado por el fabricante.
- Lograr una cobertura correcta llegando a 50 a 70 gotas/cm2 y un C.V. de 50%.
- Evitar hacer pulverizaciones con vientos mayores a 10 km/h.

Consulte a un ingeniero agrónomo para calibrar correctamente el equipo.

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Duraznero	Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (myzus persicae)	10 cm ³ /hl	 a) Contra la hembra fundadora, en aplicaciones tempranas. Pulverizar en coincidencia con hinchazón de las yemas (se recomienda mojar muy bien, ya que los huevos de los cuales nace la hembra fundadora están ubicados en las yemas). b) Contra colonias establecidas. En primavera al observar los primeros ataques y preferiblemente antes del "enrulamiento" de las hojas.
Manzano	Acaro tejedor (tetranyhcus urticae) Arañuela roja europea (panonychus ulmi)	20 – 30 cm ³ /hl	Cuando se observen los primeros ataques con una población media de 4-5 ácaros por hoja. En caso de infestación severa usar la dosis mayor. Cuando el Bifentrin es empleado sistemáticamente para el control de la Carpocapsa siguiendo un programa integral de curas, las arañuelas y las chicharritas son simultáneamente controladas, manteniéndose las poblaciones de ambas plagas por debajo el nivel de daño económico. Esto por lo general permite reducir el número de tratamientos específicos contra ellas.

Rev. 02 **ENTREVERO EC** Página 3 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Calle 3 y 8 - (1629) Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, TE: +54 (230) 4496-263/683/685 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

PLANTA PILAR

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS







CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Manzano	Bicho canasto (oliketicus platensis)	20 cm ³ /hl	Cuando se observan las primeras larvas y no hayan superado el tercer estadío.
	Chicharritas (cercópidos)	20 cm³/hl	En caso de infestación severa usar la dosis mayor. Cuando el Bifentrin es empleado sistemáticamente para el control de la Carpocapsa siguiendo un programa integral de curas, las arañuelas y las chicharritas son simultáneamente controladas, manteniéndose las poblaciones de ambas plagas por debajo el nivel de daño económico. Esto por lo general permite reducir el número de tratamientos específicos contra ellas.
	Gusano de la pera y de la manzana (carpocapsa pomponella)	20 cm ³ /hl	Aplicación foliar siguiendo las indicaciones de los servicios de alarma o según vuelos de adultos caídos en trampas de feromonas, según indicaciones de sus fabricantes.
	Psílido del peral (cacopsyla pyricola)	20 – 30 cm ³ /hl	A la aparición de "mosquitas" o a la primera gota de "melaza". Aplicar usando gran volumen y buena presión.
Рара	Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (myzus persicae)	70 cm ³ /hl	Emplear no menos de 750 litros de líquido total por hectárea para asegurar una buena distribución, cobertura y mojado.

Rev. 02 ENTREVERO EC Página 4 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629) Parque Industrial Pilar - Buenos Aires TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS











CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Peral	Acaro tejedor (tetranychus urticae) Arañuela roja europea (paponychus olmi)	20 – 30 cm ³ /hl	Cuando se observen los primeros ataques con una población media de 4-5 ácaros por hoja. En caso de infestación severa usar la dosis mayor. Cuando el Bifentrin es empleado sistemáticamente para el control de la Carpocapsa siguiendo un programa integral de curas, las arañuelas y las chicharritas son simultáneamente controladas, manteniéndose las poblaciones de ambas plagas por debajo el nivel de daño económico. Esto por lo general permite reducir el número de tratamientos específicos contra ellas.
	Bicho canasto (oliketicus platensis)	20 cm ³ /hl	Cuando se observan las primeras larvas y no hayan superado el tercer estadio
	Chicharritas (cercópidos)	20 cm³/hl	En caso de infestación severa usar la dosis mayor. Cuando el Bifentrin es empleado sistemáticamente para el control de la Carpocapsa siguiendo un programa integral de curas, las arañuelas y las chicharritas son simultáneamente controladas, manteniéndose las poblaciones de ambas plagas por debajo el nivel de daño económico. Esto por lo general permite reducir el número de tratamientos específicos contra ellas.
	Gusano de la pera y de la manzana (carpocapsa pomponella)	20 cm³/hl	Aplicación foliar siguiendo las indicaciones de los servicios de alarma o según vuelos de adultos caídos en trampas de feromonas, según indicaciones de sus fabricantes.
	Psílido del peral (cacopsyla pyricola)	20 – 30 cm ³ /hl	A la aparición de "mosquitas" o a la primera gota de "melaza". Aplicar usando gran volumen y buena presión.

Rev. 02 ENTREVERO EC Página 5 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629) Parque Industrial Pilar - Buenos Aires TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS







CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Poroto	Chicharritas (cercópidos) Mosca blanca (bermicia tabaco)	60 cm ³ /hl	Cuando se observe la aparición de la plaga.
Soja	Chinche de la alfalfa (piezodorus guildinii), Chinche verde (nezara viridula)	160-180 cm³/hl	Cuando se observen 2 chinches por metro lineal de surco.
	Oruga de las leguminosas (anticarsia gemmatalis)	25-35 cm³/ha	Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y el grado de infestación. Antes de la floración con 15 isocas/m de surco y mas de 20% de defoliación.
	Trips del poroto (caliothrips phaseoli)	150 cm³/ha	Aplicar para reducir la población en R3 y R5 (mayor influencia sobre el rendimiento) cuando aparezcan 10 trips adultos por folíolo en la parte media de la planta. Repetir en caso de reinfestaciones.

RESTRICCIONES DE USO:

Período de carencia: Dejar transcurrir entre la última aplicación y cosecha de las partes comestibles los siguientes períodos: 45 días en soja, 30 días en poroto, 15 días en manzano y peral, 7 días en duraznero y papa.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada: Reingresar al área tratada una vez transcurridas 24 hs de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas, herbicidas de uso corriente, excepto con productos de reacción alcalina.

Sólo realice mezclas de tanque autorizadas, respetando el orden de mezcla que evite incompatibilidades físicas y/o químicas

Siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla en el tanque, ya que las dosis utilizadas, el número de productos, el uso de coadyuvantes y la calidad de agua influyen en la probabilidad de formación de precipitados.

Rev. 02 **ENTREVERO EC** Página 6 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Calle 3 y 8 - (1629) Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.

Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

PLANTA PILAR

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS





FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en las especies vegetales recomendadas y respetando las indicaciones de

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO **CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- PELIGRO, SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.

Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de ENTREVERO **EC** en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES:

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico. No contaminar fuentes o cursos de agua. No asperjar sobre espejos de agua, no eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en fuentes de agua. Establecer una franja de 50 metros entre cultivo tratado y la fuente de agua. Evitar la deriva.

Toxicidad para abejas: Altamente tóxico. Avisar a los apicultores previo a su aplicación. Si no pueden retirarse las colmenas, cerrar las piqueras durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar a primera hora de la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

ENTREVERO EC Página 7 de 10 Rev. 02







TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aquas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, alejadas de centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de aqua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional Nº 27.279, Decreto Reglamentario Nº 134/18 y normativas provinciales específicas."

LAVADO DE EQUIPOS:

Para el enjuague- lavado interno y externo del equipo de aplicación utilizado, una vez terminada la misma, debe utilizarse en todo momento el equipo personal de protección (EPP) adecuado según el riesgo.

Respetar las siguientes instrucciones:

Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. De estar disponible, usar una lavadora a presión para limpiar el interior del tanque. Llenar el tanque hasta 1/4 de su capacidad con agua limpia. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales

ENTREVERO EC Página 8 de 10 Rev. 02

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Calle 3 y 8 - (1629) Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, TE: +54 (230) 4496-263/683/685 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

PLANTA PILAR

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS







domésticos. Guardar en un lugar cerrado con llave. Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0 °C y sobre 35 °C.

DERRAMES:

Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado.

En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Beber y enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.

En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los parpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.

En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO (CLASE TOXICOLÓGICA II).

TOXICIDAD INHALATORIA: Categoría III (Cuidado).

IRRITACION DERMAL: LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO). CATEGORIA IV: Evitar el contacto con la piel y la ropa.

IRRITACION OCULAR: MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO). CATEGORIA III: Causa irritación moderada a los ojos.

No sensibilizante dermal.

Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Náuseas, vómitos, diarreas, eritema, diarrea, dolor abdominal, irritación ocular, irritación vías respiratorias.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

ENTREVERO EC Página 9 de 10 Rev. 02

CASA CENTRAL Munro Trade Center

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Calle 3 y 8 - (1629) Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, TE: +54 (230) 4496-263/683/685 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

PLANTA PILAR

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS







CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

CAPITAL FEDERAL: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA), Tel.: (011) 4962 2247/6666.

BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4469-9300 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.

ROSARIO: Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). Tucumán 1544. Tel.: (0341) 448 0077 / 424 2727 o 0800 888 TOXI (8694).

CORDOBA: Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No existen antecedentes de potenciación, sinergismo o aditividad.

Rev. 02 CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

ENTREVERO EC

Página 10 de 10 PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967. Calle 3 y 8 - (1629) Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914. Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires, TE: +54 (230) 4496-263/683/685 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850) Rio III - Córdoba TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

