

Herbicida

Grupo 14

MILENIAL SC

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

sulfentrazone:2',4'-dicloro-5'-(4-difluorometil-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-il)metanesulfonilida	50 g
solventes y coadyuvantes c.s.p.	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.



Inscrito ante el SENASA con el N° 39.103

Lote N°: Ver en el envase

Vencimiento: Ver en el envase

Contenido Neto:

Origen: ARGENTINA/CHINA

NO INFLAMABLE

Albarellos 4914
(B1605AFR) Munro – Prov. De Bs. As.
Tel. 011 4721-3400 – Fax: 011 4721-3480

www.albaugh.com.ar

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo.

Banda toxicológica de color: azul 293 Pantone



CUIDADO



Rev.03

MILENIAL SC

Página 1 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio
- (5850) Rio III - Córdoba
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

RECOMENDACIONES DE USO:

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: MILENIAL SC es un herbicida pre-emergente para las malezas y los cultivos. Pertenece al grupo de las "aril triazolinonas". Se absorbe por las raíces de las plantas tratadas, controlando a las malezas mediante el proceso de "disrupción" de membrana, que se inicia por la inhibición de la enzima protoporfirinógeno oxidasa, lo que interfiere en la biosíntesis de la clorofila, y genera la formación de intermediarios tóxicos. Las plantas que emergen del suelo tratado, se tornan necróticas y mueren al poco tiempo de estar expuestas a la luz.

Es selectivo para los cultivos de soja, maní, girasol, garbanzo, caña de azúcar y tabaco, aplicándose en presiembra del cultivo y malezas, controlándolas eficazmente.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR. **MILENIAL SC** es una suspensión concentrada que debe ser diluida en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la cantidad necesaria de **MILENIAL SC**, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto se disuelva completamente. En caso de aplicar en mezcla con Acetoclor o S-Metalocloro para el control de gramíneas incorporar el volumen requerido en este paso.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.
- **IMPORTANTE:** El sistema de retorno debe funcionar en todo momento. No mezclar los productos puros.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

MILENIAL SC debe ser aplicado con pulverizadoras terrestres con una presión de 30 - 45 lb/pulg², provistas de una barra o botalón con picos para herbicidas (abanico plano 8002, 11002). El volumen de aplicación debe ser de 100 - 150 litros de agua por hectárea. **Se debe lograr una cobertura mínima de 20-30 gotas/cm² sobre las hojas de las malezas.** Evite la deriva de producto sobre cultivos adyacentes. Evite la superposición durante la aplicación.

Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de botalón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Se sugiere no pulverizar cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, cuando el viento sople hacia cursos de agua y/o en

Rev.03

MILENIAL SC

Página 2 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).

RECOMENDACIONES DE USO:

Aplicación en Barbecho Químico: 30 a 60 días antes de la siembra del cultivo.

Aplicación en Pre-emergencia: El producto debe aplicarse inmediatamente después de la siembra y siempre antes de la emergencia de la maleza o el cultivo.

CULTIVOS	MALEZAS CONTROLADAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Girasol - Soja Barbecho Químico	Bejuco (<i>Ipomoea spp.</i>)	Suelos livianos (Arenoso, francos, o francos arenosos): M.O. ** menor 1%: 0,25 – 0,30 L/ha M.O. 1 a 2%: 0,30 L/ha M.O. mayor 2%: 0,35 L/ha	Aplicar hasta 30 días a 60 días antes de la siembra. Para el control de malezas presentes adicionar glifosato 64,5 % p/v SL (POWER PLUS II®) .
	Borraja pampeana (<i>Lycopsis arvensis</i>)		
	Bowlesia (<i>Bowlesia incana</i>)		
	Cardo ruso (<i>Salsola kali</i>)		
	Moco de pavo (<i>Polygonum persicaria</i>)		
	Morenita (<i>Kochia scoparia</i>)		
	Peludilla (<i>Gamochaeta subfalcata</i>)		
	Quínoa (<i>Chenopodium album</i>)		
	Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>)		
	Senecio (<i>Senecio sp.</i>)		
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)		
Vinagrillo (<i>Oxalis cordobensis</i>)	Suelos medianos (francos, francos limosos): M.O. 1 a 2%: 0,30 – 0,35 L/ha M.O. mayor a 2%: 0,40 L/ha	Las dosis están directamente relacionadas con las características de los lotes en que se utilizara el producto. Por ello se debe tener especialmente el cuenta el tipo de suelo, textura, cantidad de materia orgánica, pH, relieve	
Yuyo colorado (<i>Amaranthus quintesis</i>)			Usar dosis mayores en suelos de pH menores a 7.

CULTIVOS	MALEZAS CONTROLADAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Soja	Afata <i>(Sida rhombifolia)</i> Bejuco <i>(Ipomoea spp.)</i> Cebollín* <i>(Cyperus rotundus)</i> Chamico <i>(Datura ferox)</i> Chinchilla* <i>(Tagetes minuta)</i> Chufa* <i>(Cyperus esculentus)</i> Lecherón <i>(Euphorbia spp.)</i> Malva cimarrona <i>(Anoda cristata)</i> Quínoa <i>(Chenopodium album)</i> Verdolaga <i>(Portulacaceae oleracea)</i> Yuyo colorado <i>(Amaranthus quitensis)</i>	Suelos livianos: 0,8 L/ha Suelos medianos: 1,0 L/ha	Aplicar inmediatamente después de la siembra y siempre antes de la emergencia de la maleza o el cultivo.
Soja	Cebollín <i>(Cyperus rotundus)</i>	1,0 – 1,5 L/ha Utilizar las dosis menores para control de cebollín y las mayores para un programa de erradicación.	Siembra convencional y siembra directa con mediana o alta infestación de ciperáceas.
Girasol	Quinoa <i>(Chenopodium album)</i> <i>(Chenopodium pumilio)</i> Chamico <i>(Datura ferox)</i> Malva <i>(Anoda cristata)</i> Verdolaga* <i>(Portulacaceae oleracea)</i> Yuyo colorado <i>(Amaranthus quinesis)</i> Sanguinaria <i>(Polygonum aviculare)</i> Moco de pavo <i>(Polygonum persicaria)</i> Cardo ruso	Suelos Medianos: 0,40 L/ha Suelos Pesados: 0,50 L/ha	Aplicar inmediatamente después de la siembra y siempre antes de la emergencia de la maleza o el cultivo.

CULTIVOS	MALEZAS CONTROLADAS	DOSIS	OBSERVACIONES
	(Salsola kali) Bejuco <i>(Ipomoea rubiflora),</i> <i>(Ipomoea grandifolia)</i> Afata (<i>Sida rhombifolia</i>) Albahaca Silvestre <i>(Galinsoga parviflora)</i>		
Maní	Quínoa <i>(Chenopodium album)</i> Yuyo colorado <i>(Amaranthus quitensis)</i> Cardo ruso <i>(Salsola kali)</i> Verdolaga <i>(Portulaca oleracea)</i>	0,25 – 0,35 L/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo. Para el control de gramíneas anuales agregar, acetoclor 90% p/v EC (HAMET ATANOR®) o S-metolaclor 96% p/v EC (SYMPHONY®) a las dosis recomendadas para el cultivo. No utilizar el producto en variedades alto oleico. No aplicar mezclado con glifosato, dado que puede reducir el control de malezas por parte del glifosato.
Caña de azúcar	Afata <i>(Sida rhombifolia)</i> Bejuco <i>(Ipomoea rubiflora, I. grandifolia)</i> Cebollín* <i>(Cyperus rotundus)</i> Lecherón <i>(Euphorbia spp.)</i> Malva cimarrona <i>(Anoda cristata)</i> Quínoa <i>(Chenopodium album)</i> Verdolaga <i>(Portulaca oleracea)</i> Yuyo colorado <i>(Amaranthus quitensis)</i>	1,25 – 1,50 L/ha	Aplicar en pre-emergencia de maleza en mezcla con 2 l/ha de atrazina 50% p/v SC (TRAC 50 FL®) o S-metolaclor 96% p/v EC (SYMPHONY®) .

CULTIVOS	MALEZAS CONTROLADAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Garbanzo (variedades norteño y chañadito)	Quínoa <i>(Chenopodium album)</i> Sanguinaria <i>(Polygonum aviculare)</i> Cerraja <i>(Sonchus oleraceus)</i> Cerraja brava <i>(Sonchus asper)</i> Sorgo de Alepo semilla <i>(Sorghum halepense)</i>	Suelos medianos o Suelos pesados o alta M.O.: 0,8 - 1,0 L/ha	Aplicar previo a la siembra. Para el control de malezas presentes, adicionar herbicida o mezclas con acción de contacto de acuerdo a la recomendación de uso de la etiqueta.
Tabaco Tipo Virginia	Bejuco <i>(Ipomoea spp.)</i> Quínoa <i>(Chenopodium album)</i> Verdolaga <i>(Portulaca oleracea)</i> Yuyo colorado <i>(Amaranthus quitensis)</i>	0,6 - 0,8 L/ha	Post Aporque (inmediatamente después del último aporque, en aplicación dirigida a la trocha no tocar las plantas de tabaco). Si los antecedentes del lote son de alta presión de malezas utilizar la dosis mayor. Para el control de gramíneas se recomienda la mezcla con S-metolacloro 96% p/v EC (SYMPHONY®) . Volumen de aplicación 160 L/ha.

* Control parcial.

** M.O.: Materia Orgánica.

RESTRICCIONES DE USO:

Periodo de carencia: No posee. Uso posicionado.

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.”

Rev.03

MILENIAL SC

Página 6 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
 Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.
 Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
 Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
 TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
 - (5850) Rio III - Córdoba
 TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
 - (2900) San Nicolás - Buenos Aires
 TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

Tiempo de reingreso al área tratada: Reingresar al área tratada una vez que el producto se haya secado completamente de la superficie de las hojas.

Se recomienda dejar transcurrir un mínimo de 4 meses entre la aplicación de **MILENIAL SC** y la siembra de trigo, avena, cebada, y centeno. Si por algún motivo fuera necesario sembrar dentro de los 3 meses de aplicado el producto, se recomienda sembrar soja o girasol.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con mezclas de Acetoclor 90% p/v EC (**HAMET ATANOR**®), S-Metolacoloro 96% p/v EC (**SYMPHONY**®), Atrazina 50%p/v SC (**TRAC 50 FL**®), Glifosato (**POWER PLUS II**®; **POWER PLUS DRY**®; **GLIFOSATO ATANOR II**®). El presente producto presenta incompatibilidad manifiesta con ácidos y bases fuertes.

Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD:

A las dosis recomendadas no se presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados. En casos de condiciones ambientales severas, tales como lluvias excesivas o bajas temperaturas luego de la aplicación, pueden observarse leves síntomas de fitotoxicidad en el cultivo. Estos síntomas se manifiestan como ligera clorosis internerval, son completamente reversibles, y no afectan el rendimiento del cultivo.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

Rev.03

MILENIAL SC

Página 7 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Rio III - Córdoba
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manejo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **MILENIAL SC** en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES:

Toxicidad para aves: Producto prácticamente no tóxico.

Toxicidad para abejas: Producto virtualmente no tóxico.

Toxicidad para peces: Producto prácticamente no tóxico. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una franja de seguridad de no menos de 50 metros. No contaminar fuentes de agua cuando se elimina la misma por medio de la limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:

Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo ya tratado, sin riesgo para los cultivos recomendados, o bien sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, alejado de centros poblados y zonas de tránsito frecuente de personas.

Rev.03

MILENIAL SC

Página 8 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Rio III - Córdoba
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:

Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Para el caso de envases que no pueden ser lavados como por ejemplo bolsas y envases de papel o cartón, inutilizarlos de la misma manera, perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional N° 27.279, Decreto Reglamentario N° 134/18 y normativas provinciales específicas.”

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Guardar en un lugar cerrado con llave. Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.

DERRAMES:

Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

PRIMEROS AUXILIOS:

En todos los casos, procurar asistencia médica inmediata y mostrar esta etiqueta al médico interviniente. Llamar a los teléfonos que figuran a continuación para la atención de emergencias. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas de acuerdo a la vía de exposición:

En caso de inhalación: retirar a la persona afectada el aire fresco y requerir asistencia médica. Si es necesario, efectuarse respiración artificial.

En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón la superficie cutánea afectada y remover las ropas contaminadas.

En caso de contacto con ojos: lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

Rev.03

MILENIAL SC

Página 9 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio
- (5850) Rio III - Córdoba
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

En caso de ingestión: brindar asistencia médica de inmediato, llevando el marbete del envase, no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). IRRITACIÓN OCULAR: LEVE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA IV. No irritante dermal. No sensibilizante. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No presenta síntomas de intoxicación específicos.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA), Tel.: (011) 4962 2247/6666.

BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4469-9300 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.

ROSARIO: Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). Tucumán 1544. Tel.: (0341) 448 0077 / 424 2727 o 0800 888 TOXI (8694).

CORDOBA: Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200.

Rev.03

MILENIAL SC

Página 10 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio
- (5850) Rio III - Córdoba
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743