

INGREDIENTE ACTIVO	:	2,4-DB-butilo
NOMBRE QUIMICO	:	Éster butílico del ácido 4-(2,4-diclorofenoxy)butírico
GRUPO QUIMICO	:	Ácidos fenoxicarboxílicos
CONCENTRACION Y FORMULACION	:	93.1% p/v (931 g/L) EC (Concentrado Emulsionable)
MODO DE ACCION	:	Sistémico
FABRICANTE/FORMULADOR	:	Atanor S.C.A. Argentina
TOXICIDAD	:	Clase II. Producto moderadamente peligroso.
ANTIDOTO	:	No tiene antídoto específico conocido
AUTORIZACION S.A.G. N°	:	3484

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Venceweed Extra, es un herbicida post-emergente de acción sistémica para el control de malezas de hoja ancha que corresponden a las incluidas en el cuadro de instrucciones de uso. Se utiliza en praderas asociadas de forrajeras gramíneas con alfalfa o trébol.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo	Dosis L/ha.	Malezas Controladas	Observaciones
Alfalfa y trébol	1,0 – 1,5	Yuyo,	Aplicar cuando las leguminosas tengan 2 a 3 hojas trifoliadas y hasta la sexta hoja. No aplicar en floración.
Trigo asociado a tréboles	1,0 – 1,5	rábano, mostacilla, ortiga, chamico,	Aplicar cuando el trigo esté en estado de macolla y el trébol tenga 2 a 3 hojas trifoliadas. No pasar del estado del primer nudo del trigo y de la sexta hoja del trébol.
Maní	1	bledo, cardo,	Pulverizar cuando el cultivo tenga de 3 a 5 hojas verdaderas o 5 a 10 cm de altura
Praderas simples de cebadilla, pasto ovillo, festuca, rye grass, phalaris, cereales forrajeros, y/o asociadas con trébol rojo, blanco, ladino híbrido, lotera, alfalfa	1	bolsa del pastor, alfilerillo	Aplicar en macollaje de las gramíneas hasta encañado y en leguminosas con dos o tres hojas, excepto floración.

Soja	Menos de 0,05		No aplicar un volumen superior a 50 cm ³ /ha.
Establecimiento de praderas mixtas de: Trébol – ballicas, Trébol – pasto ovilla, Trébol – festuca	1,0 – 1,5		Aplicar en cualquier época, después de la macolla de las gramíneas y de haber pasado las leguminosas del estado 3 hojas trifoliadas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de Venceweed Extra necesaria, y agitando complete el volumen de agua necesario.

INCOMPATIBILIDAD: Venceweed Extra habitualmente no se usa en mezclas con otros pesticidas. Es incompatible con graminicidas específicos como Setoxydim o Fluazifop.

COMPATIBILIDAD: Es compatible en mezclas de tanque con Flumetsulam.

FITOTOXICIDAD: Venceweed Extra, puede ser fitotóxico en los cultivos recomendados si es aplicado en condiciones de estrés. No deja residuos en el suelo que afecten los cultivos posteriores, se degrada a las tres semanas de aplicado.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: : Para reingresar al área tratada dejar transcurrir 48 horas una vez realizada la aplicación. No se debe alimentar ganado hasta que hayan transcurrido 20 días después de efectuado el tratamiento.

PERÍODO DE CARENCIA:

Alfalfa y trébol	: 20 días
Trigo asociado con trébol rojo, blanco, ladino, híbrido	: 20 días.
Maní	: 20 días
Praderas de cebadilla, pasto ovilla, festuca, rye grass, phalaris, cereales forrajeros, y/o asociados con trébol rojo, blanco, ladino híbrido, lotera, alfalfa	: 20 días
Soja	: 20 días
Establecimiento de praderas mixtas de trébol – ballicas, trébol – pasto ovilla, trébol – festuca	: 20 días

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NOTA AL COMPRADOR: El producto ha sido sometido a estrictos controles de calidad durante su fabricación con lo cual se garantiza el porcentaje del Ingrediente Activo señalado en la etiqueta. Debido a que el almacenamiento, manipulación y aplicación del producto se escapan de nuestro control directo, cualquier responsabilidad por riesgos eventuales derivados del uso del producto, serán del usuario.

ALBAUGH CHILE LTDA.: (56 2) 2573 8768