

INGREDIENTE ACTIVO	: Clodinafop Propargil (*) + Cloquintocet mexil (**)
NOMBRE QUIMICO	: (*)Ariloxifenoxi propionatos + (**) Quinolinas.
GRUPO QUIMICO	: (*) (R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoropiridin-2-iloxi) fenoxi] propionato de Prop-2-inilo + (**) (5-cloroquinolin-8-iloxi) acetato de 1-metilhexilo
CONCENTRACION Y FORMULACION	: 24% (240 g/L) (*) + 6% (60 g/L) (**) EC (Concentrado Emulsionable)
MODO DE ACCION	: Sistémico, Selectivo
FABRICANTE/FORMULADOR	: Rotam India Ltd. India Jiangsu Rotam Chemistry Co., LTD. China
TOXICIDAD	: Grupo III. Producto poco peligroso
ANTIDOTO	: No tiene antídoto específico conocido
AUTORIZACION S.A.G. N°	: 3571

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Es un herbicida sistémico y selectivo, de post-emergencia, para controlar malezas gramíneas en cultivos de trigo, como se indica en el área de instrucciones de uso.

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Trigo	Avenilla (<i>Avena fatua</i>); Cola de Zorro (<i>Cynosurus echinatus</i>)	250 mL/ha	Aplicar después de la emergencia de las malezas. En malezas anuales, aplicar en primeros estados de desarrollo, en momentos de activo crecimiento, con temperaturas medias y buena humedad del suelo.
	Ballica (<i>Lolium spp.</i>); Hualcacho (<i>Echinochloa spp.</i>); Pasto cebolla (<i>Arrhenatherum elatius var. bulbosum</i>); Pasto quila (<i>Agrostis capillaris</i>); Pega-pegas (<i>Setaria spp.</i>); Tembladera o Tembladerilla (<i>Briza spp.</i>)	300 mL/ha	En malezas perennes, aplicar cuando éstas presenten un desarrollo foliar que permita una apropiada absorción del producto (inicios de macolla). Puede aplicarse en cualquier momento, a partir de las 3 hojas del trigo. Utilizar un mojamiento de 100-200 L/ha. Una aplicación por temporada.

USOS Y DOSIS APLICACIÓN AÉREA:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Trigo	Avenilla (<i>Avena fatua</i>); Cola de Zorro (<i>Cynosurus echinatus</i>)	250 mL/ha	Aplicar después de la emergencia de las malezas. En malezas anuales, aplicar en primeros estados de desarrollo, en momentos de activo crecimiento, con temperaturas medias y buena humedad del suelo. En malezas perennes, aplicar cuando éstas presenten un desarrollo foliar que permita una apropiada absorción del producto (inicios de macolla). Puede aplicarse en cualquier momento, a partir de las 3 hojas del trigo. Utilizar un mojamiento de 40-60 L/ha. Una aplicación por temporada.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada del producto, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando.

INCOMPATIBILIDAD: Evite mezclar con ácido fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes o reductores.

COMPATIBILIDAD: es compatible con otros fitosanitarios. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados siempre que se ocupe de acuerdo a lo indicado en esta etiqueta.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Para personas y animales, respete un período de 3 horas para ingresar al sector tratado.

PERÍODO DE CARENCIA: No tiene restricciones de carencia, por la época en que se aplica al cultivo.

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NOTA AL COMPRADOR: El producto ha sido sometido a estrictos controles de calidad durante su fabricación con lo cual se garantiza el porcentaje del Ingrediente Activo señalado en la etiqueta. Debido a que el almacenamiento, manipulación y aplicación del producto se escapan de nuestro control directo, cualquier responsabilidad por riesgos eventuales derivados del uso del producto, serán del usuario.

ALBAUGH CHILE AGROQUIMICA LTDA.: (56 2) 2573 8768