

INGREDIENTE ACTIVO	: Tebuconazole(*) + Carbendazima(**)
NOMBRE QUIMICO	: *(RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol **Bencimidazol-2-ilcarbamato de metilo
GRUPO QUIMICO	: Triazol / Bencimidazol
CONCENTRACION Y FORMULACION	: 12,5% (125 g/L) Tebuconazole (*) + 12,5% (125 g/L) Carbendazima(**) SC (Suspensión Concentrada)
MODO DE ACCION	: Sistémico, acción protectora y curativa
FABRICANTE/FORMULADOR	: Albaugh Asia Pacific LTD. - Hong Kong.
TOXICIDAD	: Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro.
ANTIDOTO	: No tiene antídoto conocido
AUTORIZACION S.A.G. N°	: 2691

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Es un fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicante, para ser usado en los cultivos indicados en la tabla de Instrucciones de Uso de esta etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicaciones terrestres

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Avena Trigo Cebada Centeno Triticale	Oídio (<i>Erysiphe graminis</i>), Mancha ocular (<i>Pseudocercospora sp.</i>), Rincosporiosis o escaldadura de la cebada, (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Septoriosis (<i>Septoria tritici</i>), Royas o polvillos (<i>Puccinia graminis</i> , <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Puccinia recóndita</i>), Helmintosporiosis (<i>Helminthosporium spp</i>)	1,0	Aplicar de preferencia en forma preventiva a fines de macolla o inicio de encañado y/o con la espiga recién expuesta. Máximo dos aplicaciones por temporada con intervalo de 15 días. Aplique con un volumen de 200 L/ha en las aplicaciones terrestres.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada del producto, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando.

En aplicaciones aéreas usar volumen de aplicación 40 L/ha

INCOMPATIBILIDAD: No es compatible con productos de marcada reacción alcalina.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 4 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: Puede producir fitotoxicidad en mezclas con herbicidas sulfonil ureas. No es fitotóxico cuando se usa según recomendaciones.

PERÍODO DE CARENCIA: 35 días para los cultivos indicados en las instrucciones de uso.



TANTOR

Ficha técnica

FUNGICIDA

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NOTA AL COMPRADOR: El producto ha sido sometido a estrictos controles de calidad durante su fabricación con lo cual se garantiza el porcentaje del Ingrediente Activo señalado en la etiqueta. Debido a que el almacenamiento, manipulación y aplicación del producto se escapan de nuestro control directo, cualquier responsabilidad por riesgos eventuales derivados del uso del producto, serán del usuario.

ALBAUGH CHILE LTDA.: (56 2) 2573 8768