



FERTILIZANTE ORGÁNICO POLVO

Elemento	% p/p
Materia Orgánica	45,0
Potasio	17,0

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

HAIGLO es un producto que está formulado a base de extracto de algas marinas (*Laminaria Japónica*) y potasio, de fácil absorción y efecto rápido, que facilitan la nutrición; así como, activa las funciones bioquímicas en las células para acelerar la fotosíntesis lo que repercute en el crecimiento y desarrollo de las plantas favoreciendo la obtención de mejores cosechas. Se recomienda su aplicación en aspersión foliar, durante el ciclo del cultivo y cuando se presenten condiciones de estrés por frío, sequía y/o lluvia.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo	Dosis Kg/ha Total de aplicaciones	Momento y modo de aplicación
Frutales, Vides y Parronales	Foliar: 1,8 kg/ha Suelo: 2 Kg/ha	Aplicación foliar: 4 aplicaciones de 450 gr/ha o 6 aplicaciones de 300gr/ha. Aplicar desde pre flor en adelante con un intervalo de 10 a 15 días. Aplicar con volumen de agua necesario para un buen cubrimiento del follaje tratado. Aplicación vía suelo: 4 aplicaciones o 6 aplicaciones respectivamente (respetando los 2 Kg/ha en total), aplicar desde preflor en adelante con un intervalo de 10 a 15 días. "No mezclar con calcio, silicio y cobre , solo mezclar en el caso que estos vengan quelatados".
Hortalizas de hoja, ají, pepino, zapallo, repollo, coliflor, melón, sandía	1,8 kg/ha	Aplicación foliar: 3 aplicaciones de 600 gr/ha o 4 aplicaciones de 450 gr/ha. Aplicar desde pre flor en adelante con un intervalo de 8



		a 10 días.
Papa	1,8 kg/ha	<p>Aplicación foliar:</p> <p>3 aplicaciones de 600 gr/ha o 4 aplicaciones de 450 gr/ha.</p> <p>Aplicar a los 65 días después de la emergencia con un intervalo de 8 a 10 días.</p>
Tomate	1,8 kg/ha	<p>Aplicación foliar:</p> <p>3 aplicaciones de 600 gr/ha o 4 aplicaciones de 450 gr/ha.</p> <p>Aplicar desde pre flor en adelante con un intervalo de 8 a 10 días.</p>
Cebolla	1,8 kg/ha	<p>Aplicación foliar: Realizar 3 aplicaciones:</p> <p>3 aplicaciones de 600 gr/ha o 4 aplicaciones de 450 gr/ha.</p> <p>Aplicar iniciando cuando la planta tenga 5 a 6 hojas verdaderas con un intervalo de 8 a 10 días.</p>

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal. Llenar el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad con agua. Agregar el producto a la dosis recomendada y agregar el agua restante hasta completar su capacidad y mantener en constante agitación. La mezcla deberá ser aplicada el mismo día.

INCOMPATIBILIDAD: Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos.

NO APLICAR EN DÍAS CALUROSOS O DE GRAN INSOLACIÓN.



LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NOTA AL COMPRADOR: El producto ha sido sometido a estrictos controles de calidad durante su fabricación con lo cual se garantiza el porcentaje del Ingrediente Activo señalado en la etiqueta. Debido a que el almacenamiento, manipulación y aplicación del producto se escapan de nuestro control directo, cualquier responsabilidad por riesgos eventuales derivados del uso del producto, serán del usuario.

Rotam de Chile Ltda.
(56-2) 2339152