PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Imidaclorpid pertenece al grupo químico de los Neonicotinoides. Se debe evitar su inhalación, el contacto con la piel, los ojos y las ropas. No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto. Lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo expuestas al producto luego de la manipulación, como así también la ropa utilizada. Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

Durante la manipulación utilice guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y protector facial. Durante la aplicación utilizar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y mascara con respirador. Mantener el producto en sus envases originales, bien cerrados, en locales secos y bien ventilados. No almacenar junto con alimentos ni piensos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMETENTE.

TÓXICO PARA ABEJAS, NO APLICAR EN FLORACIÓN.

Síntomas de Intoxicación: Puede ser peligroso si es ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel. La intoxicación aguda podría producir fatiga, contracción de músculos, calambres, debilidad muscular, disminución de la capacidad respiratoria.

PRIMEROS AUXILIOS: Para todos los casos que se presentan a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua limpia, por no menos de 15 minutos. Contacte a un médico. Si el afectado utiliza lentes de contacto, se debe lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 0 20 minutos. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uña y pliegues cutáneos. Contacte a un médico. **Ingestión:** Dar a beber jarabe de ipecacuana, o bien dos vasos de agua, e inducir el vómito introduciendo el dedo en la garganta. No inducir el vómito o dar nada por la boca a una persona inconsciente. Repetir el procedimiento hasta que el vómito fluya claro. Contacte a un médico. **Inhalación:** Alejar al paciente del área contaminada hacia un lugar fresco y ventilado. Mantenerlo en reposo. Contacte a un médico.

Tratamiento Médico de emergencia: Sintomático y de sostén. Los síntomas son similares a los de la intoxicación por nicotina. Revisar la presión sanguínea y el pulso frecuentemente, ya que es posible que ocurra bradicardia e hipotensión. Se requiere disponer de equipos de ayuda respiratoria y cardíaca. La otra medida terapéutica consiste en eliminar la sustancia del cuerpo, acelerando su excreción con lavado gástrico o laxantes salinos. La ingestión de leche o bebidas alcohólicas está contraindicada.

Información ecotoxicológica: Abejas: Altamente tóxico, pero por la forma de uso no las afecta. Aves: moderadamente tóxico. Peces y organismos acuáticos: Prácticamente no tóxico.

Teléfonos de Emergencia: RITA_CHILE: (2)2 661 94 14 / 22 777 19 94 Rotam de Chile Agroquímica Ltda: (2) 2 2339152

Nota de garantía: ROTAM DE CHILE AGROQUIMICA LTDA no se responsabiliza por los daños o perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto, diferente al indicado en este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera del control del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. El vendedor sólo garantiza las especificaciones físicas y químicas del producto, hasta el momento que se sustrae de su control directo.

PROTREAT® 70 WS

INSECTICIDA

POLVO DISPERSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS (WS)

PROTREAT® 70 WS es un insecticida de acción tóxica y por contacto, con muy alta eficacia por vía sistémica. Su función está destinada al tratamiento de semillas, protegiéndolas de diversos insectos presentes en el suelo. También protege a las plántulas del ataque de insectos foliares. Tal como se indica en el área de instrucciones de uso.

COMPOSICION:

Imidacloprid* 70% p/p (700 g/Kg)

Coformulantes c.s.p. 100% p/p (1Kg)

*1-(6-cloro-3-pridilmetil)-*N*-nitroimidazolidin-2-ilidenamina

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 1695

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ELPRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

Lote Nº:
Cont. Neto:.
Fecha Venc.:

Fabricado por:
Rotam Agrochemical Co. Ltd.
Unit 6, 26/F Trend Centre, No. 29
Cheung Lee Street,
Chai Wan, Hong Kong

Importado y distribuido por:
Rotam de Chile Agroquímica Ltda.
Providencia 2318 of 31, Providencia.
Santiago-Chile.

INSTRUCCIONES DE USO

PROTREAT® 70 WS es un insecticida sistémico, con acción por contacto y por ingestión. Es absorbido por las raíces, protegiendo las plántulas durante el primer estado de vida.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Ballica	Gusano blanco o Pololo verde del sur o San Juan verde *(Hylamorpha elegans)*	400g /100 Kg de semilla	Mezclar en seco con la cantidad de semilla por hectárea de siembra, o bien, en húmedo con 4 L de agua por cada 100 kg de semilla.
	Gusanos alambre *(Conoderus rufangulus);* Gorgojo argentino *(Listronotus bonariensis)*	600g /100 Kg de semilla	Mezclar en seco con la cantidad de semilla por hectárea de siembra, o bien, en húmedo con 4 L de agua por cada 100 kg de semilla.
Maíz	Gusano blanco o Pololo verde del sur o San Juan verde *(Hylamorpha elegans)*; Pulgones *(Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum maidis; Myzus persicae, Brachycaudus persicae, Siphum uphorbiae, Metopolophium dirhodum)*; Gorgojo argentino (*Listronotus bonariensis)*: *Delia spp;* Larvas de burrito.	500 a 750 g / 100 kg de semilla o bien de acuerdo a la densidad de siembra (0,0014 g/semilla): 110 g para 80.000 semillas 170 g para 120.000 semillas	Mezclar en húmedo con adecuado cubrimiento de la semilla. Agregar 0,8 L de agua por cada 100 kg de semilla. Utilizar la dosis mayor cuando el historial del potrero indique alta presión.
	Gusanos alambre (*Conoderus rufangulus)*	580 a 870 g / 100 kg de semilla, o bien de acuerdo a la densidad de siembra (0,0016 g / semilla): 128 g para 80.000 semillas; 192 g para 120.000 semillas	Mezclar en húmedo con adecuado cubrimiento de la semilla. Agregar 0,8 a 1,5 L de agua por cada 100 kg de semilla. Utilizar la dosis mayor cuando el historial del potrero indique alta presión.
Remolacha	Pulgón verde del duraznero *(Myzus persicae);* Langostino de la remolacha *(Paratanus exitiosus)*.	130 g por unidad de semilla monogérmica	Mezclar en proceso de peletización de semillas.
Trigo	Gorgojo argentino *(Listronotus bonariensis)*	100 g / 100 kg de semilla	Mezclar en húmedo con adecuado cubrimiento de la semilla: agregar 2 L de agua por cada 100 kg de semilla.
	(Hylamorpha elegans) Gusano blanco o Pololo verde del sur o San Juan verde *(Hylamorpha elegans)*	50 g / 100 kg de semilla	Mezclar en húmedo con adecuado cubrimiento de la semilla: agregar 2 L de agua por cada 100 kg de semilla.

PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: La dosis de PROTREAT® 70 WS puede aplicarse en seco o bien diluida en la cantidad de agua indicada en el cuadro anterior. En este caso se debe hacer la preparación en un recipiente adecuado, agitando hasta lograr una mezcla homogénea. Preparar sólo la cantidad que se utilizará en el día. No es conveniente dejar producto preparado de un día para otro. El tratamiento se deberá realizar con equipos específicamente diseñados al efecto. En caso de no contar con ellos se deberá recurrir un servicio externo de desinfección de semillas. **Las aplicaciones mediante el tradicional tambor rotativo, no son eficaces, por lo que no se recomienda este sistema.** En tratamiento húmedo, orear las semillas a la sombra y una vez secas sembrarlas. **COMPATIBILIDAD:** no se han experimentado mezclas. En caso que se desee hacer un tratamiento mixto, por ejemplo con un fungicida, se deberá realizar previamente una prueba de compatibilidad. **FITOTOXICIDAD:** No produce fitotoxicidad ni disminución del poder germinativo, cuando es utilizado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta. **TIEMPO DE REINGRESO:** dado que la aplicación se realiza a las semillas y estas van bajo la tierra, no corresponde establecer tiempo de reingreso para humanos ni animales. **PERIODO DE CARENCIA:** debido a la forma de aplicación, no corresponde establecer carencias.