

RUKARB® 85 WP

INGREDIENTE ACTIVO	Carbarilo
NOMBRE QUIMICO	Metilcarbamato de 1-naftilo
GRUPO QUIMICO	Carbamatos
CONCENTRACION Y FORMULACION	85% p/p WP (Polvo Mojable)
MODO DE ACCION	Contacto e ingestión
FABRICANTE/FORMULADOR	Ha Li Guixi Chemical – China
TOXICIDAD	Grupo II. Moderadamente peligroso.
ANTIDOTO	Sulfato de Atropina Las oximas como las 2-PAM están contraindicadas
AUTORIZACION S.A.G. N°	1702

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

RUKARB® 85 WP es un insecticida del grupo de los carbamatos, que actúa sobre los insectos por contacto e ingestión, con un adecuado efecto residual contra las plagas.

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*		ÉPOCAS DE APLICACIÓN*
		g/100L agua	kg/ha	
Manzano, peral, membrillero, nectarino, duraznero, damasco, ciruelo, cerezo, guindo, almendro, nogal, frambuesa, arándano	Polilla de la manzana, Grafolita, Langostinos, Gusano penachos Burrito, Trips, Eulia, Chape	100-180		Aplicar al aparecer los primeros individuos de la plaga en la canopia y con fruto formado. Mojar con 1000 a 2000 L/ha para frutales o con 500 a 800 L/ha para berries.
Vid	Burrito, Trips		1,8-2,0	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares, sobre el umbral de daño económico.
	Chanchito blanco		3,0-4,0	Espolvorear mezclado con azufre para favorecer su distribución.
Kiwi	Cuncunilla, Capachito de los frutales, Burrito, Trips	100-180		Aplicar al aparecer los primeros ejemplares. Repetir si es necesario. Mojar con 1500 a 2000 L/ha.
Ajo, cebolla, frejol, papa, tomate, pimentón, arveja, brócoli, lechuga, espárrago, coliflor, pepino, zapallo	Cuncunilla, Gusano del tomate, Langostino		1,5-2,0	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares. Repetir si es necesario.
Remolacha, maravilla, soya, raps	Cuncunilla, Gusano del tomate, Langostino		1,5-2,0	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares. Repetir si es necesario.

*Para todas las especies indicadas no realizar más de 2 aplicaciones por temporada.

**Si es necesario repetir la aplicación, debe transcurrir al menos 14 días entre las mismas.

RALEO:	g/100L de agua	
Manzano: Granny Smith, Royal Gala, Braeburn, Fuji, Richared-Starking	65 - 120	Aplicar cuando los frutos tengan un promedio de 7 a 11 mm de diámetro, según variedad.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque de la máquina a 1/3 o 1/2 de su capacidad. Poner el producto requerido, previa mezcla con agua en un balde de 20 a 50 L para agregar al estanque de la máquina con sus agitadores funcionando y luego completar la carga de agua.

Compatibilidad: No mezclar con sustancias de reacción alcalina. No utilizar con solventes aromáticos, en caso de utilizar aguas duras (pH>8), emplear buffer o corrector del pH del agua empleada. Para raleo, no utilizar en Granny Spur, en árboles de poco vigor, jóvenes o con cuaja escasa. No utilizar en floración por alta toxicidad a abejas.

Fitotoxicidad: No presenta a las dosis recomendadas y considerando las restricciones indicadas.

Tiempo de Reingreso: Las personas y animales no deben ingresar al área tratada antes de 24 horas de realizada la aplicación.

Periodo de Carencia (días): Frambueso, esparrago: 1; brócoli, coliflor, pimentón, tomate pepino, zapallo: 3; arándano: 5; papa: 7; peral, manzano, membrillero, damasco, durazno, nectarino, vid: 10; cerezo, guindo: 12; lechuga, almendro, nogal, remolacha: 14; ajo, cebolla, frejol: 15; soya, raps: 20; ciruelo, kiwi, maravilla: 60. En caso de productos cosechados para exportación atenerse a las regulaciones del país de destino.

RUKARB® 85 WP es Marca registrada de Rotam Chile Ltda.

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NOTA AL COMPRADOR: El producto ha sido sometido a estrictos controles de calidad durante su fabricación con lo cual se garantiza el porcentaje del Ingrediente Activo señalado en la etiqueta. Debido a que el almacenamiento, manipulación y aplicación del producto se escapan de nuestro control directo, cualquier responsabilidad por riesgos eventuales derivados del uso del producto, serán del usuario. Rotam de Chile Ltda. (56-2) 2339152