

## **RUKON DUST**

<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	a) Iprodiona; b) Azufre
<b>NOMBRE QUIMICO</b>	a) 3-(3,5-diclorofenil)-N-isopropil-2,4-dioxo-imidazolidin-1-carboximida; b) azufre
<b>GRUPO QUIMICO</b>	Dicarboximidaz + inorgánico
<b>CONCENTRACION Y FORMULACION</b>	a) 5,5% p/p; b) 88,3% p/p DP (Polvo Seco)
<b>MODO DE ACCION</b>	Contacto
<b>FABRICANTE/FORMULADOR</b>	NEW TECH AGRO S.A. – Chile
<b>TOXICIDAD</b>	Grupo IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro
<b>ANTIDOTO</b>	No tiene antídoto específico. Tratamiento N°18
<b>AUTORIZACION S.A.G. N°</b>	2630

### PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

**RUKON DUST** es un fungicida de contacto con acción preventiva, para el control de pudrición gris producida por *Botrytis cinerea* y pudrición ácida, causada por un complejo de microorganismos que incluyen bacterias, levaduras y hongos. Inhibe la respiración celular, altera la membrana celular y la actividad enzimática de los patógenos. Inhibe el desarrollo de las esporas mediante procesos oxidativos.

### INSTRUCCIONES DE USO:

#### Aplicaciones terrestres y aéreas

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (Kg/ha)	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Vides de mesa	Pudrición gris <b>Botrytis cinerea</b>	18	Aplicar vía espolvoreo en pinta y cosecha. Aplicar dos veces, con intervalos de 10 días.
Vides de mesa	Hongos del complejo de la pudrición ácida <b>Alternaria alternata, Cladosporium sp.</b> <b>Aspergillus sp. Mucor sp. Rhizopus sp. Pnicillium expansum y Botrytis cinerea.</b>	18	Aplicar vía espolvoreo, a partir de la pinta y en pre-cosecha. Aplicar dos veces por temporada con intervalos de 10 días.

**Precauciones:** No aplicar con viento fuerte ni con calor excesivo (sobre 25°C). Deben transcurrir tres semanas entre una aplicación de **RUKON DUST** y una aplicación de aceite o de un producto formulado como concentrado emulsionante (EC). El uso continuado y en múltiples tratamientos durante el ciclo de cultivo de ciertos fungicidas puede producir resistencia de las cepas del patógeno que se intenta controlar. Se sugieren no más de dos aplicaciones por temporada y alternar con fungicidas de otras familias químicas.

**Preparación de la mezcla:** No necesita preparación. Aplicar con un equipo convencional para aplicación de polvos secos, realizando un buen cubrimiento del cultivo.

**Compatibilidad:** Sólo es compatible con aquellos productos fitosanitarios de aplicación vía polvo. No aplicar en aplicaciones seguidas con productos alcalinos o fuertemente oxidantes. Incompatible con formetanate HCl y chinometionate.



**Fitotoxicidad:** No presenta, cuando se aplica de acuerdo a las instrucciones de uso.

**Tiempo de Reingreso:** 24 horas después de la aplicación.

**Periodo de Carencia (días):** Vides de mesa: 3. Carencia fijada para Chile. Para cultivos de exportación es necesario atenerse a las exigencias del país de destino.

**RUKON DUST** es Producto de Rotam Chile Ltda.

## LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**NOTA AL COMPRADOR:** El producto ha sido sometido a estrictos controles de calidad durante su fabricación con lo cual se garantiza el porcentaje del Ingrediente Activo señalado en la etiqueta. Debido a que el almacenamiento, manipulación y aplicación del producto se escapan de nuestro control directo, cualquier responsabilidad por riesgos eventuales derivados del uso del producto, serán del usuario. Rotam de Chile Ltda.  
(56-2) 2339152