

Rotulado para envases mayores o iguales a 1 Litro

SECCIÓN II



XSTRATA[®]

250 SC

**FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSION CONCENTRADA - SC**

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Azoxystrobin: **250 g/L**
methyl (E)-2-[[2-[[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]piperidin-1-yl]ethoxy]ethoxy]acrylate
Formulación a 20°C

Ingredientes Aditivos: **c.s.p. 1 Litro**



**Registro Nacional ICA No. 0625
Titular del Registro: ROTAM AGRO COLOMBIA SAS.**

CONTENIDO NETO:

Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.
No. 88 Rotam Rd, ETDZ, Kunshan, Jiangsu,
215301 China. www.rotam.com.

Importado y Distribuido por:
ROTAM AGRO COLOMBIA SAS.
Carrera 22 No. 98 - 82, ofi. 703
Tel: 486 1900. Bogotá D.C. – Colombia



III
CATEGORÍA

CUIDADO
Ligeramente Peligroso

III
CATEGORÍA

Rotulado para envases mayores o iguales a 1 Litro

SECCIÓN II



XSTRATA[®]
250 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Azoxystrobin: **250 g/L**
methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]propanoate
Formulacion a 20°C

Ingredientes Aditivos: **c.s.p.** **1 Litro**



Registro Nacional ICA No. 0625
Titular del Registro: ROTAM AGRO COLOMBIA SAS.

CONTENIDO NETO:

Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Formulado para:
ROTAM AGRO COLOMBIA SAS.
Por ADAMA ANDINA B.V. Sucursal
Colombia, Zona Franca Barranquilla.

Distribuido por:
ROTAM AGRO COLOMBIA SAS.
Carrera 22 No. 98 - 82, ofi. 703
Tel: 486 1900. Bogotá D.C. – Colombia



III
CATEGORÍA

CUIDADO
Ligeramente Peligroso

III
CATEGORÍA

Rotulado para envases mayores o iguales a 1 Litro

SECCIÓN II



XSTRATA[®]
250 SC

**FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSION CONCENTRADA - SC**

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Azoxystrobin: **250 g/L**
methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]piperidin-1-yl]propanoate
Formulación a 20°C

Ingredientes Aditivos: **c.s.p. 1 Litro**



**Registro Nacional ICA No. 0625
Titular del Registro: ROTAM AGRO COLOMBIA SAS.**

CONTENIDO NETO:

Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Formulado para:
ROTAM AGRO COLOMBIA SAS.
Por Laboratorios Chalver de Colombia S.A.
Km 4 via Mosquera - La Mesa, Cundinamarca

Distribuido por:
ROTAM AGRO COLOMBIA SAS.
Carrera 22 No. 98 - 82, ofi. 703
Tel: 486 1900. Bogotá D.C. – Colombia



III
CATEGORÍA

CUIDADO
Ligeramente Peligroso

III
CATEGORÍA

SECCIÓN I

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS Y ALIMENTOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

**PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).
CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS**

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas. El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas y guantes.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

No almacenar en casas de habitación. Almacenar el producto en el envase original etiquetado y cerrado alejado de alimentos y medicinas para uso humano o veterinario, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). No almacenar transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

No han sido determinados síntomas específicos de intoxicación. **“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela esta etiqueta y/o la hoja informativa adjunta”**

El ingrediente activo de este producto pertenece al grupo de las estrobirulinas.

NO INDUZCA EL VOMITO. “En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.”

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Antídoto: No existe antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático

**TELEFONOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 24 HORAS AL DÍA:
Derrames, fugas, incendios, explosiones, intoxicaciones (CISPROQUIM):
A nivel nacional 01 8000 916012, en Bogotá 288 6012
Rotam Agro Colombia SAS. 486 1900**

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

Este producto es moderada a altamente toxico a organismos acuáticos. Evitar contaminar con **XSTRATA® 250 SC** y sobrantes del producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.


Tenga en cuenta la franja de seguridad de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicaciones aéreas distantes de cuerpos de agua, carreteras, personas, animales y otros cultivos.

En caso de derrame, recoja con materiales inertes absorbentes, y elimine de acuerdo con lo establecido por la autoridad local competente.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE REUTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO. ENTREGUE O DEPOSITE EL ENVASE EN EL LUGAR DE DESTINO DISPUESTO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA SU GESTIÓN.

Fecha de aprobación ICA: DD/MM/AA



SECCIÓN III

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

XSTRATA® 250 SC es un fungicida con características protectantes, curativas, y erradicantes de amplio espectro de control, con efecto sistémico translaminar. Actúa inhibiendo la respiración mitocondrial en los hongos, impidiendo la producción y germinación de las esporas y el crecimiento del micelio.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS	P.C.	P.R.
Aguacate	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp.	600 cc/Ha	3 días	4 horas
Arroz	Manchado del grano <i>Sarocladium orizae</i> , <i>Alternaria</i> sp, <i>Pyricularia</i> sp, <i>Rhynchosporium</i> sp, <i>Helminthosporium orizae</i> , <i>Cercospora orizae</i>	0.7 L/Ha	7 días	

Banano Tratamiento poscosecha	Pudrición de corona Complejo <i>Colletotrichum</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Thielaviopsis</i>	1.2 cc/L 300 ppm	0 días	0 horas
Rosa	Mildeo veloso <i>Peronospora sparsa</i>	1,2 cc/L.	N.A.	4 horas

*Se podrá ingresar al cultivo a aguacate dos (2) horas después de la última aplicación del producto, siempre y cuando exista previa autorización del agrónomo responsable y se utilicen los elementos de protección personal adecuados. **N.A:** No Aplica. **P.C: PERIODO DE CARENCIA:** Período transcurrido entre la última aplicación y la cosecha. **P.R: PERIODO DE REENTRADA:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACION: Aplicar como preventivo o al inicio de los síntomas de la enfermedad. Realizar una (1) aplicación en el cultivo. Aplicar en una (1) ocasión a los gajos de banano en poscosecha después de la cosecha y previo al empaque.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: **XSTRATA® 250 SC** puede ser aplicado en equipos aspersores autopropulsados y/o acoplados a tractores, equipos aéreos y también utilizando fumigadoras montadas en bestia o del tipo de nebulización. Seguir las recomendaciones de la etiqueta del producto acordes con los informes de pruebas de eficacia locales. Llenar el recipiente del equipo de aspersion hasta la mitad de su volumen y agregar la dosis de **XSTRATA® 250 SC**, agitar vigorosamente y completar el volumen a aplicar.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad en caso de duda al mezclar con otros productos. **XSTRATA® 250 SC** es compatible con el agualumbre usada comúnmente en la poscosecha en banano. **XSTRATA® 250 SC** no es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso. En caso de duda, se recomienda hacer una aspersion en una pequeña área del cultivo a tratar, para asegurarse que no ocurra fitotoxicidad.

MANEJO DE LA RESISTENCIA: Rotar siempre la aplicación del producto con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico. Se debe aplicar la dosis completa del producto, de acuerdo a lo indicado en esta etiqueta.

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas”.

