



PROCIMIFIN

FUNGICIDA – Registro N°: 115-F4/NA

Grupo Químico:	Dicarboximida (FRAC 2, E3).
Ingrediente Activo:	Procymidone
Concentración:	500 gramos por litro
Formulación:	Suspensión Concentrada - SC
Cat. Toxicológica:	III Ligeramente Peligroso
Formulador:	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTDA.
Modo de acción:	Procymidone: Afecta la kinasa de histidina activada por mitógeno, en la transducción de la señal osmótica.
Mecanismo de Acción:	Procymidone: Se trasloca por xylema, se absorbe por raíz y llega a hojas y flores. Controla Botrytis, Sclerotinia, Botrytis Cinerea y Alternaria de frutas, viñedos, hortalizas, ornamentales y otros.

GENERALIDADES

PROCIMIFIN® es un fungicida a base de Procymidone de actividad sistémica, inhibe la germinación de esporas y el crecimiento micelial de Botrytis y otros.

RECOMENDACIONES DE USO

PROCIMIFIN® ser utilizado mezclado con agua, aplicado a campo abierto o bajo invernadero, siguiendo las dosis de aplicación recomendadas en este documento.



ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Época y frecuencia de aplicación. Realizar una sola aplicación por campaña año al inicio de los síntomas en el cultivo.

Volumen de aplicación. Se recomienda usar equipos de aplicación en buen estado operando a parámetros conocidos y presión regulada que permitan realizar control de la dosis real aplicada garantizando óptima cobertura y penetración de gotas.

Selectividad y compatibilidad. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso y aplicación dadas por el fabricante. En caso de mezcla con productos en la que no se conozca su selectividad al cultivo y/o compatibilidad de mezcla, recomendamos bajo responsabilidad del usuario realizar una prueba a pequeña escala, antes de la aplicación comercial.

DOSIS POR CULTIVO

CULTIVO	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 ml/l

*Gasto de agua: en rosa 600 l/ha, en banano 60 l/ha; en cacao 400 l/ha; en arroz 300 l/ha.

PERÍODO DE REINGRESO AL AREA TRATADA

Período de reingreso después de la aplicación: 24 horas después de aplicado.

COMPATIBILIDAD

PROCIMIFIN® es compatible con la mayoría de insecticidas y Fungicidas del mercado, sin embargo, en caso de mezcla con productos en la que no se conozca su selectividad al cultivo y/o compatibilidad de mezcla, recomendamos bajo responsabilidad del usuario realizar una prueba a pequeña escala, antes de la aplicación comercial.



FITOTOXICIDAD

Usado a las dosis recomendadas en este documento no presenta ningún daño en el cultivo tratado.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.”

*Elaborado por:
Departamento Técnico ROTAM ECUADOR.
2021.*

