

285mm

12mm

12mm

AGFAN

Indoxacarb 14.5% SC

Systemic and
Contact Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Indoxacarb (a.i.): 14.50% w/w, Inactive enantiomer: 6.00% w/w, Amorphous silicon dioxide: 7.00% w/w, Polyethoxylated polyaryl phenol: 9.00% w/w, Polyethoxylated polyaryl phenol phosphate: 6.00% w/w, Distilled Methyl Soyate: 57.50% w/w, **Total: 100.00% w/w. Crop and Insect Group:** It is a broad spectrum contact and stomach insecticide used for the control of Diamond back moth of Cabbage, Fruit borer of Chilli & Tomato, Bollworm of cotton, and Pod borer complex of Pigeon pea. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals' food. 2. Avoid contact with mouth, eyes, and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** Please read enclosed leaflet before use. **Symptoms:** Please read enclosed leaflet before use. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

अगफान

इंडोक्साकार्ब १४.५% एससी

अंतर्प्रवाही एवं
स्पर्शीय कीटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: इंडोक्साकार्ब (सक्रिय तत्व): १४.५०% भार/भार, निष्क्रिय तत्व : ६.००% भार/भार, अमोर्फस सिलिकॉन डाइऑक्साइड: ७.००% भार/भार, पॉलीएथोक्सीलेटेड पॉलीएराइल फिनॉल: ९.००% भार/भार, पॉलीएथोक्सीलेटेड पॉलीएराइल फिनॉल फोस्फेट: ६.००% भार/भार, डिस्टिल्ड मिथाइल सोयेट: ५७.५०% भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार. **फसल एवं कीट समूह:** इंडोक्साकार्ब १४.५% सान्ध घोल एक संपर्क व पेट में अस्तर करने वाला कीटनाशक है जो पत्तागोभी के हीरा पीठ पतंगा, मिर्च और टमाटर के फल छेदक, कपास के डोडे की सुडी, तुर के फली छेदक समूह पर लगने वाले कीटों पर पर्णय चिड़काव पर प्रभावकारी है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचावें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें। **लक्षण:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें। **सावधानियां कथन:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्वी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्वी देखें।

अगफान

इंडोक्साकार्ब १४.५% एससी

अंतर्प्रवाही एवं
स्पर्शीय कीटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: इंडोक्साकार्ब (सक्रिय तत्व): १४.५०% भार/भार, निष्क्रिय तत्व : ६.००% भार/भार, अमोर्फस सिलिकॉन डाइऑक्साइड: ७.००% भार/भार, पॉलीएथोक्सीलेटेड पॉलीएराइल फिनॉल: ९.००% भार/भार, पॉलीएथोक्सीलेटेड पॉलीएराइल फिनॉल फोस्फेट: ६.००% भार/भार, डिस्टिल्ड मिथाइल सोयेट: ५७.५०% भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार. **फसल एवं कीट समूह:** इंडोक्साकार्ब १४.५% सान्ध घोल एक संपर्क व पेट में अस्तर करने वाला कीटनाशक है जो पत्तागोभी के हीरा पीठ पतंगा, मिर्च और टमाटर के फल छेदक, कपास के डोडे की सुडी, तुर के फली छेदक समूह पर लगने वाले कीटों पर पर्णय चिड़काव पर प्रभावकारी है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचावें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें। **लक्षण:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें। **सावधानियां कथन:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्वी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्वी देखें।

अगफान

अगफान

AGFAN

Indoxacarb 14.5% SC

अगफान

इंडोक्साकार्ब १४.५% एससी

**INSECTICIDE**
कीटनाशक

Net Content 1 Litre

शुद्ध मात्रा १ लीटर



Regn. No.: CIR-228201/2022-Indoxacarb (SC) (442)-463

रजि. नं.: सीआईआर-२२८२०१/२०२२-इंडोक्साकार्ब (एससी)(४४२)-४६३

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :

M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पूर्व), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :

बैच नं. :

बैच नं. :

Mfg. Date :

उत्पादन तिथि :

उत्पादन तिथि :

Exp. Date :

समाप्त तिथि :

अधिकांश भारतीय तिथि:

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in Indian currency : ₹

अधिकतम खुदरा मूल्य

सभी करों सहित

भारतीय मुद्रा में : ₹

पंहुमां पधु रीटल किंमत

इसके साथै

भारतीय चलघमां : ₹

Unit sale price : ₹

Net Content 1 Litre

शुद्ध मात्रा १ लीटर

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours

पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.

सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।

For Agriculture Use Only.

केवल कृषि उपयोग के लिये।

Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 654 C

PANTONE 2012 C

'A' watermark 10% of base color

AGFAN® Indoxacarb 14.5% SC (Systemic and Contact Insecticide)

Indoxacarb 14.5% Suspension Concentrate is a broad spectrum contact and stomach insecticide effective as a foliar spray for the control pests of Cotton, Tomato, Chilli, Cabbage and Pigeonpea.

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	
		A.I. Formulation (gm)	Water (ml)		
Cabbage	Diamond back moth	30-40	200-266	400-750	7
Chilli	Fruit borer	50-60	333-400	300-600	5
Cotton	Bollworm	75	500	600-1000	16
Pigeon- pea	Pod borer complex	50-60	333-400	500-1000	15
Tomato	Fruit borer	60-75	400-500	300-600	5

Direction of Use:

P.P. Equipment: High volume spraying equipment, such as knapsack sprayer, rocking sprayer, foot sprayer etc.

Time of Application:

When pest population reaches to Economic Threshold Level(ETL).

Precaution:

- Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
- Avoid contact with mouth, eyes and skin.
- Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
- Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
- Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
- Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning:

Irritation of eye and upper respiratory passages and cough, lacrimation, blurred vision, redness, swelling or rashes on skin, neurotoxicity, loss of body weight and mild, reversible anemia may occur.

FirstAid:

- If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
- If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
- If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
- If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity:

Indoxacarb 14.5% SC is not phytotoxic at recommended dosage.

Antidote:

No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container:

- Empty containers shall be broken & buried away from habitation.
- The user should container or packages shall not be left outside to prevent their re-use.
- Packages or surplus material & washings should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
- Prयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोड़ें।

Storage Conditions:

- Do not store or consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material.
- Store the insecticide in its originals pack tightly closed, away from the reach of children irresponsible persons and livestock in a separate room, away from the used for storing foodstuffs, animals feeds and other articles under lock and key. The room or premises meant for storing shall be well-built, cool, dry, well-lit and ventilated and should be of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.
- Transport the insecticide in such a manner so as not to come in contact with foodstuff and animal feed.

Chemical Composition:	
Indoxacarb (a.i.)	14.50% w/w
Inertive enantiomer	6.00% w/w
Amorphous Silicon Dioxide	7.00% w/w
Polyethoxylated Polyaryl phenol	9.00% w/w
Polyethoxylated Polyaryl phenol phosphate	6.00% w/w
Distilled Methyl Soyate	57.50% w/w
Total:	100.00% w/w
Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label./Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.	

अगफान

इंडोक्साकार्ब 14.5% एससी
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

इंडोक्साकार्ब 14.5% एससी एक ब्रॉड–स्पेक्ट्रम संपर्क व पे्ट मे असर करने वाला कीटनाशक है जो कपास, टमाटर, मिर्च, पत्ताकोबी एवं तूर पर लगने वाले निम्नलिखित कीटों पर पर्णाय छिड़काव पर प्रभावकारी है।

उपयोग:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	
		A.I. Formulation (gm)	Water (ml)		
Cabbage	Diamond back moth	30-40	200-266	400-750	7
Chilli	Fruit borer	50-60	333-400	300-600	5
Cotton	Bollworm	75	500	600-1000	16
Pigeon- pea	Pod borer complex	50-60	333-400	500-1000	15
Tomato	Fruit borer	60-75	400-500	300-600	5

Direction of Use:

P.P. Equipment: High volume spraying equipment, such as knapsack sprayer, rocking sprayer, foot sprayer etc.

Time of Application:

When pest population reaches to Economic Threshold Level(ETL).

Precaution:

- Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
- Avoid contact with mouth, eyes and skin.
- Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
- Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
- Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
- Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning:

Irritation of eye and upper respiratory passages and cough, lacrimation, blurred vision, redness, swelling or rashes on skin, neurotoxicity, loss of body weight and mild, reversible anemia may occur.

विष के लक्षण:

आँखों तथा श्वसन प्रणाली के ऊपरी माग में जलन, आंसू आना, घुंघुला दिखना, त्वचा का लाल होना, सूजन या फफोले पडना, तंत्रिकाओं का प्रभावित होना, वजन में कमी आना और अल्पकालिक अनौमिया हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा:

- यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उलटी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उलटी न कराये।
- यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
- यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफ़ी मात्रा में सैलाइन /साफ पानी से लगसग 10–15 मिनट तक धोएं।
- यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविषाक्तता:

सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविषाक्त नहीं है।

विषनाशक:

कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

- कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़–फोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिये।
- प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोड़ें।
- डिब्बों या बची हुई कीटनाशक का धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीज़ें, पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्तें:

1. खाद्य व पेय पदार्थों तथा तम्बाकू को ऐसे स्थान पर भण्डारित न करें जहां वें विष द्वारा दूषित हो सकते हैं।

2. कीटनाशक को मुख्य डिब्बों में कस कर बन्द कर एक अलग कमरे में जो खाद्य पदार्थों पशु आहार तथा अन्य पदार्थों के भण्डारण वाले कमरों से दूर हो ताले के अंदर एवं बच्चों व गैर–जिम्मेदार व्यक्तियों तथा पशुओं की पहुँच से दूर रखें। कपास या गोदास जहां कीटनाशक रखा जाये अच्छा बना हुआ, ठण्डा, सूखा, प्रकाशमय व हवादार होना चाहिए जिससे सांस द्वारा प्रभाव न हो।

- कीटनाशक का परिवहन इस प्रकार करें कि खाद्य पदार्थ तथा पशु आहार के सम्पर्क में न जाये।

रासायनिक संरचना:

इंडोक्साकार्ब (सक्रिय तत्व)	14.50% भार / भार		
निष्क्रिय तत्व	6.00% भार / भार		
अमोर्फस सिलिकॉन डाइऑक्साइड	7.00% भार / भार		
पोलीथ्योक्सीलेटिड पोलीएराइल फिनोल	9.00% भार / भार		
पोलीथ्योक्सीलेटिड पोलीएराइलफिनोले फोस्फेट	6.00% भार / भार		
डिस्टिल्ड मिथाइल सोयेट	57.50% भार / भार		
कुल:	100.00% भार / भार		
सलाहनामक फसलों: 1. इस लेबल /लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार को बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्वी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउउसेंस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुयाक—पथी देखें।			

अगढान

इँडोक्साकार्ब 14.5% ऐससी
(अँउतर्प्रवाही अउे संपर्क कीटकनाशक)

इँडोक्साकार्ब 14.5% ऐससी इँक व्हाक एादिरे ढाला संपर्क अउे डेटे इँक असर करन ढाला कीटनाशक हँ नै क्वाप, टमाटर, मिर्च, घँडेरंगी अउे अरतर 'उे लँगट ढाले उँठे लिंघे कीटाँ 'उे ढादिहल डिइक्वां वँसँ असरदाऱ हँ।

ऐुपयँग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयेर मात्रा स.त. संरचना (गाम) (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)	
		स.त. संरचना (गाम) (मि.ली.)	मात्रा/लैव मात्रा (लीटर)	अँउम डिइक्वाँ अउे ढाहीं रदनिआन अँउराल (दिनाँ इँच)	
घँटेरंगी	डाँफिँडु घेक मेँघ	30-40	200-266	400-750	7
मिर्च	फल छेदक	50-60	333-400	300-600	5
कपास	डोडे की सूँडी	75	500	600-1000	16
तूर	फली छेदक	50-60	333-400	500-1000	15
टमाटर	ढल डेइक	60-75	400-500	300-600	5

इसउेडमाल टा निरदरघे:

पी पी ऐुपकरढः ऱाहीं ढाँलुइडुडुडु डिइक्वाँ अँउर, सिँवै हँ लैडसै सडुऐर, रॉकिंग सडुऐर, डुँट सडुऐर आदि।

इसउेडमाल टा सडाँ:

कीटाँ टी सँडिआ अरगविक रदिहलिंघांपर (टीटीऐले) उक पढुँउदिआँ ही।

इसउेडमाल करन ढाँडिआँ लडी सारुवाठीआँ:

- खट पीट टीआँ रींसाँ अउे ऐुनाँ दे खाली घरउन अउे ढडुआँ दे चारे उँ दुर रक।
- डुँठ, चमडी अउे अर्धँ दे डेउं उँ घघादि।
- डिइक्वाँ टी ड़ाड हँ साघ रगडी अँदर ऱा ढाड दीदि। ऱढाँ टी दिंसा दिच डिइक्वाँ करे।
- डिइक्वाँ दे घए दुडिस ऱकडे अउे सरीर दे ड़ागाँ डुँ रँगी उरुाँ डेँडे।
- डिइक्वाँ दे सडें एरकडल, खट पीटाँ अउे कूड ली चघाडुआँ ढडुाँ ही।
- डिइक्वाँ करन सडें सँ मिलाडुटे ढेले डुिरे सुरभिअँउ कपडे पादि।

स्रिउर दे लँडङः

अँधँ अउे साघ नली दे ऐुपरती ड़ाग इँच ढलन, रँडुआँऐुड़ा, डुँधला दिखडी देउा, चमडीं टा लाल ठेडा, सँडिस सँ डेँडड डेडा. उँडरिक्वाँ टा ड़ुड़ाडिउ ठेडा, सरीर टा ड़ाव ढटटाँ अउे डेँडुे सडें लडी अनीडीसाँ ही सकराँ ही।

6. फराणी करते डेकी सुरसा साघन कपडे घालावे.

मुकटाँ लडिउडसाँ:

- नेकर निगल लिआ ढाजे टां गले ढिँडि गुरदएली करडे ऐुलटी करदि ईदि क्वाँ ऐुदेँ टक दुगरऐुदे रडे ढदँ उक ऐुलटी दुआर निडला पढारघ सड्डना हँ ढाडे। नै मरींघडेस हडे टां ऐुलटी टा करदि।
- नेकर कपडे अउे ड़ुआ दुडिस हँ ढाडे टां दुडिस कपडे लउ दिदि अउे ड़ुआ हँ कढी मडटा इँच सघड अउे ढाटीं ढाल डेडे।
- नेकर अँधँ दुडिस हँ ढाड टां ऐुगनाँ हँ कढी मडटा इँच सेलाडीन/ सडढाटीं ढाल लउगडल 10-15 मिँट उक डेँडे।
- ने सग ढाल अँदर लिआ हडे टां रेगी हँ डुँघ ऱढा इँच लँ सँघ।

डेरस्रिदलीडपङ:

इँडोक्साकारघ 14.5% ऐससी टी ऐंसी गडी मडटा इसउेडमाल करन ढाल ड़मल 'उे मडा' असर नडी पेटा।

स्रिउर उँउः

वेडी धास स्रिउर उँउ नही। हँ लँडङाँ अढसा दिलास करे।

धॉली डँडिआँ टा निडटारः

1. स्रिउरडे हँ डुइडुआँ उँ घघाडिउ लडी डँडिआँ, घघे अउे डुँल.ढदरघ मडीनाँ टी डेहन अउ धाली डँडिआँ टा निडटारः सुरंधिअउ सडान 'उे डरे।

2. ऐुपयँग किडे गडे डँडे.पैढटा हँ घाऱ टा डङाँ दिंस उरुाँ ऐुनाँ टा दुघारा ऐुपयँग घराडिआ ढा सकराँ ही।

3. डेढेटा/डँडिआँ हँ उँउ-डेँउ वे अखडीं उँ दुर सडीन इँच गँघ दिदि।

उँडारः टीआँ स्रडउः

- डुराकी दसडाँ अउे पीट ढाले पढारक्वाँ अउे उँडावडुँ अमिदि सडान 'उे डँडारः टा करे सिंघि ऐुिद इस सडंगारी दे स्रिउर ढाल दुडिस हँ सकरे उँठ।
- कीटनाशक दे डँडिआँ हँ उँठ सडंगारी डुराकी दसडाँ दे डँडारः लडी इसउेडमाल टाडे ढाले कर्मिआँ नै इसडउाँ इँच सँ अलग उँ उराला घँद अलमारीआँ इँच रँडुआ चरडीाँ ही। अडेआँपिक्विड दिखअरडीं, ढाकरढा अउे घँडिआँ उँ दुर उँठे। कीटनाशकाँ दे डँडारः लडी ढरडे ढाड ढाले कढरे नै सडान मडसुड, डुँडे रेसडी ड़डपुड अउे ढदरदाँ उँडे चरडीाँ उँठ अउे ऐुगनाँ इँच कढी सडान हँटा चरडीाँ हँ उँ दि क्वाँ द्रडुडगणपडुड हँ उँठे।

- य। या उतपादनाच्या संपर्कात येऊन प्रदूषित होतील अशा भागांमध्ये साठवू नका किंवा तिथे खाऊ पिऊ आणिए धूस्रपाान करू नका.
- कीटकनाशकांचे डबे हे इतर सामुग्री किंवा खाण्यापिण्याच्या वस्तूनासून दूर ठेवावे आणि डबे बंद खोलीमध्ये व कुलुपबंद वेगळ्या आकारात ठेवावे. अनधिकृत व्यक्ति, पशु आणि मुलांपासून लांब ठेवा. कीटनाशकाक ठेवलेली खोली हवेशीर असावी त्यात मारपूर प्रकाश यावा, त्यात सूरप्रकाश असावा. जागा मोकळी असावी आणि ती प्रदूषणापासून दूर असावी.
- कीटनाशक टी छेपा-छेपाचीं इसा उरुाँ करे कि ऐिउ डुराकी दसडाँ अउे ड़मुघरे अउे सँधर इँच ऱा आऐे।

रसायनिक सँरचनः

इँडोक्साकार्ब (स्ररगडम उँउ)	14.50% ड़ार/ड़ार		
दिनऐक्टिव उँउ	6.00% ड़ार/ड़ार		
अमॉर्फस मिलिंकॉन आऐिऑक्साडिड	7.00% ड़ार/ड़ार		
पॅलीऐिधक्सासेलेटिड पॅलीअरगदिहल डिँठेले	9.00% ड़ार/ड़ार		
पॅलीऐिधक्सासेलेटिड पॅलीअरगदिहल डिँठेले डॉसफेट	6.00% ड़ार/ड़ार		
डिस्टिल्ड मिथील सोयेट	57.50% ड़ार/ड़ार		
कुलः	100.00% ड़ार/ड़ार		

डिउरदली: 1. लेखल अउे लीड्लेट 'उे सिंघर वीडीआँ ड़मस' अउे वीडीं उँ डँट विसे 'उे इसउेडमाल टा करे। 2. ढाडीं उँ घाऱदे दे इसउेडमाल टा ड़ेउरडे ढाड लडी नही। 3. इसउेडमाल उँ घाअट लीड्लेट 'उे इँडिे निरदरघे असर करुडे हँ ढाऱट वर दिदि। 4. पॅली ढाँडिस अउे घँद दिहारे लडी निरदरघाँ अउे मडटा लडी-लीड्लेट देघ।

Punjab	Marathi	Gujarati	Oriya	Tamil
--------	---------	----------	-------	-------

अफगान

इंडोक्साकार्ब 14.5% एससी
(आंत्रप्रवाही आणि संपर्क किटकनाशक)

इंडोक्साकार्ब 14.5% एससी सस्येन्शन कॉन्सन्ट्रेट हे एक व्यापक परिणामकारक संपर्क आणि पोटातून कृती करणारे कीटकनाशक असून कापूस, टोमॅटो, मिरची, पानकोबी आणि वाटणा यावरील किट्टींच्या नियंत्रणासाठी पानांवर फवारणी म्हणून उपयुक्त आहे.

वापराच्या पद्धति:

फसल	कीटकांचे सामान्य नांव	मात्रा /एवर ए.आय (ग्रॅ.)	रचना (मि.लि.)	पाण्यात पातळ करणे (लि.)	कापणी आणि रोवटच्या फवारणी मधील कालावधी (दिवसात)	
		मात्रा (ग्रॅ.)	रचना (मि.लि.)	पाण्यात पातळ करणे (लि.)	कापणी आणि रोवटच्या फवारणी मधील कालावधी (दिवसात)	
पानकोबी	डायमंड बॅक मोथ	30-40	200-266	400-750	7	
मर्या	फल छेदक	50-60	333-400	300-600	5	
कपास	ओंबवॉम	75	500	600-1000	16	
तुंबरे	पॉड ओरर ड्रॉम्बॅक्स	50-60	333-400	500-1000	15	
टाटाणा	शॉंगअळीचे प्रकार	50-60	333-400	500-1000	15	
टोमॅटो	फलमाशी	60-75	400-500	300-600	5	

वापरासाठी निर्देश:

पीक संरक्षक उपकरण: उच्च क्षमतेचे फवारणी यंत्र जसे नॅपसॅक स्प्रेयर, रॉकिंग स्प्रेयर, बूट स्प्रेयर इत्यादी.

वापरयाची वेळ:

कीटकांची राख्या आर्थिक नुकसानीच्या (इटीएल) स्तरावर पोचताच फवारणी करावी.

वापराणा-यानी घ्यावयाची काळजी:

- खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहारच्या दूर राखू.
- श्यासी-श्यास वाटे घेऊ नये त्वचेवर पडू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये.
- नेहमी हवेच्या दिशेने ही फवारणी करा. हवेच्या विरुद्ध दिशेने फवारणी करू नये. कारण फवाऱ्याचे शिंताळे आपल्या आंगावर उडू नये.
- प्रयोगानंतर लगेचच कपडे घुवा व स्नान करा.
- प्रयोग करतवेळी खाणे, पिणे धूस्रपाान करण तथा पान चघळणे इत्यादी करू नये.
- फराणी करत वेळी सुरसा साघन कपडे घालावे.

विषबाघेची लक्षणे:

डोळे आणि श्वसन मार्गांचा वरचा भाग यांचा दाह, आणि खोकला, डोळ्यातून पाणी, धूसर दूषित, लालसरपाणा, सूज किंवा त्वचेवर पुसळ, वेतासंस्थेची विषबाधा, शरीर वजन घटणे, सौम्य, परिवर्तनीय रक्ताल्पता उद्भवू शकते.

- गिळनं असल्यास, मानेवर थोपटून उलटी करावा. उलटीतून स्वच्छ पाणी पडतार्यंत असं पुन्हा पुन्हा करत रहा. रुग्ण बेहोशू असल्यास उलटी करवू नका.
- कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा मरपूर पाणी आणि साबणाेने स्वच्छ घुवा.
- डोळे दूषित झाल्यास मरपूर सलाईन /स्वच्छ पाण्याने सुमारे 10–15 मिनिट घुवा.
- शवासनावे आत गेल्यास रुग्णाला मोकळ्या हवेत व्हा.

फायटोटॉक्सिसिटी:

इंडोक्साकार्ब 14.5% एससी सूचनांप्रमाणे वापरल्यास रोपविषाक्त नाही.

विषनाशक:

कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

डबे खोखांची विल्हेवाट:

1. रिंकारी पॅकेजिंग फाऊन—तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.