

BOSFORUS™

**Profenophos 50% EC
Insecticide**

Chemical Composition : Profenophos AI. (Min. Purity 89%) 50.00% w/w, Vegetable Oil - 9.75% w/w, Poly Glycol Either (Alkyl aryl sulfonate Calcium Salt) 5.25% w/w, Soyabean Oil Epoxidised 3.00% w/w, Solvent C-9 to make Q.S, **Total 100.00% w/w.** **Direction for use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers & animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes & skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphionate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As such as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. Dissolve 1-2 gm. of 2 P.A.M. in 10 ml of distilled water & inject intravenously very slowly taking 10 to 15 minutes. **Recommendation :** It is recommended to control Ballworms, Jassids, Aphids, Thrips & White flies of Cotton Crops. Caution: Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

बोस्फोरस™

**प्रोफेनोफोस ५०% ई. सी.
कीटनाशक**

रासायनिक संघटन : प्रोफेनोफोस (म्युलतम शुद्धता ८९%) ५०.००% भार/भार, वनस्पति - तेल ९.७५% भार/भार, पॉली ग्लायकोल ईथर (अल्काइल एथाइल सल्फोनेट कैल्शियम साल्ट) ५.२५% भार/भार, सोयाबीन तेल एपॉक्साइड ३.००% भार/भार, धोलाकसी-९ पर्याप्त मात्रा, कुल १००.००% भार/भार. **उपयोग के लिये निर्देश :** उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचावें। ३) छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। ४) खाद्य की दिशा में छिड़काव करें। ५) छिड़काव के बाद दुर्गंधित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ६) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ७) छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक :** १. रोगी को तुरन्त एंटीबिोटिक और इन्सुलिन २ रस ५ मि.ग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्त शिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एंटीबिोटिक रखिए। एक दिन में एंटीबिोटिक सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मि.ग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एंटीबिोटिक सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बर्तक रहते ही जा सकती है। एंटीबिोटिक की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है। २. १ से २ ग्राम. २ पी.ए.एम १० मि.ली. असुर जल में घोलकर अन्त शिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे १० से १५ मिनट में देना चाहिए। **उपयोग :** इस कीटनाशक का उपयोग कपास फसल के डोंडे की सुन्डी गैला, माहु चुन्दा और स्पेन्ट मक्खी की रोकथाम के लिए किया जाता है। **चेतावनी :** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें. २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कटेज नष्ट करें. ४) पॉली हाउस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए-पत्रक देखें.

बोस्फोरस™

**प्रोथेनोडोस 50% ई.सी.
शुं तुनाशक**

घट 5 तत्वों: प्रोथेनोडोस (म्युलतम शुद्धता 89%) 50.00 % व/व, पेट्रोलेम ओयल 9.75 % व/व, पोलिक्लोथेनोलेन ईथर (अल्काइल अराइल सक्जोनेट डेसिक्थम साल्ट) 5.25% व/व, सोयाबीन तेल एपॉक्साइड 3.00% व/व, सोल्वेंट सी-9 पर्याप्त मात्रा, कुल 100.00% व/व. **उपयोग माटे निर्देश :** उपयोग करना पहले साथे आपे लु विडलेट वांयो. **प्रयोगकर्ताओं माटे सावधानी :** 1) पादपदाथी, पादपदाथीना पाली वासलों अने ठोरोना चारथी दूर राणो. 2) मों, त्वचा अने आंजलो सम्पर्कथी ज्वायो. 3) प्रयोग करती वज्जे स्व्यास झारा दवा अंदर न ज्य अने तेलुं ध्यान राणो, अने पवन नीं टीशा मां छंटाव डरो. 4) प्रयोग कर्यां पछी पक्षित कपडों अने शरीरना सारी शीते बुजो. 5) छंटाव वज्जे धुअपान, भावा, पीवातुं अने कसु खनवावतुं नंथ राणो. 6) प्रयोग करती वज्जे संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडों पहरो जेवाडे मोर्जा, जूडा, मास्क, रजड अेप्रोजन टोप वज्जे पहरेखा जेथे. **विषनाशक :** 1. एटीं ने तरतज अेप्रोजन नीं सावधान आपवनी अने 2 थी 4 मि. वि. आम 5 थी 10 मीलीट ना अंत्तरे नस मां सोय झारा लगातार आपता रहेतुं. अेड दिवस मां अेप्रोजिन सल्वेट नीं वधारे मां वधारे 25 थी 50 मी.ग्रा. मात्रा नीं जरूरत पछी सके छे. अेप्रोजिन सल्वेट नीं वधारे मात्रा एटीं नीं लसालुनसुर हावत जेथेअे आपी सज्वा. अेप्रोजिन नीं पुराड एटीं ना मोडा माथी लाड प्रमाणे आपी सज्वा. 2. 1 थी 2 ग्राम 2 पी. अे. अे. 10 मी. ली. डीटीएल पाली मां मेणनी नस झारा धीरे-धीरे 10 थी 15 मिनिट नीं समथ लागे ते शीते आपतुं. **उपयोग :** प्रोथेनोडोस ने मोठो पाथे अनेडिविध असर करतुं शुंवाजनाशक छे. कपासनीं सुशिया शुंवातो मोलेशी, लडलडीया, मधियो, सडेठ माामी अने शुंडवांनीं धथिजो ना निथंजरा माटे आना वपसानीं लवामरा डराथ छे. येतावापी : आ लेवल /पत्रिका पर दशांवाले क्षेत्र ते सिवायनीं डसलो पर वापरतुं नहीं. **सावधानीनुं निवेदन :** 1. लेवल अने पत्रकी पर उल्लेखित सिवायना पाड अने शुं तुजो पर उपयोग नहीं डरो. 2. लराछी पक्षत छंटाव माटे उपयोग नहीं करयो जेथेथे. 3. उपयोग पछी डवना पत्रकमां निर्देश अनुसार नाश करे. 4. पोलो हाईसीस अने नंधियार ज्वा माटे निर्देश अने मात्रा- पत्रक बुजो.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

बोस्फोरस

बोस्फोरस

BOSFORUS™
Profenophos 50% EC

बोस्फोरस
प्रोफेनोफोस ५०% ई. सी.



Net Content 1 Ltr.
शुद्ध मात्रा १ ली.



Regn. No. : CIR-228227/2022-Profenophos (EC) (442)-793
पंजी. नं. / रजि.नं.: सीआयआर-२२८२२७/२०२२-प्रोफेनोफोस (ई. सी.) (४४२)-७९३

Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / उ.ला.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanageri Marg, Kalina, Santacruz (E), behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता एवं विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मॉडल, विद्यानगरी मार्ग, कलाना, सांतक्रुज (पू.), विहाईड हांडा शोर्सम, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८.

Factory : G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.-Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत.

Batch No. / बैच नं. / जेथ नं.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख:

Exp. Date / समापन तिथि :
अवधि समाप्ति तारीख :
Maximum retail price ₹ :
inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित
वधुमां वधु शिटेल डिमेंट र :
इस्तेमाल साथे

Unit Sale price per ml

Net Content : 1 Ltr. शुद्ध मात्रा : १ ली.

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 18002008400, Email: contactin@rotam.com

TM-Trademark

Read enclosed leaflet before use.

Re-entry:

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

48 hours

उपयोग थी पहलेला संलग्न पत्रिका वांयो.

For agriculture use only. कृषि उपयोग के लिए।



