

Label 1Ltr (Size: 282mm x 140mm)

JASTER

Paclobutrazol 23% SC Plant Growth Regulator

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Paclobutrazol a.i.: 23.00% w/w, Alkylated Naphthalene sulphonate sodium salt: 3.00% w/w, Xanthan gum: 0.03% w/w, Sodium bentonite/Aluminium Silicate: 2.50% w/w, Polydimethyl siloxanes + silica: 0.3% w/w, Benzisothiazolin-3-one: 0.01% w/w, Propylene glycol: 5.00% w/w, Water: QS% w/w, **Total: 100% w/w. Crop group:** For use as a plant growth regulator in mango plant. For dosage and details, see enclosed leaflet. **Direction of Use:** Recommended for mature mangoes plant only (at least 7 years old). Take recommended quality of Paclobutrazol to be diluted in clean water of (5-10 litres) and applied in furrow 5 cm to 10 cm deep, about 30 cm away from the trunk. Fill up with soil after application or apply as soil-collar drench. Wear protective clothing, head dress and face mask. **Precautions:** 1. Keep out of the reach of the children. 2. Wear protective gloves when handling the concentrate. 3. Do not smoke, drink, or eat while using the product. 4. Wash concentrate from skin or eyes immediately. 5. Wash hands and exposed skin before meals and after work. 6. Do not contaminate ponds, water ways or ditches with chemicals or used container. 7. Keep in original container, tightly closed in a safe place. **Antidote:** Treat symptomatically. **First Aid:** Induce vomiting by trickling the back of throat. Medical treatment: If ingested give gastric lavage with care to prevent aspiration. **Symptoms:** Nervousness, anxiety, tremors convulsions and allergic manifestations. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

जरस्टर

पैक्लोब्यूट्राजोल २३% एससी पौध विकास नियंत्रक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: पैक्लोब्यूट्राजोल सक्रिय तत्व : २३.००% भार/भार, अल्काइलेटेड नेफथलीन सल्फोनेट सोडियम लवण: ३.००% भार/भार, बैन्थेन गॉद : ०.०३% भार/भार, सोडियम बेंटोनाइट / एल्यूमीनियम सिलिकेट: २.५०% भार/भार, पॉलीडाइमिथाईल सीलओक्सोमन+ सिलिका: ०.३% भार/भार, बेंजिसोथियाजोलिन-३-वन : ०.०१% भार/भार, प्रोपीलीन ग्लाइकोल: ५.००% भार/भार, पानी: पर्याप्त मात्रा भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। **फसल समूह:** आम में पौध विकास के लिए इस्तेमाल होता है। मात्रा एवं विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** केवल परिपक्व आमों के पौधों के लिए (कम से कम सात साल पुराने)। सिफारिश की गई पैक्लोब्यूट्राजोल की मात्रा को ५-१० लीटर साफ पानी में मिलाएं और तने से ३० सेमी दूर, ५-१० सेमी गहरी नाली खोद कर प्रयोग करें। प्रयोग के बाद मिट्टी से ढक दें या तने के चारों ओर अच्छी तरह से डालकर पूरी तरह भिगा दें। पूर्ण सुखात्मक वृक्ष पहले, सिर व मुंह को ढककर रखें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. बच्चों की पहुँच से दूर रखें। २. संग्रत द्रव्य का प्रयोग दुस्ताने पद्धत कर करें। ३. प्रयोग के समय धूम्रपान न करें और न ही कुछ खाये पीये। ४. रसायन को तबचा व आँखों पर से तुरंत धो दें। ५. प्रयोग के बाद और खुले से पहले हाथ और खुली तबचा को धो लें। ६. नालों तलाबों तथा पानी के स्त्रोतों को प्रयोग किए गए छाली डिब्बों और रासायनिक तत्व से दूषित न करें। ७. कौटनाशक को मूल डिब्बों में ही सुरक्षित जगह पर बंद कर दें। **विष नाशक:** लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** गले में उमली डालकर उल्टी कराएँ। यदि निगल गया हो तो अमाशय साफ करें (गेस्ट्रिक लावेंज)। ध्यान रखें कि बाहर आ रहे तत्व उच्छवास के साथ अन्दर न जा पायें। **लक्षण:** स्नायुदुर्बलता, व्यग्रता, कम एवं एलर्जी के लक्षण। **सावधानियां:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्वों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउस से और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्वी उखें।

जरस्टर

पैक्लोब्यूट्राजोल 23% एससी छोड़ विकास नियंत्रक

उपयोग करने में पहले बिल्डेटने काण्डपर्वक बांधें। रासायनिक संयोजन: पैक्लोब्यूट्राजोल सक्रिय तत्व : 23.00% भार/भार, आल्काइलेटेड नेफथलीन सल्फोनेट सोडियम मीठ : 3.00% भार/भार, बैन्थेन गॉद : 0.03% भार/भार, सोडियम बेंटोनाइट/एल्यूमिनियम सिलिकेट : 2.50% भार/भार, पॉलीडाइमिथाईल साइलैक्सोमन + सिलिका : 0.3% भार/भार, बेंजिसोथियाजोलिन-3-वन : 0.01% भार/भार, प्रोपलीन ग्लाइकोल : 5.00% भार/भार, पानी : पर्याप्त मात्रा भार/भार, कुल : 100.00% भार/भार. **काण्डपर्वक:** केरीना पाकमां छोड़ वृद्धि नियंत्रक तरीके उपयोग माटे. मात्रा अने विस्तार माटे साधेन बिल्डेटन जूअः उपयोग माटे ना निर्देशः आंभाना माटे छोड़ माटे जू अलाभाइ करवामां आवे छू (आंछामां आछी 7 वर्ष जूनी). पैक्लोब्यूट्राजोलनी अलाभाइ क्वां भूजनी मात्रा 5-10 लीटर साइ पाछीमां भेजवां अने बरछी 30 से.मी. दूर 5 थली 10 से.मी. छिडां अने काछां पौछीने तेनो उपयोग करे. उपयोग पछी तेनो माटीथी बांकी छे अथवा चारेबाजुथी तेनो बराबर बजुथी छे. सुरक्षात्मक क्वां, साधामां टोपी अने ड्रेस माइक पहरे. **वपराइकाइ माटे सावधानीआः** 1. बाणकानी पहरेथी दूर राखो. 2. आ रसायनको उपयोग करती वपने रबरनां (रक्षात्मक) हाथ-मोथां अवश्य पहरे. 3. आ रसायनको उपयोग करती वपने धूम्रपान करवानी के क्वां भावापीवाना मनाई छे. 4. आ रसायनने खाइती अने आंभो परथी तुरंत धोई नाभो. 5. उपयोग पछी अने भोजन पहरेवां हाथ अने भूखली खाइतीने बराबर धोई नाभो. 6. नाभा, तणाव अने जवाशयने वपराइमां बचावेल उल्हा अने रासायनिक द्रव्योथी दूषित न करे. 7. आ जंतुनाशकने भूज उल्हामां जू भूकीने बांछुं बराबर बंध करीने सुरक्षित जग्याने राखो. **विषनाशकः** वक्वो भूज साववार करे. **प्राथमिक साववारः** मांढामांथी गथा सूधी आंगणी नाभोने छेटी कराव. तभीनी साववारः जो जेर पेटमां नथुं होय तो आभासय साक (गेस्ट्रिक बवाइ) करे. बहाइ आवतनां द्रवो उच्छवासनी साथे अंदर न जाय अने वानुन भ्यान राखो. **जेरनां वक्वोः** स्नायुआंमां दुर्गमता, व्यग्रता, कंधारी अने अर्बेकांमां वक्वो. **बेवजुथीः** 1. वेवव अने बिल्डेटनमां द्रव्योथी होय तेनो बिवाधना पाक अने जवाव पर आ उन्हाइननां छेडाव (उपयोग) करवां न जेठईने. 2. कापलीवक्वोमां पछीना छेडाव माटे तेनो उपयोग करवां न जेठईने. 3. आ उन्हाइननां छेडाव (उपयोग) क्वां पछी भावी कंटेनरनो बिल्डेटमां जलाया भूजम नाइ करे. 4. पौथी हाउस तेमज कंठईउ विस्तार माटेनां सुखन अने मात्रा अनेनी जलकाइ माटे बिल्डेट बांधो.

जरस्टर

जरस्टर

JASTER®
Paclobutrazol 23% SC

जरस्टर

पैक्लोब्यूट्राजोल २३% एससी



**PLANT GROWTH
REGULATOR**
पौध विकास नियंत्रक

Net Content 1 Litre

शुद्ध मात्रा १ लीटर



Regn. No.: CIR-230082/2022-Paclobutrazol (SC) (442)-73

रजि. नं.: सीआईआर-२३००८२/२०२२-पैक्लोब्यूट्राजोल (एससी)(४४२)-७३

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :

M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,

१७५, कागलवाला हाउस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पूर्.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :

बैच नं. :

बैच नं. :

Mfg. Date :

उत्पादन तिथि :

उत्पादन तारीख :

Exp. Date :

समापन तिथि :

अवधि समाप्ति तारीख :

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in Indian currency : ₹

अधिकतम खुदरा मूल्य

सभी करों सहित

भारतीय मुद्रा में : ₹

वधुमां वधु शिखर डिमेंट

कंप्रेस साई

भारतीय युद्धमां : ₹

Unit sale price : ₹

Net Content 1 Litre

शुद्ध मात्रा १ लीटर

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours

पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.

सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।

For Agriculture Use Only.

केवल कृषि उपयोग के लिए।

Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 110 C

PANTONE 209 C

‘A’ watermark 10% of base color

[illegible]

PANTONE 209 C

'A' watermark 10% of base color

JASTER

Paclobutrazol 23% SC Plant Growth Regulator

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Paclobutrazol a.i.: 23.00% w/w, Aylkated Naphthalene sulphonate sodium salt: 3.00% w/w, Xanthan gum: 0.03% w/w, Sodium bentazonil/Aluminium Silicate: 2.50% w/w, Polydimethylsiloxanes + silica: 0.3% w/w, Benzisothiazolin-3-one: 0.01% w/w, Propylene glycol: 5.00% w/w, Water: 0.3% w/w, **Total: 100% w/w. Crop group:** For use as a plant growth regulator in mango plant. For dosage and details, see enclosed leaflet. **Direction of Use:** Recommended for mature mangoes only (at least 7 years old). Take recommended quantity of Paclobutrazol to be diluted in clean water of (5-10 litres) and applied in furrow 5 cm to 10 cm deep, about 30 cm away from the trunk. Fill up with soil after application or apply as soil-coulo drench. Wear protective clothing, head dress and face mask. **Precautions:** 1. Keep out of the reach of the children. 2. Wear protective gloves when handling the concentration. 3. Do not smoke, drink, or eat while using the product. 4. Wash contents from skin and eyes immediately. 5. Wash hands and exposed skin before meals and after work. 6. Do not contaminate ponds, water ways or ditches with chemicals or used container. 7. Keep in original container, tightly closed in a safe place. **Antidote:** Treat symptomatically. **First Aid:** Induce vomiting by trickling the back of throat. Medical treatment: If ingested give gastric lavage with care to prevent aspiration. **Symptoms:** Nervousness, anxiety, tremors convulsions and allergic manifestations. **Warnings:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

जस्टर

JASTER®

Paclobutrazol 23% SC

जस्टर

पैक्लोबूट्राजोल २३% एससी

Regn. No: CIR-23002/2022-Paclobutrazol (SC) (442)-73
 पं. नं.: सीआइएन-२३००२/२०२२-पैक्लोबूट्राजोल (एससी) (४४२)-७३
Manufacture Lic No: MLJDDP/2022-23/187 **उत्पादन लाइसेंस नं.:** एमएल/जेडीडीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By: M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagawala House, 2nd Floor, Vidyanagar Marg, Kalina, Sactacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098.
निर्माता और विक्रेता/निकाल: मे. रोटम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवा हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यानगर मार्ग, कलिना, साक्रास (ई), होंडा शो रूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८
Factory Address: G-195, RIICO Industrial Area, Sanawad - Fatehnagar, Mawal, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
उत्पादन पता: जी-१९५, रीको इंडिया एरिया, सनावद-फतेहनगर, मेवाड़, जिला उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत
For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 18003000335, Email: contact@gaubaahlic.com

जस्टर

पैक्लोबूट्राजोल २३% एससी

उपयोग से पहले संयोज लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संघटन: पैक्लोबूट्राजोल सक्रिय तत्व : २३.००% भार/भार, अल्कायल्लेटेड नेफथलिन सल्फोनेट सोडियम लवण: ३.००% भार/भार, जैन्थेन गम: ०.०३% भार/भार, सोडियम बेंटाडोन/ प्लुग्योनियम सिलिकेट: २.५०% भार/भार, पॉलीडिमैथिलसिलॉक्सन+सिलिका: ०.३% भार/भार, बेन्जिसोथिआज़ोलीन-३-ऑन: ०.०१% भार/भार, प्रोपीलीन ग्लायकोल: ५.००% भार/भार, पानी: ०.३% भार/भार, **कुल: १००.००% भार/भार। फसल समूह:** आम में पीध विकास के लिए इस्तेमाल होता है। माया एवं विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न निदेश पत्रक पढ़ें। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** केवल परिपक्व आमों के पीध के लिए (कम से कम सात साल पुराने)। सिफारिश की गई पैक्लोबूट्राजोल की मात्रा को ५-१० लीटर साफ पानी में मिलाएं और तने से ३० सेमी दूर, ५-१० सेमी गहरी नाली खोएं कर प्रयोग करें। प्रयोग के बाद मिट्टी में दब के ४ या तने के चारों ओर अच्छी तरह से डालकर पूरी तने लगा दें। पूर्ण सूर्यास्तकें बचने दें, तब से तने को डालने दें। **प्रयोग के समय धुंधलकें न करें और न ही बहुत धूप पीरें। १. सतह तब तक न छुएं जब तक कि तने पर औखें पर से दूत पीरें। २. प्रयोग के बाद ओर खाने से पहले हाथ और खुली त्वचा को धो लें। ३. पानी नाली खोएं तब पानी की कवलों को प्रयोग किए गए खुली डिब्बों और रासायनिक तत्व से दूधित न करें। ४. कीटनाशक को मूल डिब्बों में ही सुरक्षित जगह पर व दबन बंद कर रखें। **विष नाशक:** लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** गले में उंगली डालकर उल्टी करावा। यदि निगल गया हो तो आमाशय साफ करें (गैस्ट्रिक लॉवेंज)। ध्यान रखें कि बाहर आ रहे तत्व उच्छवास के साथ अंदर न जा पायें। **लक्षण:** स्नायुदबलता, ध्यान, कमचें एवं एलजी के लक्षण। **सावधानियां:** १. इस लेबर / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल को पैदावार के बाद दूध को प्रयोग न करें। ३. पृथी पर निर्दिष्ट डोज़के के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बों को नष्ट कर दें। ४. पॉलिथीन बैग और सोपिंग शेडों के लिए आवश्यक निर्देश और सुराक पृथी दें।**

जस्टर

JASTER®

Paclobutrazol 23% SC

जस्टर

पैक्लोबूट्राजोल २३% एससी

Regn. No: CIR-23002/2022-Paclobutrazol (SC) (442)-73
 पं. नं.: सीआइएन-२३००२/२०२२-पैक्लोबूट्राजोल (एससी) (४४२)-७३
Manufacture Lic No: MLJDDP/2022-23/187 **उत्पादन लाइसेंस नं.:** एमएल/जेडीडीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By: M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagawala House, 2nd Floor, Vidyanagar Marg, Kalina, Sactacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098.
निर्माता और विक्रेता/निकाल: मे. रोटम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवा हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यानगर मार्ग, कलिना, साक्रास (ई), होंडा शो रूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८
Factory Address: G-195, RIICO Industrial Area, Sanawad - Fatehnagar, Mawal, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
उत्पादन पता: जी-१९५, रीको इंडिया एरिया, सनावद-फतेहनगर, मेवाड़, जिला उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत
For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 18003000335, Email: contact@gaubaahlic.com

जस्टर

पैक्लोबूट्राजोल २३% एससी

उपयोग से पहले संयोज लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संघटन: पैक्लोबूट्राजोल सक्रिय तत्व : २३.००% भार/भार, अल्कायल्लेटेड नेफथलिन सल्फोनेट सोडियम लवण: ३.००% भार/भार, जैन्थेन गम: ०.०३% भार/भार, सोडियम बेंटाडोन/ प्लुग्योनियम सिलिकेट: २.५०% भार/भार, पॉलीडिमैथिलसिलॉक्सन+सिलिका: ०.३% भार/भार, बेन्जिसोथिआज़ोलीन-३-ऑन: ०.०१% भार/भार, प्रोपीलीन ग्लायकोल: ५.००% भार/भार, पानी: ०.३% भार/भार, **कुल: १००.००% भार/भार। फसल समूह:** आम में पीध विकास के लिए इस्तेमाल होता है। माया एवं विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न निदेश पत्रक पढ़ें। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** केवल परिपक्व आमों के पीध के लिए (कम से कम सात साल पुराने)। सिफारिश की गई पैक्लोबूट्राजोल की मात्रा को ५-१० लीटर साफ पानी में मिलाएं और तने से ३० सेमी दूर, ५-१० सेमी गहरी नाली खोएं कर प्रयोग करें। प्रयोग के बाद मिट्टी में दब के ४ या तने के चारों ओर अच्छी तरह से डालकर पूरी तने लगा दें। पूर्ण सूर्यास्तकें बचने दें, तब से तने को डालने दें। **प्रयोग के समय धुंधलकें न करें और न ही बहुत धूप पीरें। १. सतह तब तक न छुएं जब तक कि तने पर औखें पर से दूत पीरें। २. प्रयोग के बाद ओर खाने से पहले हाथ और खुली त्वचा को धो लें। ३. पानी नाली खोएं तब पानी की कवलों को प्रयोग किए गए खुली डिब्बों और रासायनिक तत्व से दूधित न करें। ४. कीटनाशक को मूल डिब्बों में ही सुरक्षित जगह पर व दबन बंद कर रखें। **विष नाशक:** लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** गले में उंगली डालकर उल्टी करावा। यदि निगल गया हो तो आमाशय साफ करें (गैस्ट्रिक लॉवेंज)। ध्यान रखें कि बाहर आ रहे तत्व उच्छवास के साथ अंदर न जा पायें। **लक्षण:** स्नायुदबलता, ध्यान, कमचें एवं एलजी के**

PANTONE 209 C

'A' watermark 10% of base color

[illegible]

PANTONE 209 C

'A' watermark 10% of base color

Shipper Label Size 100ml (Size: 180mm x 110mm)

7222

జస్టర్

JASTER®

Paclobutrazol 23% SC

జస్టర్

పాక్లోబూట్రాజోల్ ౨౩% एससी

Keep out of the reach of children

बच्चों की पहुँच से दूर रखिये।

खतरा

DANGER

ભય

જાણકારી પોલિથેન દ્વારા રાખો

PLANT GROWTH
REGULATOR

પૌષ્ઠ વિકાસ નિયંત્રક

ALBAUGH®

your alternative

PACKING

Regn. No.: CIR-230082/2022-Padobutrazol (SC) (442)-73
રજિ. નં.: સીઆઈઆર-૨૩૦૦૮૨/૨૦૨૨-પૈલોબૂટ્રાજોલ (एससी)(४४२)-७३
Manufacture Lic No.: MLJDDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagawala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, संताक्रुज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहरिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date / समापन तिथि :
अवधि समाप्तिनी तारीख:
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित
वधुभां वधु रीटिल किंमत ₹:
इसपेरा साथै

® - Registered Treadmark

Re-entry: 24 hours पुनः प्रविष्टि: २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
Imitation of label graphics is a punishable offence.
For Agriculture Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

THIS SIDE UP



PANTONE 110 C



PANTONE 209 C



‘A’ watermark 10% of base color

JASTER® Paclobutrazol 23% SC (Plant Growth Regulator)

It is containing Paclobutrazol is a systemic growth regulator discovered by ZENCA, U.K. its principal mode of action is the inhibition of gibberellin biosynthesis. The compound is taken through stem tissue or roots translocated to the site of action in sub-apical meristem. Tree vigour is controlled by reducing the internodes lengths of new shoots and earlier formation of terminal buds. Fruit production, fruit color and harvest yield can also be favorably influenced.

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage/HA Al	Dilution in Water between last spray to harvest	Waiting Period
Mango tree	Age 7-15 years Age 16-25 years Age more than 25 years	- 15 ml - 20 ml - 25-40 ml	- - -	- - -

Direction of Use:

Recommended for mature mangoes plant only (at least 7 years old). Recommended quantity of Paclobutrazol to be diluted in clean water of (5-10 liters) and applied in furrow 5 cm to 10 cm deep, about 30 cms away from the trunk. Fill up with soil after application or apply as soil-coller drench.

Time of Application:

Applied after the harvest of fruits. Any time from July to Oct. will be ideal.

Precaution :

- Keep out of the reach of the children.
- Wear protective gloves when handling the concentrate.
- Do not smoke, drink or eat while using this product.
- Wash concentrate from skin or eyes immediately.
- Wash hands and exposed skin before meals and after work.
- Do not contaminate ponds, water ways or ditches with chemicals or used container.
- Keep in original container, tightly closed in a safe place.

Symptoms of Poisoning:

Nervousness, anxiety, tremors convulsions and allergic manifestations.

FirstAid:

Induce vomiting by trickling the back of throat. Medical treatment: If ingested give gastric lavage with care to prevent aspiration.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote:

Treat symptomatically.

Disposal of Used Container:

- The package shall be cut or crushed and buried away from the habitation.
- The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
- Package, surplus material and washing should be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions:

- The packages containing the Plant Growth Regulator shall be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key.

- The room or premises meant for the Plant Growth Regulator shall be built, dry, ventilated and of sufficient dimension.

Paclobutrazol a.i.	23.00% w/w
Alkylated naphthalene sulphonate sodium salt	3.00% w/w
Xanthan gum	0.03% w/w
Sodium bentonite/Aluminium Silicate	2.50% w/w
Polydimethyl siloxanes+silica	0.3% w/w
Benzisothiazolin-3-one	0.01% w/w
Propylene glycol	5.00% w/w
Water	QS % w/w
Total:	100.00% w/w

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

जस्टर पैक्लोबूट्राज़ोल 23% एससी (पौध विकास नियंत्रक)

यह सक्रिय तत्व पैक्लोबूट्राज़ोल एक अंतर्प्रवाही पौध विकास क्रम व्यवस्थापक है। इसका आविष्कार जेनेका यू.के. ने किया है। इसका मूल कार्य रीति जिब्रेलिन बायोसिन्थेसिस को रोकना है। यह रसायन तने के तन्तुओं या जड़ों के द्वारा उप शिखर प्रगातिशील उतकों तक पहुँचता है और इसकी मुख्य क्रिया की जगह है। ये नई कोपलों के बीच की दूरी को कम करता है इसमें अंतिम अंकुर या कली जल्दी बनती है। और इस प्रकार पेड़ की तीव्रता को नियंत्रित करता है। इसका फल अंकुर उत्पादन, फल के रंग और फसल की उपज पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

फसल कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा	पानी की मात्रा	अंतिम छिड़काव
	स.त.	संरचना	मात्रा तथा फसल काटने के अंतराल
			बीच

आम	आयु 7–15 साल	—	15 मि.ली.	—
के पेड़	आयु 16–25 साल	—	20 मि.ली.	—
	आयु 26 साल से ज्यादा	—	25–40 मि.ली.	—

उपयोग के लिए दिशा—निर्देश:

केवल परिपक्व आमों के पौधे के लिए (कम से कम सात साल पुराने)। प्रयोग करने का तरीका: सिफारिश की गई पैक्लोबूट्राज़ोल की मात्रा 5–10 लीटर साफ पानी में मिलाए और तने से 30 से.मी. दूर, एक 5–10 से.मी. गहरी नाली खोद कर प्रयोग करें। प्रयोग के बाद मिट्टी से ढक दें या तन के चारों ओर अच्छी तरह से डालकर पूरी तरह मिगों दें।

प्रयोग का समय:

आम की फसल लेने के बाद प्रयोग करें। जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय अति उपयुक्त।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:

- बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
- संप्रत द्रव्य का प्रयोग दस्तानों पहन कर करें।
- प्रयोग के समय धूम्रपान न करें और न ही कुछ खायें पीयें।
- रसायन को त्वचा व आँखों पर से तुरंत धो दें।
- प्रयोग के बाद और खाने से पहले हाथ और खुली त्वचा को धो लें।
- नालों तलाबों तथा पानी के स्रोतों को प्रयोग किए गए डिब्बों और रसायनिक तत्व से दूषित न करें।
- पौध विकास नियंत्रक को मूल डिब्बों में ही सुरक्षित जगह पर व ढकन बंद कर रखें।

विष के लक्षण:

स्नायु दुर्बलता, व्ययता, कंपन एवं एलर्जी के लक्षण।

प्राथमिक चिकित्सा:

गले में उँगली डालकर उल्टी करवाएं। यदि निगल गया हो तो अमाशय साफ करें (गैस्ट्रिक लावेंज)। ध्यान रखें कि बाहर आ रहें तत्व उच्छवास के साथ अन्दर न जा पायें।

पौधविषाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह पौध विकास नियंत्रक पौधविषाक्त नहीं है।

विष नाशक:

लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

- खाली डिब्बों को कुचल कर काटकर आबादी से दूर दबा दें।
- खाली बोटल दोबारा प्रयोग न हो इसलिए बाहर न छोड़ें।
- डिब्बें, शेष रसायन एवं धोवन का पानी सुरक्षित तरीके से फेंकें।

संग्रहण की शर्तें:

- पौध विकास नियंत्रक को मूल डिब्बें में रखें। संग्रहण के लिए प्रयुक्त कमरें या स्थान, अन्य सामान के लिए उपयोग किए जा रहें कमरों से अलग ताला बंद अलमारी में रखें।

- पौध विकास नियंत्रक संग्रहण के लिए बने कमरें या स्थान ठीक सूखें, हवादार प्रकाशित व लम्बे—चौड़े हो।

रासायनिक संरचना:

पैक्लोबूट्राज़ोल सक्रिय तत्व	23.00% भार /भार
अल्काइलेटेड नेफथलीन सल्फोनेट	3.00% भार /भार
सोडियम लवण	
जैन्थेन गोंद	0.03% भार /भार
सोडियम बेटोनाईट/एल्युमीनियम सिलिकेट	2.50% भार /भार
पोलीडाईमिथाईल सीलओक्सोमन+सिलिका	0.3% भार /भार
Polydimethyl siloxanes+silica	0.3% w/w
Benzisothiazolin-3-one	0.01% भार /भार
प्रोपीलीन ग्लाईकोल	5.00% भार /भार
पानी	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
कुल	100.00% भार /भार

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल /लीफ़लेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्वी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउससे और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक—पर्वी देखें।

जमटर

पैक्लेंबज़ुट्राज़ोल 23% औसमी (पेंद विकास नियंत्रक)

ऐिउ सरगरम उँउउ पैक्लेंबज़ुट्राज़ेल ईँव अँउरपुएही पेंद विराम कूम नैअंधपव है। ऐिसदी धंन नैरेका पुवे ठे बीउंी है। ऐिस द मूल केंम िसुऐलिन ब्राऐिएँसिंसेीसम उँउ रेंकटा है। ऐिए रमऐिएउ उँडे ऐे उँउओं सॉ नउऑं दओर्रा ऐुप सिंवर पुगडींसील ऐुउऑं उव पहुँचरा है अँऐ ऐिसदी मुँध वुँर्रा दी नगुरा है। ऐिए नडीओं टऐिडीओं दरगिओन दुरी ठुं थँट वरटा है ऐिस वुँँव अँउम सॉ कडी नलदी बरटी है। और ऐिस उतुरां दरमउ दी डीधरउ ठुं कँटरेल वरटा है। ऐिसदा ढल अँउर ऐुउरओन, ढल ऐे रंग अँऐ ढ्रमल दी पेंदरदर 'उे अँठबुल पुडुबऐ हैटा है।

ऐुपजेंग:

ढ्रमल रीट द ओम नओ	मओरओ/रैक ऐे.ओ.ऐी. दओरमुऐेसम	पओडी वुँँव अँऐ दओडी दरगिओन अँउरओ (ऐिदओ वुँँव)	अँउम ङिउवओ ऐुओओ
ओम ऐे ऐुमर 7-15 साल	—	15 मि.ली.	—
दरमउ ऐुमर 16-25 साल	—	20 मि.ली.	—
ऐुमर 25 साल से ज्यादा	—	25-40 मि.ली.	—

ऐिसउेमओल लडी ढिरऐेस:

सिरढ पेंडे ऐेऐे ओँओं लडी (थँटे थँट सँउ साल पुराऐे)। ऐिसउेमओल द उरीओ: सिढओँस बीडी गओी पैक्लेंबज़ुट्राज़ेल की मओरओ 5-10 लीटर सओपओडी वुँँव मिलाऐ अँऐ उँडे उँ 30 सै.मी. दुर, ईँव 5-10 सै.मी. डुँबी ढाली ऐेऐ ऐे ऐिसउेमओल कँड। ऐिसउेमओल उँ बओर ऐिंटी ढाल ईँव ऐिऐ सॉ उँडे ऐे चारे पओे रंगी उतुरां पओे पुरी उतुरां उँऐ ऐिऐ ऐिऐ।

ऐिसउेमओल दओ मओ:

ओँब दी ढ्रमल लेंउ ऐे बओर ऐिसउेमओल करे। सुलऐी उँ अकउबउ दरगिओन दओ मओ ऐेऐेंद बुरदओं।

ऐिसउेमओलवरउओ लडी सओपओडीओं:

- बँऐिओ दी पहुँच उँ दुर ऐेऐे।
- गओुडे पदओर द ऐिसउेमओल दसउओे पओे करे।
- ऐिसउेमओल ऐे मओ उँबओुओेमी ढा करे अँऐ ढा गी कुओ ओऐ पँऐि।
- रमऐिएउ ठुं चमडी अँऐ ओँओं उँ डुरेंउ ऐे ऐिऐ।
- ऐिसउेमओल उँ बओर अँऐ धओे उँ पढिलओं ठँव अँऐ डुँलुँी चमडी ठुं ऐे लऐि।
- ढालिओं, उलओओं अँऐ पओी ऐे सेंओं ठुं ऐिसउेमओल बीडे गऐे डँँबिओं अँऐ रमऐिएऐिउ उँउ ठुं दुरसिउ ढा करे।
- रैीढओसक ठुं मूल डँँबिओं वुँँव गी सुरँऐिअउ नगुरा 'उे अँऐ ईँवक ँद वरके ऐेऐे।

नऐिए ऐे लँडः

धओरओट, ऐेऐरी, रँबडी अँऐ ओँलरसी ऐे लँडः।

मूदली िरिउडओ:

गरलें वुँँव ऐुँरओओ पओे ऐे ऐुलडी वरदओँ। सैे ढिराल गिओ ऐेऐे उओं ओमओे सओढरें (गैसऐिउ लओेँस) ऐिसओ रँँव वि बओर ओ रगे उँउ सओ ढाल अँऐर ढा सॉ सकड।

पेंदरऐिरीलपओ:

ढिरओरिउ मओरओ अँठुसओ ऐिसउेमओल वरढ 'उे पेंद नऐिरीलपओ ढिरओँ

नऐिए ढओसक:

लँडःओं अढबसओ ऐिलस करे।

धओडी डँँबिओं दओ ढिपटओ:

- धओडी डँँबिओं ठुं उँडे वे सॉ रँँट ऐे ओओडी उँ दुर दओ ऐिऐ।
- ऐिसउेमओल बीडे गऐे डँँबिओं/पेऐटी ठुं ऐुँस गी बओर ढगी ङँड ऐेओ चओीऐ।
- ऐुरिओऐे ठुं पुरुसओ उँ बओऐिउ लडी डँँबिओं, बओे गऐे थँल/पदओरओ मसीनओं दी पेंढ अउ धओली डँँबिओं दओ ढिपकओ सुरँऐिअउ सओन 'उे करे।

डँँडओ ऐीओं सओरओं:

- पेंद विराम ढिरँउरओ ऐे डँँबिओं ठुं ऐेद सँमंगरी धुरओी दसओं ऐे डँँडओ लडी ऐिसउेमओल गेट दओले वओरिओं सॉ ऐिमओरओं वुँँव सॉ अलओ 'उे उओओ बँऐ अलमओीओं वुँँव रँँधटा चओीऐ है।

- पेंद विराम ढिरँउरओ ऐे डँँडओ लडी ढरडेे सओ दओले कओे सॉ सओन मओडु, सँँवे रेंसली उँठओर अँऐ पदओरओ गेटेे चओीऐे रढ अँऐ ऐुओओं वुँँव कओी सओन गेटेओ चओीऐ है उओं वि दओष ढाल पुरुसओ ढा गेे सरे।

रमऐिएऐिउ सँमओर:

पैक्लेंबज़ुट्राज़ेल सरगरम उँउ	23.00% डओर/डओर
ओँलओऐीऐैिउट नेपथलीन सलुैनेटे	3.00% डओर/डओर
सैडीओम सओल	
सैेनऐेन गोंद	0.03% डओर/डओर
सैडीओम बेनटेनओीट/ओँलओुमीठीओम सीलऐेऐे	2.50% डओर/डओर
पॉलिडाओिमिथओल सीलओक्सओेन + सीलिकओ	0.3% डओर/डओर
बैसओऐीसेओओसैलीडीन-3-वन	0.01% डओर/डओर
पुेपीलीन गलओीऐेल	5.00% डओर/डओर
पओी	कओी मओरओ % डओर/डओर
कुल:	100.00% डओर/डओर

ऐिउओडी: 1. ऐेलओ अँऐ लीँडलैेट 'उे सिंवर बीडीओं ढ्रमल' अँऐ बीट उँ ङँँट विसे 'उे ऐिसउेमओल ढा करे। 2. दओडी उँ बओर ऐे ऐिसउेमओल लडी ढरडेे सओ दओले डओर ओँओओ उँ बओर ऐेललैेट 'उे ऐिंऐे ढिरऐेस अँठुसओ डँँवे ठुं ढसट वर ऐिऐ। 4. पेंली रओुऐिस अँऐे बँऐ ऐिलओे लडी ढिरऐेसओं अँऐ मओरओ लडी-लीँडलैेट ऐेऐे।

Punjabi	Marathi	Gujarati
---------	---------	----------

जस्टर

पैक्लोब्यूट्राज़ोल 23% एससी (रोंप वाढ नियामक)

सक्रिय तत्व म्हणून ह्यात पैक्लोब्यूट्राझोल आहे जे एक अंतर्प्रवाही वाढ नियामक आहे. याचा शोध झेन्का यू.के.ने लावला आहे. याचे मुख्य काम जिब्रेलीन बायोसिंथेसिसवर प्रतिबंध घालणे हे आहे. हे रसायन रोपाच्या मुळापासून किंवा खोडाच्या पेशींपासून वाढ भागात पोचते आणि ती त्याची काम करण्याची मुख्य जागा आहे. ते नवीन कोंबांन्मधले अंतर कमी करते आणि शेंवटची कळी लवकर तयार होते आणि अशा प्रकारे हे झाडाच्या शाक्तीला नियंत्रित करते. फळांचे उत्पादन, फळांचा रंग आणि पिकाचे उत्पादन या सगळ्यावर याचा चांगला परिणाम होतो.

वापराच्या पद्धति:

पीक	कीटकांचे सामान्य नांव	मात्रा / एएए ए.आय. रचना	पाण्यात पातळ करणे	कापणी आणि शेंवटच्या फवारणी मधील कालावधी (दिवसात)
आंब्याचे झाड	वय 7–15 वर्ष वय 16–25 वर्ष 25 वर्षांपेक्षा जास्त वय	— 15 लि. — 20 लि. — 25–40 लि. —	— — —	— — —

वापरण्यासाठी निर्देश:

फक्त परिपक्व आंब्याचे झाडांसाठी (किमान 7 वर्ष जुन्या). पैक्लोब्यूट्राझोल सुचवलेल्या प्रमाणात घेऊन त्यात स्वच्छ पाणी (5–10 लि.) मिसळून ते पातळ करावे आणि बुंध्यापासून सुमारे 30 सें.मी. लांब 6 ते 10 सें.मी. खोल चर तयार करून त्यात ते घालावे. वापरानंतर मातीने भरून टाका किंवा बुंध्याच्या चारहीकडे माती टाकून ती ओती करा.

वापरण्याची वेळ:

फळांचे पीक आल्यानंतर वापर करा. जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान कोणतीही वेळ उत्तम.

काळजी:

1. मुलांपासून लांब ठेवा.

2. रसायनाचा वापर करताना संरक्षक हातमोजे घाला.

3. रसायनाचा वापर करताना धूम्रपान करू नका किंवा खाऊपिऊ नका.

4. त्वचा किंवा डोळ्यांना रसायन लागल्यास त्वरित धुवा.

5. वापरानंतर आणि खाण्यापूर्वी उघडी त्वचा आणि हात धुवा.

6. नाले, तळी आणि पाण्याचे इतर स्रोत रसायन किंवा त्याच्या रिकाम्या डब्याने दूषित करू नका.

7. रसायन मूळ डब्यात, घड्ड झाकण लावून सुरक्षित ठिकाणी ठेवा.

विषबाधेची लक्षणे:

नर्हस वाटणे, अस्वस्थ वाटणे, कापरे, डाटके येणे, एलर्जी.

प्रथमोपचार:

मानेवर थोपटून उल्टी करावा. वैद्यकीय उपचार: पोटात गेले असल्यास गॅस्ट्रिक लवाज द्या.

झाडांना विषबाधा:

निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

उतारा:

लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विळेवाट:

- रिकामे डबे कापून मोडून लोकवस्तीपासून लांब जमिनीत पुरा.
- वापरलेले डबे / पाकिटे तसेच बाहेर टाकू नये.
- पर्यावरणाला प्रदूषणापासून वाचविण्यासाठी डबे, उरलेले मिश्रण / पदार्थ यंत्र घुतल्याचे पाणी आणि रिकामे डबे सुरक्षित ठिकाणी नेवून टाकावे.

संग्रह करण्याच्या अटी:

- रोप वाढ नियामकांचे डबे हे इतर सामुग्री किंवा खाण्यापिण्याच्या शोषपासून दूर ठेवावे आणि डबे बंद खोलीमध्ये व कुलुपबंद वेगळ्या आलमारित ठेवावे.

- रोप वाढ नियामक ठेवलेली खोली हवेशीर असावी त्यात भरपूर प्रकाश यावा, त्यात सूर्यप्रकाश असावा. जागा मोकळी असावी आणि ती प्रदूषणापासून दूर असावी.

रासायनिक रचना:

पैक्लोब्यूट्राझोल स.त.	23.00% भार / भार
अल्काइलेटेड नेफथालीन सल्फोनेट	3.00% भार / भार
सोडियम सॉल्ट	
झेन्थम गम	0.03% भार / भार
सोडियम बेटोनाईट / एल्युमिनियम सिलिकेट	2.50% भार / भार
पॉलिडाइमिथाइल सिलोक्झेंस + सिलिका	0.3% भार / भार
बेन्झायसोथायझोलिन–3–वन	0.01% भार / भार
प्रॉपिलीन ग्लायकॉल	5.00% भार / भार
पाणी	पुरेसे प्रमाण % भार / भार
एकूण:	100.00% भार / भार

इशारा: 1. लेबल आणि निर्देश पत्रिकेत उल्लेख असलेल्या कीटक आणि पिकांविषयक इतर कोणत्याही कीटक आणि पिकासाठी याचा वापर करू नये. 2. कापणी नंतर वापरू नये. 3. वापरल्यानंतर रिकामे डबे निर्देश पत्रिकेत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावे. 4. पॉलि हाऊसेस आणि निर्धारित क्षेत्रासाठी निर्देश आणि प्रमाण–निर्देश पत्रिका बचा.

जस्टर

पैक्लोब्यूट्राज़ोल 23% ऍसी (छांड विकास नियंत्रक)

पैक्लोब्यूट्राज़ोल नामनुं सक्रिय तत्व धरावतुं आ रसायध अेक अ्यस्थित विकास नियंत्रक छु अने जेनेका, यू. के.मां आविष्कार पामेव छु. आ संयोजननुं मुख्य क्षय जिब्रेलिन बायोसिन्थेसिसने रोकवानुं छु. आ रसायध थडओ तंतुओ अधवा मूळ द्वारा उप-शिखर प्रगतिशील उन्को सुधी पडोयें छु अने ते अेना क्षयनी मुख्य जग्घा छु. आ संयोजन डूपथो वय्थो अंतरने ओडुं करे छु. अेमां अंतिम अंडुर अधवा कळी जवटी तयार थाय छु अने आ रीते छांड(ओड)नी तीव्रताने नियंत्रित करे छु. कण उत्पादन, कणाने रंग अने पाकनी उपज पर आ रसायधनो सायुद्धण प्रभाव पडे छु.

वपरास:

पाक	ज्वातनुं सामान्य नाम	प्रति हेक्टर मात्रा स.त.	पाझीनी मात्रा	पाक परना ँ छंउंउओ वय्थे नुं अंतर (दिवस)
आंभांनो ओड	ँउमर 7 थो 15 वर्ष ँउमर 16 थो 25 वर्ष ँउमर 25 वर्षथी धुधु	— 15 मि.झी. — 20 मि.झी. — 25-40 मि.झी. —	— — —	— — —

उपयोग माटेना निर्देश:

मात्र परिपक्व आंभांनो ओड माटे (ओछामां ओछा 7 वर्ष जुना). उपयोग करवानी रीत: पैक्लोब्यूट्राज़ोलनी ल्वावमध क्षय मुजअनी मात्रा 5-10 लीटर साक्ष पाझीमां ल्वावो अने थडथी 30 से.मी. दूर 5 थो 10 से.मी. छुंडा अेक पाडो पाडोने तेनो उपयोग करो. उपयोग पछी तेने माटीथी डांकी द्धे अधवा थ