

Label 30ml (Size : 114mm x 25mm)

OLMERT

Chlorantraniliprole 18.5% SC

Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Chlorantraniliprole (a.i.): 18.50% w/w, Methyl methacrylate ethoxylated graft co-polymer: 3.00% w/w, Ethylene oxide/propylene oxide block co-polymer and ethoxylated alcohol: 2.00% w/w, Attapulgit clay: 1.00% w/w, Xanthan gum: 0.25% w/w, 1,2-benzisothiazolin-3-one: 0.10% w/w, Silicone emulsion: 0.50% w/w, Propylene glycol: 6.80% w/w, water: QS% w/w, **Total: 100% w/w.**
Antidote: No specific antidote is known, treat symptomatically. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets.

ऑलमर्ट

क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल १८.५% एससी

खैटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रसायनिक संघटक: क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल (स. तत्व): १८.५०% भार/भार, मिथाइल मिथाक्रिलेट इथोक्सीलेटेड ग्राफ्ट सह पॉलिमर: ३.००% भार / भार, इथिलीन ऑक्साइड/प्रोपिलीन ऑक्साइड सहोक्सीलेटेड एल्कोहॉल: २.००% भार/भार, अटपुलगाइट क्ले: १.००% भार/भार, खैथेन गम: ०.२५% भार/भार, १,२-बेन्जिसोथियाजोलिन-३-ओन: ०.१०% भार/भार, सिलिकॉन इमल्शन: ०.५०% भार/भार, प्रोपिलीन ग्लायकोल: ६.८०% भार/भार, जल: पर्याप्त मात्रा में भार/भार, कुल: १००% भार/भार। **विषयावली:** कोई विशेष विष हाने वाली दवा नहीं है, लक्षण अनुसार उपचार करना चाहिए।
सावधानियाँ: १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

कॉर्पोरेशन ८८८८८

OLMERT
Chlorantraniliprole 18.5% SC
ऑलमर्ट
क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल १८.५% एससी



INSECTICIDE
कीटनाशक

Net Content 30 ml
शुद्ध मात्रा ३० मिली

ALBAUGH
your alternative

Regn. No.: CIR-337157/2024-Chlorantraniliprole (SC) (452)-1222
रजि. नं.: सीआइआर-३३७१५७/२०२४-क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल (एससी) (४५२)-१२२२

Manufacture Lic No.: MLUCPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएलएपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By:

M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyasagar Marg, Koliha, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्मित और बिक्रयकर्ता: मे. रोटम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यासागर मार्ग, कोलिहा, वांछाटुल (पु.), होडा शोल्म के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-105, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mawli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी: जी-१०५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाद-फतेहनगर, मेवली, जिला उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 18003800335, Email: contact@albaughlic.com

Keep in dry place away from open heat or open flame.

गुली और चमकी जगह से दूर रखें।

For Agriculture Use Only. **कृषि के लिए उपयोग के लिए।**
imitation of label graphics is a punishable offence.

Batch No.:

बैच नं.:

Lot No.:

लॉट नं.:

Mfg. Date:

उत्पादन तिथि:

Exp. Date:

संलग्न तिथि:

अधिकतम मूल्य प्रति

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in India including

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

Batch No.:

बैच नं.:

Lot No.:

लॉट नं.:

Mfg. Date:

उत्पादन तिथि:

Exp. Date:

संलग्न तिथि:

अधिकतम मूल्य प्रति

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in India including

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

अधिकतम मूल्य प्रति

PANTONE 4199 C

PANTONE 2012 C

'A' watermark 10% of base color

Label 60ml (Size : 144mm x 30mm)

OLMERT™

Chlorantraniliprole 18.5% SC

Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Chlorantraniliprole (a.i.): 18.50% w/w, Methyl methacrylate ethoxylated graft co-polymer: 3.00% w/w, Ethylene oxide/propylene oxide block co-polymer and ethoxylated alcohol: 2.00% w/w, Attapulgate clay: 1.00% w/w, Xanthan gum: 0.25% w/w, 1,2-benzisothiazolin-3-one: 0.10% w/w, Silicone emulsion: 0.50% w/w, Propylene glycol: 6.80% w/w, water: QS% w/w, **Total: 100% w/w. Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets.

ऑलमर्ट

क्लोरेट्रानिलिप्रोल १८.५% एससी

कीटनाशक

उपयोग से पहले संग्रह लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: क्लोरेट्रानिलिप्रोल (स. तत्व): १८.५०% भार/भार, मिथाइल मिथाक्राइलेट इथोक्सीलेटेड ग्राफ्ट सह पॉलिमर: ३.००% भार / भार, इथाइलीन ऑक्साइड/प्रोपाइलीन ऑक्साइड सहपोलिमर पिंडक तथा इथोक्सीलेटेड अल्कोहोल: २.००% भार/भार, अटपुलगाइट मिट्टी: १.००% भार/भार, जेनथेन गम: ०.२५% भार/भार, १,२-बेजिसोथियाजोलिन - ३- एक: ०.१०% भार/भार, सिलिकॉन इमल्शन: ०.५०% भार/भार, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल: ६.८०% भार/भार, जल: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००% भार/भार। **विष नाशक:** कोई विशेष विष हरने वाली दवा नहीं है, लक्षण अनुसार उपचार करना चाहिए। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

ऑलमर्ट ६०ml

OLMERT™

Chlorantraniliprole 18.5% SC

ऑलमर्ट

क्लोरेट्रानिलिप्रोल १८.५% एससी



INSECTICIDE
कीटनाशक

Net Content 60 ml

शुद्ध मात्रा ६० मिली

ALBAUGH™
your alternative

Regn. No.: CIR-337157/2024-Chlorantraniliprole (SC) (452)-1222

रजि. नं.: सीआईआर-३३७१५७/२०२४-क्लोरेट्रानिलिप्रोल(एससी)(४५२)-१२२२

Manufacture Lic No.: MLJDP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं.: एएल/लेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :

M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyasagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400088.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, संताक्रुज (पू.), होडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Marali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाद-फतेहनगर, लेहमिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address. Tel: 18003800335, Email: contactin@albaughlic.com

Keep in dry place away from open heat or open flame.

सूखी और ठण्डी जगह में जग से दूर रखें।

For Agriculture Use Only.

केवल कृषि उपयोग के लिये।

imitation of label graphics is a punishable offence.

Batch No. :

बैच नं. :

मेक नं. :

Mfg. Date :

उत्पादन तिथि :

दिखाएल तारीख :

Exp. Date :

समय तिथि :

अधिकतम बिक्री कीमत

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in Indian currency : ₹

अधिकतम बिक्री कीमत

इसके सभी करों सहित

प्राचीन मुद्रा में : ₹

युक्तियों में शामिल करों सहित

शुद्ध की

Unit sale price : ₹

Unit sale price : ₹

Net Content 60 ml

शुद्ध मात्रा ६० मिली

TM - Trademark

Re-entry: 24 hours

पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे

सुरक्षा चिह्न

सुरक्षा चिह्न

सुरक्षा चिह्न

सुरक्षा चिह्न

सुरक्षा चिह्न

सुरक्षा चिह्न

सुरक्षा चिह्न

PANTONE 4199 C

PANTONE 2012 C

'A' watermark 10% of base color

Shipper Label (Size: 180mm x 110mm)

ओलमर्ट ऑलमर्ट

OLMERT™
Chlorantraniliprole 18.5% SC
ऑलमर्ट
क्लोरेट्रानिलिप्रोल १८.५% एससी



INSECTICIDE
कीटनाशक

ALBAUGH™
your alternative

PACKING



Regn. No.: CIR-337157/2024-Chlorantraniliprole (SC) (452)-1222

रजि. नं.: सीआईआर-३३७१५७/२०२४-क्लोरेट्रानिलिप्रोल(एससी)(४५२)-१२२२

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187 उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By: M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor,
Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाउस, दुसरी मंजिल,
विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पूर्व), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar,
Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर,
तेहसिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office
address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / जेच नं.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date / समापन तिथि :

અવધી સમાપ્તિની તારીખ:

Maximum retail price ₹:

inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત ₹: કરચેરા સાથે

Unit sale price : ₹

TM - Trademark

Read enclosed leaflet before use.

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

For agriculture use only.

कृषि उपयोग के लिए।



THIS SIDE UP

OLMERT™ Chlorantraniliprole 18.5% SC (Insecticide)

Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC (20% w/v) is a novel substitute anthranilamide insecticides. It is a board spectrum insecticide and is recommended for controlling pests of Rice, Cabbage, Cotton, Sugarcane, Tomato, Chili, Soybean, Brinjal, Pigeon pea (Red gram), Bengal gram, Black gram, Bittergourd, Okra, Maize and Groundnut crop.

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Formula-tion (ml)	Dilution In Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Bengal gram	Pod Borer	25	125	500	11
Bitter gourd	Fruit Borer & Caterpillars	20-25	100-125	500	7
Black Gram	Pod borer	20	100	500	20
Brinjal	Fruit and Shoot borer	40	200	500-750	3
Cabbage	Diamond Back Moth	10	50	500	3
Chilli	Fruit borer	30	150	500	3
Cotton	American boll warm, Spotted bollworm, Tobacco caterpillar	30	150	500	9
Groundnut	Spotted stem borer, Pink stem borer	30	150	500	28
Maize	Fruit borer	40	200	500	10
Okra	Fruit borer	25	125	500	5
Pigeon pea	Gram pod borer	30	150	500-750	29
Rice	Pod fly	30	150	500-750	47
Soybean	Green semi looper, Stem fly, Girdle Beetle	30	150	500-750	22
Sugarcane	Termites	100-125	500-625	1000	208
	Early shoot borer,	75	375	500	208
	Top borer				
Tomato	Fruit borer	30	150	500	3

Direction of Use: Sugarcane (Method and Time of application): Sett Drenching/Soil Drenching in the sugarcane crop for control of termites and early shoot borer and Top borer. The application for the control of 3rd, 4th and 5th brood of Top borer in sugarcane, should be done as Soil drenching in the month of June. Other crops (Rice, Cotton, Cabbage, Tomato, Chilli, Soybean, Brinjal, Pigeonpea, Bengal gram, Black gram, Bittergourd, Maize & Okra) use as foliar spray at ETL of the pest population using knapsack sprayer.

Time of Application: When pest population reaches to Economic Threshold Level (ETL).

Precautions: 1. Read the leaflet carefully before use, Save the container with the label to the show the physician in case of accidental poisoning. Read and follow all instructions on the label. 2. Do not inhale the contents. Wear rubber gloves, goggles, facemask and protective clothing while handling. Avoid remaining in the drift of spray by applying the insecticide with the wind. 3. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while spraying. 4. Do not fill the spray tank beyond 3/4th of its capacity. Clean the blocked nozzle by a thin wire or pin never by blowing the same. 5. In case of any spillage on the body, it should be washed with plenty of water. 6. Always change clothing and take bath as soon as the insecticide treatment is over. 7. Wash hands and unprotected parts of the body before eating, drinking or smoking and after handling. 8. Remove and wash contaminated clothing before reuse. 9. Cal a physician immediately if any poisoning appear in a person who is using or has recently used this insecticide.

Symptoms of Poisoning: Mild eye irritant with blurred vision. Vapour inhalation may result in nasal secretion.

FirstAid: If Inhales: No specific intervention is indicated as the material is not likely to be hazardous by inhalation. If on skin: The material is not likely to be hazardous by skin contact, but clearing the skin after use is advisable. If in eyes: The material is not likely to be hazardous to the eyes is, but if contact occurs, flushing the eyes with plenty of water.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote: No specific antidote available, treat symptomatically.

Disposal of Used Container: Container for not reuse. Empty containers should be destroyed and buried in ½ meter deep soil away from habitation. Do not contaminate the environment, water or food by storage of disposal. Do not flush to surface water or sanitary sewer system.

Storage Conditions: Do not store and consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. Store the insecticide in original container only. Tightly closed in a well built, cool, dry place, well lit and ventilated and should be of sufficient dimension to avoid contamination with vapours. The material should be kept under lock and key, away from food, animal feed, other pesticide and fertilizers.

Chemical Composition:	
Chlorantraniliprole (a.i.)	18.50% w/w
Methyl methacrylate ethoxylated graft co-polymer	3.00% w/w
Ethyleneoxide/propyleneoxide block co-polymer and ethoxylated alcohol	2.00% w/w
Attapulgite clay	1.00% w/w
Xanthan gum	0.25% w/w
1,2-benzisothiazolin-3-one	0.10% w/w
Silicone emulsion	0.50% w/w
Propylene glycol	6.80% w/w
Water	QS % w/w
Total:	100.00% w/w

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to Be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

ऑलमर्ट

क्लोरेट्रानिलिप्रोल 18.5% एस.सी (कीटनाशक)

क्लोरेट्रानिलिप्रोल 18.5% भार /भार एस.सी (20% भार /आयतन) एक अनूठे किस्म का एक्सी एन्थ्रानिलामाइड कीटनाशक है। यह एक बहु आयामी असर वाला कीटनाशक है जिसे धान, पतागोमी, कापास, गन्ना, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, बैंगन, अरहर, चना, उड़द, करेला, मिन्दी, मका और मूंगफली पर लगने वाले विभिन् अंतर की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है।

प्रति हेक्टेयर मात्रा	पानी की मात्रा (लीटर)	
	स.त. (ग्राम)	संरचना (मिली)
25	125	500
20–25	100–125	500
20	100	500
40	200	500–750
10	50	500
30	150	500
30	150	500
30	150	500
40	200	500
25	125	500
30	150	500–750
30	150	500
30	150	500–750
100–125	500–625	1000
75	375	1000

Direction of Use: Sugarcane (Method and Time of application): Sett Drenching/Soil Drenching in the sugarcane crop for control of termites and early shoot borer and Top borer. The application for the control of 3rd, 4th and 5th brood of Top borer in sugarcane, should be done as Soil drenching in the month of June. Other crops (Rice, Cotton, Cabbage, Tomato, Chilli, Soybean, Brinjal, Pigeonpea, Bengal gram, Black gram, Bittergourd, Maize & Okra) use as foliar spray at ETL of the pest population using knapsack sprayer.

Time of Application: When pest population reaches to Economic Threshold Level (ETL).

Precautions: 1. Read the leaflet carefully before use, Save the container with the label to the show the physician in case of accidental poisoning. Read and follow all instructions on the label. 2. Do not inhale the contents. Wear rubber gloves, goggles, facemask and protective clothing while handling. Avoid remaining in the drift of spray by applying the insecticide with the wind. 3. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while spraying. 4. Do not fill the spray tank beyond 3/4th of its capacity. Clean the blocked nozzle by a thin wire or pin never by blowing the same. 5. In case of any spillage on the body, it should be washed with plenty of water. 6. Always change clothing and take bath as soon as the insecticide treatment is over. 7. Wash hands and unprotected parts of the body before eating, drinking or smoking and after handling. 8. Remove and wash contaminated clothing before reuse. 9. Cal a physician immediately if any poisoning appear in a person who is using or has recently used this insecticide.

Symptoms of Poisoning: Mild eye irritant with blurred vision. Vapour inhalation may result in nasal secretion.

FirstAid: If Inhales: No specific intervention is indicated as the material is not likely to be hazardous by inhalation. If on skin: The material is not likely to be hazardous by skin contact, but clearing the skin after use is advisable. If in eyes: The material is not likely to be hazardous to the eyes is, but if contact occurs, flushing the eyes with plenty of water.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote: No specific antidote available, treat symptomatically.

Disposal of Used Container: Container for not reuse. Empty containers should be destroyed and buried in ½ meter deep soil away from habitation. Do not contaminate the environment, water or food by storage of disposal. Do not flush to surface water or sanitary sewer system.

Storage Conditions: Do not store and consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. Store the insecticide in original container only. Tightly closed in a well built, cool, dry place, well lit and ventilated and should be of sufficient dimension to avoid contamination with vapours. The material should be kept under lock and key, away from food, animal feed, other pesticide and fertilizers.

रासायनिक संरचना:	
Chlorantraniliprole (a.i.)	18.50% w/w
Methyl methacrylate ethoxylated graft co-polymer	3.00% w/w
Ethyleneoxide/propyleneoxide block co-polymer and ethoxylated alcohol	2.00% w/w
Attapulgite clay	1.00% w/w
Xanthan gum	0.25% w/w
1,2-benzisothiazolin-3-one	0.10% w/w
Silicone emulsion	0.50% w/w
Propylene glycol	6.80% w/w
Water	QS % w/w
Total:	100.00% w/w

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to Be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

ऑलमर्ट

क्लोरेट्रानिलिप्रुल 18.5% एस.सी. (कीटनाशक)

क्लोरेट्रानिलिप्रुल 18.5% डा/डा' ओस सी (20% डा/आ) नष्टा' ऐथिलिडिड डा'एनिएड कीटनाशक है। एिड एिड विआयड मोजुवडा कीटनाशक है अडे एिस डी डेडे, गंडी, बापुड, टांटे, टांटाड, मिरर, सेंआपीडन, बैंगड, अरहर (मसुर), बंगाली चने, मंग, करेले, छिंडी, मंजी, मूंगडहली डे हेठ डिडे कीटा' डे कंटरल वरठ लडी सिडरड वीडी संधी डी।

	ਮਾਤਰਾ /ਰੋਕ ਏ. ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿਲੀ)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਅੰਤਮ ਡਿਜ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
	25	125	500	11
	20-25	100-125	500	7
	20	100	500	20
ਪੋਟੀ ਫੋਦਕ	40	200	500-750	3
ਰਸਮ	10	50	500	3
	30	150	500	3
ਭੀ.	30	150	500	9
ਸੁੰਗੀ.				
	30	150	500	28
ਮਿਸ਼ਰ ਫੋਦਕ,	40	200	500	10
ਮਿਸ਼ਰ ਫੋਦਕ				
	25	125	500	5
ਫੋਦਕ,	30	150	500-750	29
	30	150	500	47
ਪਰ	30	150	500-750	22
ਭੁਲ ਬੀਟਲ				
	100-125	500-625	1000	208
ਟੀ ਫੋਦਕ,	75	375	1000	208
	30	150		3

डिमडरान लडी निरडेम: (डिमडेराल दा उडील अडे मग) गींन: गींन डी इमल एिंड युंन अडे अगीडे टांरिडी डेकर अडे गिरा डेकर डे कंटरलरडी सैट डेंगिरग,मसुॉरिड डेंगिरग। गींन एिंड उडन डेकर डे उडीं, चैडे अडे पंडेड सुड डे कंटरल लडी डिमडेराल नाल गुण डे मडीन एिंड सांरिड डेंगिरग वीडी नजी टांरी टांरी डे दुनीआ इमल (चेल, गुम, संडगंडी, टाउटर, मिरर, सेंआपीडन, चाण्टि, अरहर, छिं डेडे, काला चन, करेले, छिंडी) एिंड डीमडेर लडी एडरड करेले कीटा' डी गिडडी डीटीअल उड मसुॉरड 'डे हांरिडल डिडरआन वनं एडरड वीडी नजी चण्टीडी।

डिमडेराल दा मम: वीडं डी सेंआपी अरविडर डिटीडल्लिडग (डीटीअल) उड मसुॉरडिअं डी।

मसुॉरगलीम: 1. परवे नुं गिआन नाल पडूं, गलडी नाल गंरिडर चडून डी सुवड एिंड डरकरन नुं रिपअरुड लडी लेखन नाल डेंडे नुं मंडांन डे वीं.लेखन 'डे मारे निरडेमस' नुं पडूं एडे पालडा वरडे। 2. मंगरी नुं मूंग ना। मंडरान टेरन रगड डे रमडरन, पंध डी अंनर, डेममस अडे मुरंगिआउडन रगडे पडिंन। उडा' चंडर टेरन वीडनरड डिमडेराल वरडे मरे डिडरआन डे पुंटे एिंड रगिडे उं उं उं। मसुॉरान टेरन रुड धरि न। उंडरगुनडी न वरं सें पान दा चषां। 3. मसुं टेरु नुं रिपडी सनैरवा डी 3/4 मसुंडा उं गिआनर न डंडे। डंड नलन नुं पडडी उंड ना संधी नाल मसुंडर वरिड एिंड वरु न मगें। 5. सगीर उं डेंडरन डी सुवड एिंड, धुडर संधे पाडी नाल डंडर चण्टीन। 6. वीडनरड उं डेंडरन पुग उंटे डे उडरं धाअर नाल डे रगडे वरल लडि। 7. मंडरान उं धाअर अडे पांन, पीन सें उंडरगुनडी वरठ न पडिंन' रगड अडे मगीर डे असुंरिडगड डिम डे लडि। 8. मड वरठ न पडिंन' रगिड रगडे रगड एिंड अडे प डे लडि। 9. डिम डीमडेराल डी वरडर वरठ रगड नाल एिंड वरठ एिंड रिआउर डी वरं वरडी गंरिड डे लंडड नगर अरुंटे उर डे रंडरन डरकरन नुं मरे।

गंरिड डे लंडड: अंधं एिंड उरलडी गलठन अडे पुंणल डिमंडा। दामड मग एिंड गंरिड 'डे नेंड उं पाडी वरिड मकरन।

मसुडी सिंरडन: सै मरड नाल अरंडर रिआ। रे. वेंडी धम इल्लन दा संडेडी नुं रिगिरिड मंगरीन मूंडर नाल धडरनार डेउ डी संडरन नुं गींन। 1. पाडी 'डे उंटे डी सुवड एिंड. चमडी नाल सेंडर 'डे मंगरीन डे धडरनार डेउ डी संडरनार नुं गींन। 2. पड वरठ न धाअर चमडी डे संध वरठ डी मलर डिंडी संधी डी। नरर अंधं एिंड गिआन डे. मंगरीन डे अंध वरं धडरनार डेउ डी संडरनार नुं गींन। 3. पड वरं मसुंडर डे गंरन। 4. डा' अंध नुं धुडन मरे पाडी नाल डेडे।

डेर गंरिडीगुणन: निरधरगड मउर' अडुमर डिमडेराल वरठ 'डे डेर गंरिडीगुणन नुं गींन।

गंरिडनरड: वेंडी धम गंरिडनरड नुं गींन। मसुॉरड अडे लंडडा' अडुमर डिमल वरडे।

वरडे गडे डेंगिआं दा निपटरा: डेंड मरड वरड लडी नुं गींन। 1. धाली डेंगिआं नुं नमर वरडे रिगुंरिडी डिमलर डे उं डु। 1/2 मीटर डूंथी मिंटी डिम डिमरिआ नरर चण्टीन। 2. निपटरा डे डेंडर वरडे चुरिगरे, पडी न धडे नुं रगिडन न। वरडे। मसुडी पाडी न मसिंटी सडेरन सिमडन एिंड न रररर।

डंडर डरडी मरडन: एुगल' रंधं 'डे उमल, पाडी न उंडरगुड' मेरन सें डंडर न डेर सिंरे डुं डिम मंगरीन डेउ डीम डेर मरडे उं। वीडनरड नुं मिरड अमल डिमरडी एिंड डी डंडर वरं। डिमर नुं रंम डे डेर वरडे मसुंडर एुमरी डेड, ठेंडे, धुगर, उरडरर मरडन 'डे डंडर वरं मरडन रंधां' नाल रगुडर डेउ डे धण्टीन लडी मरेले डेडे चण्टीन न। मंगरीन नुं धडे, पधुवर, डेर वीडनरड अडे धरन' डे डेर उरल लरग डे रेंगिआ नरडा चण्टीन। 1.

गमसिंरिड संरंरनार: संरंरनार

क्लोरेट्रानिलिप्रोल (डि.आ.)	18.50% डा/डा/डा
मसुॉरगली मसुॉरगिडिड गुाउर डे-पॉलिमर डिमडीनॉमसडी-पूडिऑनॉमसडी-ड गंडल	3.00% डा/र/डा
इथायिलिनऑक्सिडाईड / प्रोपायलिनऑक्सिडाईड ब्लॉक डे-पीसीन-अर डिथेनसिलेटीड अलरखेल	2.00% डा/र/डा
अटपुलगुाइट क्ले	1.00% डा/र/डा
नैडन रगम	0.25% डा/र/डा
1,2-बेंजिसीथियाडिऑलिन-3-एरल	0.10% डा/र/डा
सिलिकॉन इमलशन	0.50% डा/र/डा
पुंथिलीन गलरडीरॉन	6.80% डा/र/डा
पानी	लेंडीडी मउर'डा' डा/र/डा
रुड:	100.00% डा/र/डा

डिगडरडी: 1. लेखन अडे लीडरट 'डे गिरर वीडीन' इमल अडे वीडं डे डूंटे डिम 'डे डिमडेराल न। वरडे। 2. वरडी उं धाअर डे डिमडेराल' लडी वरडे डिम लडी नुं गींन। 3. डिमडेराल उं धाअर लीडरट 'डे डिंडे निरडेम अडुमर डेंडे नुं नमर वर डिडि। 4. पंडी टांरीमिअ अडे धंर डिमरडे लडी निरडेम' अडे मउर' लडी-लीडरट डेडे।

ऑलमर्ट

क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% एस.सी.

क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% भार /भार एस.सी. (20% मा /आ) हे एक नवीन अेम्थानिलामाईड कीटनाशक आहे. हे एक बहुयोगी कीटनाशक आहे ज्याचा वापर मात, काबी, कापूस, ऊस, टोमॅटो, मिरची, सोयाबीन, वांगी, तुराडा, बाटाण, काळे हलभरे, कादली, मंडी, मका आणि मुरईमुगाच्या पिकावरील कीटकांच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

पीक	कीटकांचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा स.त. (पॅ.)	संरचना (मि.लि.)	पाण्याचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर
चणाडाळ	पोंड बोरर	25	125	500	11
कादली	पोंड बोरर आणि पानांवरीली अळी	20–25	100–125	500	7
हरमरा	पोंड बोरर	20	100	500	20
वांगी	ड्रायमंड बॅक्पाय	40	200	500–750	3
मर्या	ड्रायमंड बॅक्पाय	10	50	500	3
मिरची	ड्रायमंड बॅक्पाय	30	150	500	3
कापूस	अमेरिकन बॉल वर्म, स्पाॅटिड बॉल वर्म, टोबॅको कॅटरपिलर	30	150	500	28
मुईमुंग	टोबॅको कॅटरपिलर	40	200	500	10
मका	स्पाॅटिड स्टेम बोरर, पिक स्टेम बोरर	25	125	500	5
भेंडी	गुम पोंड बोरर,	25	125	500	29
तूरडाळ	गुम पोंड बोरर,	30	150	500–750	29
मात	स्टेम बोरर आणि सीन फ्लौडर	30	150	500	47
सोयाबीन	सीन सॅमिलर, स्टेम मलाय, गडई बीलड	30	150	500–750	22
ऊस	वाळवी	100–125	500–625	1000	208
	अली ट्राय बोरर , टॉप बोरर	75	375	1000	208
टोमॅटो	ड्राय बोरर	30	150	500	3

वापरमाधी निरदेश: (वापरमाधी पद्धत आणि वेळ)
ऊस: वाळवी आणि शेंडे तसेच कोब अळीच्या नियंत्रणासाठी विषाणू मिजवून / माती मिजवून वापर करावा. ऊसातील शेंडे अळीच्या उण्या, ४थ्या आणि पाचव्या विणीच्या नियंत्रणासाठी जून महिन्यात मातीत मिजवून वापर करावा. अन्य पिकांसाठी (मात, कापूस, फवारणी करताना काडीही खाक, पिक, चणू, वाटणा, हलमरा, उडीक, कारले, भेंडी) नोंपसक संख्येवर वापरून किडीच्या संख्येनं आर्थिक दृष्टिने हानीकारक पातळे ओळखून की पानांवर फवारणी या स्वरुपात करा.

वापरण्याची वेळ: कीटकांची संख्या आर्थिक नुकसानीच्या (इटीएल) स्तरावर पोचताच फवारणी करावी.

खबरदारी: 1. लेखनवर कॅटेनर जपून ठेवा म्हणजे अपघाताने विषबाधा झाल्यास डॉक्टरंना दाखवता येईल. लेबल आ पुस्तिकेतील सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यांचे पालन करा. 2. किटकनाशक हुंनु, सूक. हाताळणी करताना रबरी मोजे, गॉगल्स, वेड-यावर मुखवटा आणि सुरक्षात्मक कपडे परिधान करा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करून फवारणीच्या धुम्यामध्ये राहूना टाळा. 3. फवारणी करताना काडीही खाक, पिक, चणू, वाटणा घुसपास करू नका. 4. फवारणी करीताना किती घमनेच्या 3/4 पैशा अधिक करू नका. बंद नोझल पाळत तारने किंवा निचने मोकळी करा, मात्री ती कधीही फुंक्तू नका. 5. शरीरावर सांडल्यास, मरपूर पाण्याने धुवून टाका. 6. किटकनाशक फवारणी करण्यानंतर नेहमी कपडे बदला आणि स्नान करा. 7. खाणे, पिणे, धूम्रपान करण्यापूर्वी आणि हाताळणीनंतर हात आणि शरीराचे उघडे माच घ्या. 8. प्रसूतिके वरचे पुष्पा वापर