

PARTY : PRABHUKRUPA
JOB NAME : RODAZIM CARBENDAZIM 50% WP 250 G
DATE : 06.10.2023
ARTIST : KP

This JPEG / PRINT may not be mached exactly with our Gravure Cylinder Proof.
While every effort has been made to carry out instruction to the customer's satisfaction, we will not be liable for errors not noted on this print. Customers are requested to check the Artwork along with it's dimensions thoroughly before authorising for Engraving.



BLACK



P 5473 C



P 5135 C



P 355 C



P 5473 (10%) C



WHITE

310 mm
15 mm
70 mm
140 mm
70 mm
15 mm

RODAZIM® Carbendazim 50% WP Systemic Fungicide

Chemical Composition : Carbendazim Tech. (based on 98% w/w min) : 51.00% w/w, Surface active agent Alkyl aryl sulfonate : 2.00% w/w, Dispersing agent Alkyl naphthyl sulfonate : 2.00% w/w, Sticking agent Glue / CMC : 2.00% w/w, Inert Carrier -China Clay : 43.00% w/w, **Total : 100.00% W/W. Direction Of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **WARNING :** Pregnant women should avoid contact with Carbendazim formulations. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific anti-dote is known. Treat symptomatically. **First Aid :** Please see enclose Leaflet. **Symptoms :** Please see enclosed Leaflet. **Recommendations :** It is recommended to control blast & sheath blight of paddy, loose smut of wheat & barely, brown rot of maize, powdery mildew of sugar beet, peas, clustur bean, cucurbits, rose & ber, anthracnose of grapes and tobacco, seeding blight of Jute and downy leaf spot of Walnut, damping off of Chillies and scab of Apples etc. **Cautionary statement :** 1. Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

रोडाझीम कार्बेन्डाजिम ५० प्रतिशत समिश्रणीय चूर्ण

रासायनिक संरचना : कार्बेन्डाजिम टेक्निकल (भारानुसार ९८ प्रतिशत स.त. पर आधारित) : ५१.०० %भार/भार, सर्फेस एक्टिव एजेंट — एल्काइल एराइल सल्फोनेट : २.००%भार/भार, डिस्पर्सिंग एजेंट — एल्काइल नेफथाइल सल्फोनेट : २.००%भार/भार, स्टिकिंग एजेंट — ग्लू/सी.एम.सी : २.००%भार/भार, इनर्ट कैरियर — चाईना क्ले : ४३.००%भार/भार, कुल : १००.००%भार/भार । **उपयोग के लिये दिशा—निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें । चेलावनी : गर्भवती महिलाओं को कार्बेन्डाजिम फर्मुलेशन के सम्पर्क से दूर रहना चाहिए । **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानिया :** १.खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २.मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें । ३.छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों अच्छी तरह धोएं । ५.छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें । **विष नाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें । **प्राथमिक चिकित्सा :** कृपया संलग्न लीफलेट देखें । **लक्षण :** कृपया संलग्न लीफलेट देखें । **उपयोग :** इस फफूंदनाशक का उपयोग धान के सहसामरी रोग तथा पूर्ण छेद अगमारी गहुँ और जौ के अनाब्रत केड़, चुकन्दर, मटर, स्वार, ककड़ी गुलाब और बेर के रूसीरोग, अंगूर और रूक्षरोग मिर्च के आद्रमलन, सेब का पामरींग आदि फसलों के फफूंद रोगों की रोकथाम के लिये किया जाता है । **सावधानी कथन:** १.लेबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है । २.फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें । ३. उपयोग के बाद पत्रक में दिये निर्देशानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें । ४. पॉली हाऊस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा—निर्देश और खुराक पत्रक देखें ।

रोडाझिम मायकलोन्यूटेनिल १०% डबल्यूपी (अंतरप्रवाही ड्रूनाशक)

रासायनिक संयोजन: कार्बेन्डाजिम टेक. (न्यूनतम ८८% व/व पर आधारित) : ५१.००% व/व, सपाटी पर सक्रिय तत्व — आल्काइल अरील सल्फोनेट : २.००% व/व, डिस्पर्सिंग तत्व — आल्काइल नैफ्थाइल सल्फोनेट : २.००% व/व, सॉटाइवानु तत्व — गुंटर/सीएमसी : २.००% व/व, चीनाई माटी : ४३.०००% व/व, कुल : १००.०००% व/व. **उपयोग अंगे निर्देश :** इसा ड्रीने उपयोग क्वा पूर्व आ साथे जेडेनु इरडरियुं वांयो. येतवाली : गर्भवती महिलाओअे कार्बेन्डाजिम डोम्युलेशन्सना संपर्कमां आववानुं ठाणुं. **सावधानी :** १. आधाभोराडीथी दूर, आधाभोराडीनां आली वासओ अने पशुचारथी दूर राखुं. २. मोडा, आंभो अने चामडीने अडे नहीं तेनी काणजु राखवी. ३. धूम्रसेरो श्वासमां न जाय तेनी काणजु लेवी. ४. छुटकाव करी लीधा पछी भरडायेलां डपडां अने शरीरना हिस्साओ सारी रीते धोई लेवा. ५. छुटकाव करती वजते धूम्रपान न करवुं तेम ज आरुं—पीवुं नहीं. ६. लेणवती वजते अने छुटकाव करती वजते पूछोपछो रक्षात्मात्मक पहरेवश पहरेवो. **विषभारछा :** डोई ज निश्चित विषभारछा विशे माहिती नथी. लक्षओ अनुसार सारवार करवी. **प्राथमिक उपचार :** डूपया साथे आपेली पत्रिका वांयो. **अर यढथानां लक्षओ :** डूपया साथे आपेली पत्रिका वांयो. **भलामछो :** आनी भलामछा डंगरमांनो सडो अने शीथ व्लाहट, घई अने जवमांनो लुख स्मट, मडाईभानो कथई सडो, शकडरीया, वटाछा इअसी, काकडी, गुलाब अने जोरमांनो लुडी छाओ, ब्रक्षमाना अंशकोठने अंडशमां, सडरजन ना पामा रोग अने बीजा पाडोना डूग रोगोना निशंअा माटे कराय छे. **सावधानी निवेदन:** १. ले न ल अ न पत्रिकाओ पर निर्दिष्ट करेला हेतुओ सिवाय अन्य डोईपाछा हेतु माटे उपयोग करवो नहीं. २. पाकनी डापछी पछी पाकनी जणवाछी माटे आनी उपयोग न करवो. ३. माहिती पत्रिकामा आपेल सूचना मुजब जाती डब्बाओनो नाश करो. ४. निर्देशो/मात्रा पॉली हाउसीस/सीमित विस्ता माटे संबंधित पत्रिकानो संदर्भ लो.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

रोडाझिम

रॉडाझिम

RODAZIM® Carbendazim 50% W.P. रोडाझीम

कार्बेन्डाजिम ५०% संमिश्रणीय चूर्ण

Keep out of the reach of children

CAUTION
सावधान
सावधेती

बच्चों की पहुँच से दूर रखिए

बागडोनी पडोअथी दूर राभो



SYSTEMIC FUNGICIDE
अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक

Net Content 250 g

शुद्ध मात्रा २५० ग्रा

ALBAUGH™
your alternative

Regn. No. : CIR-228867/2022-Carbendazim (WP) (442)-864
पंजी. नं./२रि. नं.: सीआयआर-२२८८६७/२०२२-कार्बेन्डाजिम (डब्ल्यूपी) (४४२)-८६४

Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./६.ता.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

निर्माता और विपणनकर्ता : मेसर्स रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना
सांतक्रुज (पू)बिहांइंड होंडा शोरूम, मुंबई — ४०००९८, महाराष्ट्र
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड
फतेहनगर, मावली, जिल्हा उदयपुर — ३१३२०५, राजस्थान , इंडिया

Batch No. :
बैच नं. :
लेय नं.:

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:

Maximum retail price
inclusive of all taxes
in Indian currency ₹ :

अधिकतम खुदरा मूल्य
सभी करों सहित
भारतीय मुद्रा में ₹ :
वधुमां वधु रीटल किंमत
इसके साथ
भारतीय यथार्थमां ₹ :

Unit sale price per gm ₹ :

Net Content : **250 g** शुद्ध मात्रा : **२५० ग्रा**

For any Complaint contact Customer care Executive
at Registered office, address, Tel.: 180030003335
Email : contactin@albaughllc.com

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours

Read leaflet before use.
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें ।
ઉપયોગ કરતા પહિલા પત્રિકા વાંચો.

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए



RODAZIM®
Carbendazim 50% WP
(Systemic Fungicide)

It is a systemic fungicide containing Carbendazim active ingredient 50% by mass and balance adjuvants.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Diseases	Dosage/HA	Dilution in Water	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	
	A.I. (gm)	Formulation (gm)	(Ltr)		
Apple	Scab	1.25	10ltr/tree	-	
Barley	Loose smut	2.5	1 lt./10kg seed	Wet slurry treatment	-
Ber	Powdery mildew	5	10	10ltr/tree	-
Brinjal	Leaf spot	150	300	600	-
	Fruit rot	150	300	600	-
Chillies	Damping off	1gm/kg seed	2gm/kg seed	1 lt./10kg seed	Wet slurry treatment
Cluster Beans	Powdery mildew	175	350	750	-
Cotton	Leaf Spot	125	250	750	-
Cow Pea	Leaf Spot	150	300	600	-
	Powdery mildew	150	300	600	-
	Collar rot	150	300	600	-
	Anthrachnose	150	300	600	-
Cucurbita	Powdery mildew	150	300	600	-
	Anthrachnose	150	300	600	-
Grapes	Anthrachnose	150	300	600	-
Groundnut	Tikka leaf spot	112.5	225	750	-
Jute	Seedling blight	1gm/kg seed	2gm/kg seed	1 lt./10kg seed	Wet slurry treatment
Moong	Powdery mildew	250	500	750	-
Paddy	Leaf Spot & Web blight	125-250	250-500	750	Wet slurry treatment
	Arial Phase	125-250	250-500	750	Wet slurry treatment
	Blast	125-250	250-500	750	Wet slurry treatment
	Sheath Blight	1gm/kg seed	2gm/kg seed	1 lt./10kg seed	Wet slurry treatment
Peas	Powdery mildew	125	250	600	-
Rose	Powdery mildew	0.5	1	2	-
Sugar beet	Leaf spot	100	200	400	-
	Powdery mildew	100	200	400	-
Tapioca	Set rot	0.5	1	1	-
Tobacco	Frog eye spot	112.5	225	750	-
	Anthrachnose	112.5	225	750	-
Walnut	Downy leaf spot	1.5	3	10ltr/tree	-
Wheat	Loose smut	1gm/kg seed	2gm/kg seed	1 lt./10kg seed	Wet slurry treatment

Direction of Use: Mix required quantity in a small quantity of water to move thick uniform paste. Allowed to soak for 5 to 10 minutes. Add remaining quantity of water slowly while stirring continuously and make up the volume. Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer, ASPEE-HTP power sprayer. **WARNING:** Pregnant women should avoid contact with Carbendazim formulations.

Time of Application: At the time of disease appearance.

Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning: Headache, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, tremors may occur.

First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of fungicide and operators to dispose packages or surplus materials and washings from the machines and containers shall be disposed off in a safe manner, so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the fungicide shall stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition:	
Carbendazim Tech.	51.00% w/w
(based on 98% w/w min.)	
Surface active agent-Alkyl aryl sulfonate	2.00% w/w
Dispersing agent-Alkyl naphthyl sulfonate	2.00% w/w
Sticking agent-Glue/CMC	2.00% w/w
Inert carrier-China clay	43.00% w/w

Total: **100.00% w/w**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

रोडाज़िम कार्बेंडाजिम 50% संमिश्रणीय चूर्ण (अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

यह पेट में जाने पर असर करने वाला फफूंदीनाशक है। जिसमें कार्बेंडाजिम सक्रिय तत्व 50% भार के हिसाब से तथा बाकि सब अन्य सहयोगी पदार्थ हैं।

उपयोग:	फसल	रोग के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)	
सेब	पामा	1.25	2.5	10 ली./ पेड़	—	—	गीला उपचार
जौ	अनावृत कण्ड	1 ग्रा./ किग्रा बीज	2 ग्रा./ किग्रा बीज	1 ली./ 10 किलो बीज	—	—	—
बेर	चूणी आसिता पर्ण चित्ती	5	10	10 ली./ पेड़	—	—	—
बैंगन	फल गलन	150	300	600	—	—	—
मिर्घ	आर्द्र गलन	1 ग्रा./ किग्रा बीज	2 ग्रा./ किग्रा बीज	1 ली./ 10 किलो बीज	—	—	गीला उपचार
नार	चूणी आसिता पर्ण चित्ती	175	350	750	—	—	—
कपास	पर्ण चित्ती	125	250	750	—	—	—
लोबिया	पर्ण चित्ती	150	300	600	—	—	—
मूंगफली	चूणी आसिता मूल स्तम्भ विगलन	150	300	600	—	—	—
ककड़ी	चूणी आसिता रूखा रोग	150	300	600	—	—	—
अमरू	रूखा रोग	150	300	600	—	—	—
मूँगफली	मूँगफली	112.5	225	750	—	—	—
जूट	पौध अंगमारी	1 ग्रा./ किग्रा बीज	2 ग्रा./ किग्रा बीज	1 ली./ 10 किलो बीज	—	—	गीला उपचार
मूँग	चूणी आसिता पर्ण चित्ती तथा जाला अंगमारी	250	500	750	—	—	—
धान	सहसामारी रोग	125—	250—	750	—	—	गीला उपचार
		250	500	750	—	—	गीला उपचार
	पणछेद अंगमारी	1 ग्रा./ किग्रा बीज	2 ग्रा./ किग्रा बीज	1 ली./ 10 किलो बीज	—	—	गीला उपचार
मटर	चूणी आसिता	125	250	600	—	—	—
गुलाब चुल्हर	चूणी आसिता पर्ण चित्ती	0.5	1	2	—	—	—
	चूणी आसिता	100	200	400	—	—	—
तपियोकॉ	सेट विगलन	0.5	1	1	—	—	—
तंबाकू	संडूकाइ चित्ती	112.5	225	750	—	—	—
	रूखा रोग	112.5	225	750	—	—	—
अखरोट	गीली पत्तियों का विगलन	1.5	3	10 ली./ पेड़	—	—	—
गेहूँ	अनावृत कण्ड	1 ग्रा./ किग्रा बीज	2 ग्रा./ किग्रा बीज	1 ली./ 10 किलो बीज	—	—	गीला उपचार

उपयोग के लिए दिशा—निर्देश: पानी को कम मात्रा में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। 5–10 मिण्ट गीला होने के लिए छोड़ दें। शेष पानी की मात्रा हिलते हुए जरूरत के अनुसार मिलाएं। पौध पर बांधकर करने वाला यंत्र तथा शक्ति लागू कर ए.एस.पी.ई.ई.—एच.टी.पी. छिड़काव यंत्र आदि। पौध पर बांधकर छिड़काव करने वाला यंत्र, बेर से चलाने वाला छिड़काव कांस्ट यंत्र पीठ पर बांधकर करने वाला यंत्र तथा शक्ति चालक ए.एस.पी.ई.ई.—एच.टी.पी. छिड़काव यंत्र आदि। **घेतावनी:** गर्भवती महिलाओं को कार्बेंडाजिम फार्मूलेशन के संपर्क से दूर रखना चाहिए।

प्रयोग का समय: रोग के प्रकोप के समय प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: 1. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रहें। 2. मुँह, लवचा और आंखों के संपर्क से बचायें। 3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या निशाने सामूह्य पशु सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण: मिर्तली, उल्टी, कपकपी, शिरदर्द, पेट में दर्द, दस्त हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: 1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। 2. यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। 3. यदि कब्जे और लवचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और लवचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 4. यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलडन/साफ पानी से लगाना 10–15 मिन्ट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

Disposal of Used Container: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of fungicide and operators to dispose packages or surplus materials and washings from the machines and containers shall be disposed off in a safe manner, so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the fungicide shall stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।
खाली डिब्बों का निपटारा: 1. फफूंदीनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है। खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड़ फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। 2. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को खुला हुआ बाहर न छोड़ें और न ही खाद्य पदार्थ व दूसरी चीजें रखने के काम न लाएं। 3. बची हुई फफूंदनाशक तथा यंत्रों के धावन को इस प्रकार निपटारा करें कि जिससे आस—पास के वातावरण तथा पीने का पानी विषम न हो।

संभ्रणन की शर्तें: 1. फफूंदनाशक रख हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुंजी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से 2. जिस कमरे या आलमारी में फफूंदनाशक या मंडारण करना हो व अच्छी तरह बना सूख, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा प्याप्त लंबा चौड़ा होना चाहिए। जिससे कि फफूंदनाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर न हो।

रासायनिक संरचना:	
कार्बेंडाजिम टैक्विकल	51.00% भार /भार
(भारानुसार 98% स.त. पर आधारित)	
Surface active agent-Alkyl aryl sulfonate	2.00% भार /भार
Dispersing agent-Alkyl naphthyl sulfonate	2.00% भार /भार
Sticking agent-Glue/CMC	2.00% भार /भार
Inert carrier-China clay	43.00% भार /भार

Total: **100.00% भार /भार**

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल /लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पत्थी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाइड्रसैस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक—पत्थी देंखें।

रेडॉज़िम

कार्बेंडाजिम 50% संमिश्रणीय चूर्ण

(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

यह पेट में जाने पर असर करने वाला फफूंदीनाशक है। जिसमें कार्बेंडाजिम सक्रिय तत्व 50% भार के हिसाब से तथा बाकि सब अन्य सहयोगी पदार्थ हैं।

उपयोग:

उपयोग:	फसल	रोग के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)	
सेब	पामा	1.25	2.5	10 ली./ पेड़	—	—	गीला उपचार
जौ	अनावृत कण्ड	1 ग्रा./ किग्रा बीज	2 ग्रा./ किग्रा बीज	1 ली./ 10 किलो बीज	—	—	—
बेर	चूणी आसिता पर्ण चित्ती	5	10	10 ली./ पेड़	—	—	—
बैंगन	फल गलन	150	300	600	—	—	—
मिर्घ	आर्द्र गलन	1 ग्रा./ किग्रा बीज	2 ग्रा./ किग्रा बीज	1 ली./ 10 किलो बीज	—	—	गीला उपचार
नार	चूणी आसिता पर्ण चित्ती	175	350	750	—	—	—
कपास	पर्ण चित्ती	125	250	750	—	—	—
लोबिया	पर्ण चित्ती	150	300	600	—	—	—
मूंगफली	चूणी आसिता मूल स्तम्भ विगलन	150	300	600	—	—	—
ककड़ी	चूणी आसिता रूखा रोग	150	300	600	—	—	—
अमरू	रूखा रोग	150	300	600	—	—	—
मूँगफली	मूँगफली	112.5	225	750	—	—	—
जूट	पौध अंगमारी	1 ग्रा./ किग्रा बीज	2 ग्रा./ किग्रा बीज	1 ली./ 10 किलो बीज	—	—	गीला उपचार
मूँग	चूणी आसिता पर्ण चित्ती तथा जाला अंगमारी	250	500	750	—	—	—
धान	सहसामारी रोग	125—	250—	750	—	—	गीला उपचार
		250	500	750	—	—	गीला उपचार
	पणछेद अंगमारी	1 ग्रा./ किग्रा बीज	2 ग्रा./ किग्रा बीज	1 ली./ 10 किलो बीज	—	—	गीला उपचार
मटर	चूणी आसिता	125	250	600	—	—	—
गुलाब चुल्हर	चूणी आसिता पर्ण चित्ती	0.5	1	2	—	—	—
	चूणी आसिता	100	200	400	—	—	—
तपियोकॉ	सेट विगलन	0.5	1	1	—	—	—
तंबाकू	संडूकाइ चित्ती	112.5	225	750	—	—	—
	रूखा रोग	112.5	225	750	—	—	—
अखरोट	गीली पत्तियों का विगलन	1.5	3	10 ली./ पेड़	—	—	—
गेहूँ	अनावृत कण्ड	1 ग्रा./ किग्रा बीज	2 ग्रा./ किग्रा बीज	1 ली./ 10 किलो बीज	—	—	गीला उपचार

उपयोग के लिए दिशा—निर्देश: पानी को कम मात्रा में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। 5–10 मिण्ट गीला होने के लिए छोड़ दें। शेष पानी की मात्रा हिलते हुए जरूरत के अनुसार मिलाएं। पौध पर बांधकर करने वाला यंत्र तथा शक्ति लागू कर ए.एस.पी.ई.ई.—एच.टी.पी. छिड़काव यंत्र आदि। पौध पर बांधकर छिड़काव करने वाला यंत्र, बेर से चलाने वाला छिड़काव कांस्ट यंत्र पीठ पर बांधकर करने वाला यंत्र तथा शक्ति चालक ए.एस.पी.ई.ई.—एच.टी.पी. छिड़काव यंत्र आदि। **घेतावनी:** गर्भवती महिलाओं को कार्बेंडाजिम फार्मूलेशन के संपर्क से दूर रखना चाहिए।

प्रयोग का समय: रोग के प्रकोप के समय प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: 1. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रहें। 2. मुँह, लवचा और आंखों के संपर्क से बचायें। 3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या निशाने सामूह्य पशु सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण: मिर्तली, उल्टी, कपकपी, शिरदर्द, पेट में दर्द, दस्त हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: 1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। 2. यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। 3. यदि कब्जे और लवचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और लवचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 4. यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलडन/साफ पानी से लगाना 10–15 मिन्ट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

Disposal of Used Container: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of fungicide and operators to dispose packages or surplus materials and washings from the machines and containers shall be disposed off in a safe manner, so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the fungicide shall stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. फफूंदीनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है। खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड़ फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। 2. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को खुला हुआ बाहर न छोड़ें और न ही खाद्य पदार्थ व दूसरी चीजें रखने के काम न लाएं। 3. बची हुई फफूंदनाशक तथा यंत्रों के धावन को इस प्रकार निपटारा करें कि जिससे आस—पास के वातावरण तथा पीने का पानी विषम न हो।

संभ्रणन की शर्तें: 1. फफूंदनाशक रख हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुंजी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से 2. जिस कमरे या आलमारी में फफूंदनाशक या मंडारण करना हो व अच्छी तरह बना सूख, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा प्याप्त लंबा चौड़ा होना चाहिए। जिससे कि फफूंदनाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर न हो।

रासायनिक संरचना: कार्बेंडाजिम टैक्विकल (भारानुसार 98% स.त. पर आधारित) Surface active agent-Alkyl aryl sulfonate 2.00% भार /भार Dispersing agent-Alkyl naphthyl sulfonate 2.00% भार /भार Sticking agent-Glue/CMC 2.00% भार /भार Inert carrier-China clay 43.00% भार /भार
Total: **100.00% भार /भार**

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल /लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पत्थी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाइड्रसैस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक—पत्थी देंखें।

रासायनिक संरचना:	
कार्बेंडाजिम टैक्विकल	51.00% भार /भार
(भारानुसार 98% स.त. पर आधारित)	
Surface active agent-Alkyl aryl sulfonate	2.00% भार /भार
Dispersing agent-Alkyl naphthyl sulfonate	2.00% भार /भार
Sticking agent-Glue/CMC	2.00% भार /भार
Inert carrier-China clay	43.00% भार /भार

Total: **100.00% भार /भार**

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल /लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पत्थी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाइड्रसैस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक—पत्थी देंखें।

उपयोग के लिए दिशा—निर्देश: पानी को कम मात्रा में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। 5–10 मिण्ट गीला होने के लिए छोड़ दें। शेष पानी की मात्रा हिलते हुए जरूरत के अनुसार

