

Open Size : (W) : 350mm x (H) : 245mm
Pouch Size : (W) : 165mm x (H) : 245mm

RUDAM[™] Chlorantraniliprole 0.4% GR Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. **Chemical Composition:** Chlorantraniliprole a.i.: 0.40% w/w, Polyacrylic acid: 0.40% w/w, Water: 0.40% w/w, Dodecyl hydroxy poly (oxy-1,2-ethanediyl) phosphate: 0.40% w/w, Calcium lignosulphonate: 1.00% w/w, Dye blue: 0.05% w/w, Talc powder: 8.00% w/w, Sand: QS% w/w, **Total: 100 % w/w.** **Crop and Pest Groups:** It is recommended to control Stem borer and Leaf folder of Rice, Early shoot and Top borer of Sugarcane crop. **Direction of Use:** Read the enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal's feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes, skin and inhalation of the insecticide. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after handling. 4. Do not smoke, drink, eat or chew anything while handling. 5. Wear full protective clothing viz., rubber gloves, goggles, eye/ face shield while handling. **Antidote:** No specific antidote is available, treat symptomatically. **First Aid:** 1. If on skin, wash the contaminated skin with soap and water. 2. If on eyes, flushing with plenty of water is advisable, consult a physician if necessary. 3. If inhaled, no specific intervention is indicated. 4. If swallowed, consult a physician. **Symptoms:** Lethargy, nasal secretion and blurred vision. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

रूदाम क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर कीटनाशक
उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: क्लोरेंट्रानिलिप्रोल: ०.४०% भार/भार, पॉलीएक्रिलिक एसिड: ०.४०% भार/भार, पानी: ०.४०% भार/भार, डोडिसिल हाइड्रोक्सी पॉली (ओक्सी-१,२-इथेनडाइल) फॉस्फेट: ०.४०% भार/भार, कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट: १.००% भार/भार, डाई ब्लू: ०.०५% भार/भार, टाल्क पाउडर: ८.००% भार/भार, बालू: पर्याप्त मात्रा में भार/भार, कुल: १००% भार/भार। फसलों और कीट समूह: चावल का फसल पर लगने वाले तना छेदक एवं पत्ता मोड़क, गन्ने के कोमल तना छेदक तथा शीर्ष छेदक कीटों की रोकथाम के लिए इसकी सिफारिश की जाती है। उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा, आंखों और सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। ३. प्रयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ४. प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ५. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे रबड़ के दस्ताने, चर्म और आँख चहरे का नकाब पहनें। विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षण के अनुसार इलाज करें। प्राथमिक चिकित्सा: १. त्वचा संपर्क पर: त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। २. आँख से संपर्क होने पर: आँखों को खूब सारे पानी से प्रक्षालन करने की सलाह दी जाती है। यदि जरूरी लगे तो चिकित्सक से संपर्क करें। ३. सांस में जाने पर: कोई विशिष्ट उपचार नहीं बताया गया है। ४. निगलने पर चिकित्सक से संपर्क करें। लक्षण: आलस आना, घुंघला दिखना तथा नाक बहना। सावधानियां कथन: १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पच्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसिंग और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक-पच्ची देखें।

रूदाम क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर जंतुनाशक

उपयोग करतां पहलेवां आ साबेना विक्लेटने काणजपुर्वक वांयो. रासायनिक संयोजन: क्लोरेंट्रानिलिप्रोल स.त. : ०.४०% भार/भार, पॉलीएक्रिलिक एसिड : ०.४०% भार/भार, पाणी : ०.४०% भार/भार, डोडिसाईल हाइड्रोक्सीपॉली (ओक्सी-१,२-इथेनडाइल) फॉस्फेट : ०.४०% भार/भार, कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट : १.००% भार/भार, डाई ब्लू : ०.०५% भार/भार, टैल्क पावडर : ८.००% भार/भार, रेती : जड़री मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार. पाकी अने ज्वात समूहो: तेना उपयोगनी भवामण अंगेरना पाकमां स्टेम बोरेर, वीक कोटर अने शेरीना पाकमां घता अर्वां शूट अने टोप बोरेर पर अंकुश माटे करवामां आवे छे. उपयोग माटेना निर्देश: उपयोग करतां पहलेवां आ साबेना विक्लेटने काणजपुर्वक वांयो. वापनार माटे सावयेती: १. भाद्य पद्यां, भाद्य सामग्रीना पावी पात्र अने पशुओंना याराथी दूर राबो. २. मुच, त्वचा अने आंभ ने संपर्कथी भरावो. आ उत्पादनने आसमां जंतु अटकावो. ३. छेटीकावो. ४. छेटीकावो. ५. छेटीकावो. ६. छेटीकावो. ७. छेटीकावो. ८. छेटीकावो. ९. छेटीकावो. १०. छेटीकावो. ११. छेटीकावो. १२. छेटीकावो. १३. छेटीकावो. १४. छेटीकावो. १५. छेटीकावो. १६. छेटीकावो. १७. छेटीकावो. १८. छेटीकावो. १९. छेटीकावो. २०. छेटीकावो. २१. छेटीकावो. २२. छेटीकावो. २३. छेटीकावो. २४. छेटीकावो. २५. छेटीकावो. २६. छेटीकावो. २७. छेटीकावो. २८. छेटीकावो. २९. छेटीकावो. ३०. छेटीकावो. ३१. छेटीकावो. ३२. छेटीकावो. ३३. छेटीकावो. ३४. छेटीकावो. ३५. छेटीकावो. ३६. छेटीकावो. ३७. छेटीकावो. ३८. छेटीकावो. ३९. छेटीकावो. ४०. छेटीकावो. ४१. छेटीकावो. ४२. छेटीकावो. ४३. छेटीकावो. ४४. छेटीकावो. ४५. छेटीकावो. ४६. छेटीकावो. ४७. छेटीकावो. ४८. छेटीकावो. ४९. छेटीकावो. ५०. छेटीकावो. ५१. छेटीकावो. ५२. छेटीकावो. ५३. छेटीकावो. ५४. छेटीकावो. ५५. छेटीकावो. ५६. छेटीकावो. ५७. छेटीकावो. ५८. छेटीकावो. ५९. छेटीकावो. ६०. छेटीकावो. ६१. छेटीकावो. ६२. छेटीकावो. ६३. छेटीकावो. ६४. छेटीकावो. ६५. छेटीकावो. ६६. छेटीकावो. ६७. छेटीकावो. ६८. छेटीकावो. ६९. छेटीकावो. ७०. छेटीकावो. ७१. छेटीकावो. ७२. छेटीकावो. ७३. छेटीकावो. ७४. छेटीकावो. ७५. छेटीकावो. ७६. छेटीकावो. ७७. छेटीकावो. ७८. छेटीकावो. ७९. छेटीकावो. ८०. छेटीकावो. ८१. छेटीकावो. ८२. छेटीकावो. ८३. छेटीकावो. ८४. छेटीकावो. ८५. छेटीकावो. ८६. छेटीकावो. ८७. छेटीकावो. ८८. छेटीकावो. ८९. छेटीकावो. ९०. छेटीकावो. ९१. छेटीकावो. ९२. छेटीकावो. ९३. छेटीकावो. ९४. छेटीकावो. ९५. छेटीकावो. ९६. छेटीकावो. ९७. छेटीकावो. ९८. छेटीकावो. ९९. छेटीकावो. १००. छेटीकावो. १०१. छेटीकावो. १०२. छेटीकावो. १०३. छेटीकावो. १०४. छेटीकावो. १०५. छेटीकावो. १०६. छेटीकावो. १०७. छेटीकावो. १०८. छेटीकावो. १०९. छेटीकावो. ११०. छेटीकावो. १११. छेटीकावो. ११२. छेटीकावो. ११३. छेटीकावो. ११४. छेटीकावो. ११५. छेटीकावो. ११६. छेटीकावो. ११७. छेटीकावो. ११८. छेटीकावो. ११९. छेटीकावो. १२०. छेटीकावो. १२१. छेटीकावो. १२२. छेटीकावो. १२३. छेटीकावो. १२४. छेटीकावो. १२५. छेटीकावो. १२६. छेटीकावो. १२७. छेटीकावो. १२८. छेटीकावो. १२९. छेटीकावो. १३०. छेटीकावो. १३१. छेटीकावो. १३२. छेटीकावो. १३३. छेटीकावो. १३४. छेटीकावो. १३५. छेटीकावो. १३६. छेटीकावो. १३७. छेटीकावो. १३८. छेटीकावो. १३९. छेटीकावो. १४०. छेटीकावो. १४१. छेटीकावो. १४२. छेटीकावो. १४३. छेटीकावो. १४४. छेटीकावो. १४५. छेटीकावो. १४६. छेटीकावो. १४७. छेटीकावो. १४८. छेटीकावो. १४९. छेटीकावो. १५०. छेटीका

Shipper Label (Size: 180mm x 110mm)

रुदाम रुदाम

RUDAM™

Chlorantraniliprole 0.4% GR

रुदाम

क्लोरेट्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर



INSECTICIDE
कीटनाशक

ALBAUGH™
your alternative

PACKING

Regn. No. : CIR-337152/2024-chlorantraniliprole (GR) (452)-881

रजि. नं.: सीआईआर-३३७१५२/२०२४-क्लोरेट्रानिलिप्रोल(जीआर)(४५२)-८८१

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187 उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor,
Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल,
विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पूर्व), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar,
Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर,
तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date / समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:

Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

सभी करों सहित
वधुमां वधु शीटल किंमत ₹: इन्क्लूडिंग ऑफ़

Unit sale price per kg : ₹

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office
address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughilc.com

TM - Trademark

Read enclosed leaflet before use.

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

For agriculture use only.

कृषि उपयोग के लिए।



THIS SIDE UP

PANTONE 654 C

PANTONE 2012 C

10% BASE COLOUR

RUDAM Chlorantraniliprole 0.4% GR (Insecticide) Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR is a novel granular insecticide which contains 0.4% Chlorantraniliprole active ingredient.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Dilution in Water between last spray to harvest (Days)	Waiting Period (Days)
Rice	Yellow Stem Borer (<i>Scirpophaga incertulas</i>) Paddy leaf Folder (<i>Cnaphalocoris medinalis</i>)	40	10	Broadcast 53
Sugar-cane	Early Shoot Borer (<i>Chilo infuscatellus</i>) Top Borer (<i>Scirpophaga excerptalis</i>)	75	18.75	Broadcast 147

Direction of Use:

Uniformly broadcast Chlorantraniliprole granules @ 4 kg/acre in Rice and 7.5 kg/acre in Sugarcane. For Sugarcane, application is to done in furrows at planting or at the base of young emerging shoots along the furrows followed by an irrigation.

Time of Application:

1. 15-35 DAT (Days after transplanting) for Rice.

2. In case of sugarcane, application between planting to 1st irrigation is recommended for Early Shoot Borer while for Top borer application should coincide with appearance of Top borer moths.

Precautions

- Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
- Avoid contact with mouth, eyes, skin and inhalation of the insecticide.
- Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after handling.
- Do not smoke, drink, eat or chew anything while handling.
- Wear full protective clothing viz., rubber gloves, goggles, eye/face shield while handling.

Symptoms of Poisoning:

Lethargy, nasal secretion and blurred vision.

First Aid:

- If on skin, wash the contaminated skin with soap and water.
- If on eyes, flushing with plenty of water is plenty of water is advisable. Consult a physician if necessary.
- If inhaled, no specific intervention is indicated.
- If swallowed, Consult a physician.

Phytotoxicity:

No phytotoxic at recommended stages.

Antidote

No specific antidote is available, treat symptomatically.

Disposal Of Used Container

- The packages shall be broken and buried ½ meter deep in soil away from habitation.
- The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
- Packages by surplus material and wrapping shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions

- The packages containing the insecticide shall be stored in original containers in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide.
- Don't store or consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material.
- The room and premises meant for storing the insecticides shall be well built, cool dry place, well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition	
Chlorantraniliprole a.i.	0.40% w/w
Polyacrylic acid	0.40% w/w
Water	0.40% w/w
Dodecyl hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) phosphate	0.40% w/w
Calcium lignosulphonate	1.00% w/w
Dye blue	0.05% w/w
Talc powder	8.00% w/w
Sand	Q.S % w/w
Total:	100.00% w/w

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

रुदाम क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर (कीटनाशक) क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर एक नवीन ग्रैन्यूल कीटनाशी है जिसमें ०.४% क्लोरेंट्रानिलिप्रोल सक्रिय तत्व के रूप में मिश्रित है।
उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्राम)	संरचना (कि.ग्रा.)	पानी की मात्रा	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
धान	पीत तना छेदक (रिक्पोफागा इन्फैटुलस) धान का पत्ता मोड़क (नैफाला क्रोसिस मेडिनैलिस)	40	10	बिखराव	53
गन्ना	कोमल तना छेदक (काइलो इन्फसकैटेलस) शीशं छेदक (रिक्पोफागा एक्सपर्टलिस)	75	18.75	बिखराव	147

उपयोग के लिये दिशा–निर्देश:

क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ग्रैन्यूल ४ कि.ग्रा. प्रति एकड़ धान के खेत में और ७.५ कि.ग्रा. प्रति एकड़ गन्ने के खेत में एक साथ बिखरे। गन्ने में फरटेरा का प्रयोग हुआई के समय नाली में तथा अंकुरण के समय कल्लों की जड़ों के पास मिट्टी में पकित में डाले और इसके बाद सिंचाई कर दें।

प्रयोग का समय:

- धान की रोपाईं के 15–35 दिन बाद बिखराव करें।
- गन्ने के खेत में हुआई से पहली सिंचाई तक प्रयोग करने पर तना छेदक से बचाव होता है। शीशं छेदक से बचने के लिए शीशं छेदक कीटों के पतंगों दिखते ही प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:

- खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
- मुँह, त्वचा, आंखों और साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें।
- प्रयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
- प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चवाना नहीं चाहिए।
- प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे रबड़ के दस्ताने, चश्मे और ऑख चहरे का नकाब पहनें।

विष के लक्षण:

आलस आना, घुंघुला दिखना तथा नाक बहना।

प्राथमिक चिकित्सा:

- त्वचा संपर्क पर: त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
- आँख से संपर्क होने पर: आंखों को खूब साफ़ पानी से धोखान करने की सलाह दी जाती है। यदि जरूरी लगे तो चिकित्सक से संपर्क करें।
- सांस में जाने पर: कोई विशिष्ट उपचार नहीं बताया गया है।
- निगलने पर चिकित्सक से संपर्क करें।

पौधविषाक्तता:

सिफारिश स्तर में छिड़कने पर पौध विषाक्तता नहीं होती।

विष नाशक:

कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षण के अनुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

- खाली डिब्बों को तोड़ कर जमीन में 1/२ मीटर गहराई में निवास स्थान से दूर मिट्टी में गाड़ दें।
- खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने के लिए बाहर न छोड़ें।
- कीटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि पैकेज, मशीन की घुलाई बची हुई सामग्री आदि की निकासी की व्यवस्था ऐसी सुरक्षित से करना चाहिए, ताकि इनसे पानी, वातावरण व दूरे दूषित न हो, खाली डिब्बों और पैकेज को तोड़कर आबादी से दूर गाड़ देना चाहिए।

संभरहण की शर्तें:

- कीटनाशक के पैकटों को अलग–अलग कमरों या जगहों में अन्य वस्तुएं खाद्य पदार्थों मंडारण किये जाने वाले कमरों या जगहों से दूर कीटनाशक के प्रकार व परिणाम के अनुसार ताला चाबी में बंद करके रखा जाना चाहिए।
- जहां भोजन, पेयजल, तंबाकू आदि संदूषित हो जाए, वैसेी जगह पर इस सामग्री को स्टोर न करें और न ही वहां खाये पीएं।
- जिस कमरे अथवा जगह में कीटनाशक का मंडारण करना हो वह अच्छी तरह बन्ना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार व आयतन में पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए।

रासायनिक संरचना:		
क्लोरेंट्रानिलिप्रोल	0.४०% भार / भार	
पॉलिएक्रिलिक एसिड	०.४०% भार / भार	
पानी	०.४०% भार / भार	
डोडिसिल हाइड्रोक्सिपी फॉस्फेट (ओक्सी-१,२-इथेनडाइल) फास्फेट	०.४०% भार / भार	
कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट	१.००% भार / भार	
डाइ ब्लू	०.०५% भार / भार	
टाल्क पाउडर	८.००% भार / भार	
बालू	पर्याप्त मात्रा % भार / भार	
कुल:	१००.००% भार / भार	

सावधानियां कथन: १. इस लेबल /लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। ३. पत्थी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कटेंकर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउससेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पथी देखें।

ਰੁਦਾਮ ਕਲੌਰੇਂਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 0.4% ਜੀ.ਆਰ. (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ) ਕਲੌਰੇਂਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 0.4% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਜੀਅਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0.4% ਕਲੌਰਾਂਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਪਯੋਗ:

ਫਸਲ	ਕੀਟ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ ਮਾਤਰਾ (ਗ੍ਰਾ.)	ਪਾਣੀ (ਕਿਗ੍ਰਾ.)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਝੋਨਾ	ਪੀਲਾ ਤਨਾ ਛੇਦਕ (ਸਕਪਾਫਾਗਾ ਇੰਫੈਟੁਲਸ) ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮੋੜਕ (ਨੰਵਾਲਾ ਕ੍ਰੌਸਿਸ ਮੇਡਿਨੈਲਿਸ)	40	10	ਪਸਾਰ
ਗੰਨਾ	ਤਨਾ/ਕਣੀ ਛੇਦਕ (ਕਾਇਲੋ ਇਨਫਸਕੈਟੇਲਸ) ਸਿਰਾਂ ਛੇਦਕ (ਰਿਕਪੋਫਾਗਾ ਐਕਸਪਰਟੀਲਿਸ)	75	18.75	ਪਸਾਰ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:

ਕਲੌਰੇਂਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ ਦਾ ਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਗ੍ਰਾ/ਹੈਕੜ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਕਿਗ੍ਰਾ/ਹੈਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਕਸਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਗੰਨੇ ਲਈ, ਰੁਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਤਾਰ ਨਾਲ ਔਰੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੈਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰੋ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ:

- ਚੱਲਾ ਲਈ 15–35 ਡੈਏਟੀ (ਰੁਪਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨ)।
- ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਗੇਤੇ ਟਹਿਣੀ ਛੇਦਕ ਲਈ ਰੁਪਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਦਕਿ ਸਿਰਾਂ ਛੇਦਕ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਾਂ ਛੇਦਕ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:

- ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪਛੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਦੂਰ ਰਖੋਂ।
- ਮੂੰਹ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅਖੌਂ ਦੇ ਛੋਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਾਧ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੱਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਦ ਦੂਸਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
- ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਖਮਾਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।
- ਸੰਭਾਵਣ ਦੋਹਾਨ ਰਕੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਐਨਕ, ਔਖਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੀਲੜ ਵਰਗੇ ਸੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਜਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ:

ਆਲਸ, ਨੌਂਕ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੁੰਪਲਾ ਹੋਣਾ।

ਮੁਢਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:

- ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ।
- ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਔਖਾਂ ਧੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
- ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਖਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਪੌਦ ਜਹਿਰੀਲਪਣ:

ਨਿਰਪਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੌਦ ਜਹਿਰੀਲਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦ।

ਜਹਿਰ ਤੌੜ:

ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਹਿਰ ਤੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖੱਲੀ ਤੌੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:

- ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ 1/2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿਓ।
- ਖਾਲੀ ਤੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਛਿੜਕਾਅ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਂਟਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਰਿਹਦੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਤੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ:

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪੇਕਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਪਛੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਸੰਸਕਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਠੇਕ ਨੱਕਾਂ ਆਦਿ ਖਾਣ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਤੰਡਾਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਮਜਬੂਤ, ਸੌਂਕੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਡਫ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਸ਼ਰਨਾ:

ਕਲੌਰੇਂਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ ਸਰਗਰਮ ਤੌੜ		
ਪੌਲਿਐਕ੍ਰੀਲਿਕ ਐਸਿਡ	0.40% ਭਾਰ / ਭਾਰ	
ਪਾਣੀ	0.40% ਭਾਰ / ਭਾਰ	
ਡੋਡਿਸਾਇਲ ਹਾਇਡ੍ਰੋਕਸਿਪੀਓ (ਆਂਕਸੀ-1,2-ਇਥੇਨਡਾਇਲ) ਫਾੱਸਫੇਟ	0.40% ਭਾਰ/ਭਾਰ	
ਕੈਲ਼ੀਅਮ ਇਗਨੋਸਲਫੋਨੇਟ	1.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ	
ਡਾਇ ਬਲੂ	0.05% ਭਾਰ/ਭਾਰ	
ਟਾਲਕ ਪਾਊਡਰ	8.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ	
ਰੇਤ	ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ % ਭਾਰ/ਭਾਰ	
ਜੋੜ:	100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ	

ਚਿਤਾਵਨੀ: 1. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਲੀਵਲੇਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 2. ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵਰਤੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। 3. ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵਲੇਟ 'ਤੇ ਇੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 4. ਪੋਲੀ ਹਾਊਸਿਸ ਅਤੇ ਬੰਦ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਲਈ-ਲੀਵਲੇਟ ਦੇਖੋ।

Punjabi	Marathi
---------	---------

ਰੁਦाम ਕਲੌਰੇਂਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 0.4% ਜੀ.ਆਰ. (ਕੀਟਕਨਾਸ਼ਕ) ਕਲੌਰੇਂਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 0.4% ਮਾਰ /ਮਾਰ ਜੀ.ਆਰ. ਹੈ एक नाबियेपूर्ण दाणेदार किटकनाशक असून त्यात सक्रिय घटक ०.४% क्लोरान्‌ट्रान्‌िलिप्रोल समाविष्ट आहे.

वापराच्या पद्धति:

पीक	कीटकांचे सामान्य नांव	मात्रा /एचए सामान्य (ग्रा.)	एचए रचना (कि.ग्रॅ.)	पाण्यात पातळ करणे (लि.)	कापणी आणि शेतवऱ्या फवारणी मधील कालावधी (दिवसांत)
मात	यलो स्टेम बोरर (स्करफोफेगा इन्सरटुलस) पॅडी लीफ फोल्डर (नैफाला क्रोसिस मेडिनालिर)	४०	१०	सुरकावणे	५३
ऊस	अर्ली शूट बोरर (काइलो इन्फसकॅटेलस) टॉप बोरर (स्करफोफेगा एक्सपर्टलिस)	७५	१८.७५	सुरकावणे	१४७

वापराचे निर्देश:

भातासाठी ४ कि./एकर आणि ऊसासाठी ७.५ कि./एकर या प्रमाणात क्लोरएंट्रानिलीप्रोलचे दाणे सगळीकडे एकसमान घुरकावे. ऊसासाठी, रोपे लावताना आळ्यात किंवा नवीन कोंब फुटताना आळ्याबरोबरच कोंबांच्या मुळशी टाकावे नंतर सिंचन करावे.

वापराची वेळ:

- भातासाठी १५–३५ डीएटी (रोवणीनंतरचे दिवस).
 - ऊसाच्या बाबतीत, अर्ली शूट बोररसाठी १ रोवणीपासून १ ल्या सिंचनावरच्यान वापर करावा तर टॉप बोररसाठी त्याचे पतंग दिसू लागल्यानंतर वापर करावा.
- वापराणा-यानी घ्यावयाची काळजी:**
- खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहारच्या दूर राखू.
 - स्वासे–स्वास घाटे घेऊ नये त्वचेवर पडू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये. किटकनाशक हुंगणे टाळा.
 - प्रयोगांनंतर लगेचच कपडे घुवा व स्नान करा.
 - प्रयोग करतवेळी खाणे, पिणे धूम्रपान करण तथा पान चढावणे इत्यादी करू नये.
 - हाताळणी करताना संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडे परिधान करा उदा, रबरी मांजे, गॉगल्स, डोळे / चेहऱ्याचा मुखवटा परिधान करावा.

विषबाघेची लक्षणे:

मरगळ, नाकातून रजाव आणि घूसर दृष्टी.

प्रथमोपचार:

- त्वचेवर पडल्यास, प्रदुषित त्वचा साबण आणि पाण्याने घुवा.
- डोळ्यावर पडल्यास, भरपूर पाण्याने घुवावे. आवश्यक वाटल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
- हुंगल्यास, कोणताही विशिष्ट हस्तक्षेप सुचविलेला नाही.
- पोटात गैरव्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

फायटोटॉक्सिसिटी:

निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडांना विषबाघा होत नाही.

विषनाशक:

कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

डबे खोऱ्याची विव्हेटाट:

- वापरल्यानंतर रिकामे डबे न काढ आणि ते वस्तीपासून लांब जमिनीत 1/२ मीटर खाली घुरा.
- वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिंस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून पॅकड्यावर ठेवू नयेत.
- पॅकेजिंस किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डबे यांची विव्हेटाट सुरक्षित प्रकारे आणि पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही याची काळजी घेऊन करावी.

संग्रह करण्याच्या अटी:

- कीटकनाशकाचे डबे त्याच्या मूळ पॅकिंग मधे इतर वस्तू ठेवलेल्या खोली किंवा परिसरापासून लांब वेगळ्या खोली किंवा परिसरात, लहान मुले, पशु आणि पशुखाद्यापासून लांब किंवा एका वेगळ्या कपाटात क्लुपू लावून ठेवावे.
- या औषधाने प्रदुषित झालेल्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ, पेयपदार्थ आणि तंबाकू ठेऊ नका आणि खाऊ नका.
- कीटनाशक साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरडवा, थंड, हवा खेळती राहणाऱ्या आणि पुरेशी क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचना:

क्लोरेंट्रानिलिप्रोल स.त.		
पॉलिएक्रीलिक एसिड	०.४०% भार / भार	
पाणी	०.४०% भार / भार	
डोडिसिल हायड्रोक्सिपिओ (ऑक्सि-१,२-इथेनडाइल) फॉस्फेट	०.४०% भार/भार	
कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट	१.००% भार / भार	
डाय ब्लू	०.०५% भार / भार	
टॅल्क पावडर	८.००% भार / भार	
बालू	पुरेशी मात्रा % भार / भार	
एकूण:	१००.००% भार / भार	

इशारा: १. लेबल आणि निर्देश पत्रिकेत उल्लेख असलेल्या कीटक आणि पिक्नॉथ्रिप्टेस इतर कोणत्याही कीटक आणि पिकांसाठी रिकामे वापर करू नये। ३. पाणी नंतर वापरू नये। ३. वापरल्यानंतर याचा डबे निर्देश पत्रिकेत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावे। ४. पॉिल हाऊसेस आणि निर्धारित क्षेत्रासाठी निर्देश आणि प्रमाण–निर्देश पत्रिका बघा.

રુદામ કલૌરેંટ્રાનિલિપ્રોલ 0.4% ભાર/ભાર જી.આર. (જંતુનાશક) કલૌરેંટ્રાનિલિપ્રોલ 0.4% ભાર/ભાર જી.આર. એક નવું દાણાદાર સંયોજન છે. તેમાં 0.4% કલૌરેંટ્રાનિલિપ્રોલના સક્રિય તત્વનો સમાવેશ થાય છે.

વપરાશ:

પાક	જીવાતનાં સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સ.ત. કોચુંબેશન (ગ્રામ.)	પાણીની માત્રા (લી.)	પાક પરના બે છંટકાવ વચ્ચે નું અંતર (દિવસો)
ડોંગર	યેલો સ્ટેમ બોરર (રિપોફાગા ઈન્સટ(વિસ) પેડી લીફ ફોલ્ડર (નૅફાલાક્રોસિસ મેડિનારિસટ)	40	10	વિખેરો
શેરડી	અર્લી શૂટ બોરર (ક્રાઇલો ઈન્ફસકેટેવસ ટોપ બોરર (રિપોફાગા એક્સટ્રા(વિસ)	75	18.75	વિખેરો