TALANTE™

Thiamethoxam 25% WG — Broad Spectrum Insecticide

Chemical Composition : Thiamethoxam A.I.: 25.00% w/w, Dispersing Agent-Sodium Lignosulphate : 5.00% w/w, Wetting Agent Sodium Lauryl Sulphate 3.75% w/w, Plasticiser- Butylated polyvinyl pyrolidine 1.25% w/w, Carrier Diatomaceous earth 5.00% w/w, Binder corn starch: QS% w/w, **Total : 100.00% w/w. Direction Of Use :** Please read leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers & animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes & skin. 3. Avoid Inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. The product is toxic to honey bees so do not spray during honey bees active foraging period of the day. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid :** 1. If swallowed, include vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms :** Decrease spontaneous movement, tonic, conculsion, ptosis may occur. **Recommendations :** Thiamethoxam 25 % WG is broad spectrum systemic insecticide having quick stomach and contact action and is recommended for its use to control pest of Rice, Cotton; Mango, Wheat, Mustard, Tomato, Brinjal, Tea, Potato, Citrus, Cumin, Okra and soil Drench in Rice and Tomato. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area -Refer the leaflet.

टैलेन्ट™

थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी — **बहुउपयोगी अंतप्रर्वाही कीटनाशक**

रासायनिक संरचना : थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व २५.००% भार/भार, छितरानेवाले तत्व– सोडियम लिग्नोसल्फोनेट ५.००% भार / भार, गीले होने वाले तत्व सोडियम लॉरिल, सल्फेट ३.७५% भार / भार, प्लास्टिसायज़र ब्यूटीलेटेड पॉली विनाइल पायरोलिडॉन १.२५% भार/भार, संवाहक डायएटोओमेशिअस मिट्टी ५.००% भार / भार, बाईन्डर कॉर्न स्टार्च: पर्याप्त मात्रा % भार / भार, **योग : १००.००% भार/भार. उपयोग के लिये निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढे। **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ :** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें। ७. मधुमक्खियाँ अगर खेतों में मैजुद हो तो दवा का छिड़काव न करें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदी मरीज बहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ो को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी में लगभग १० – १५ मिनट तक धुएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **लक्षण :** विष के लक्षण से शरीर में ढीलापन, मिर्गी जैसे झटके और प्टोसिस हो सकता है। **उपयोग :** थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी एक बहुपयोगी अंतप्रवाही कीटनाशक है जो तीव्र उदरीय तथा सस्पर्शी क्रियाशीलता रखता है तथा इसकी सिफारिश धान, कपास, आम, गेहूँ, सरसों, टमाटर, बैंगन, चाय, आलू, निंबू, जीरा, भिंडी मे कीट के नियंत्रण के लिए तथा धान और टमाटर के भूमी उपचार मे किया जाता है। **चेतावनी:** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें. २) फ़सल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें. ४) पॉली हाउसेस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए– पत्रक देखें.

टैलेन्ट™

थायामेथोक्ज़म 25% डब्ल्युजी — **विस्तृत वर्णक्रमनुं अंतरप्रवाही कीटकनाशक**

रासायणिक संयोजन: थायामेथोक्ज़ॅम स.ध.: 25.00% વ/વ, ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ – સોડિયમલિગ્નોસલ્ફેટ: 5.00% વ/વ, ેટિંગ એજન્ટ સોડિયમ લોરીલ સલ્ફેટ 3.750% વ/વ, પ્લાસ્ટિસાઇઝર – બ્યુટાથલેટેડ પોલીવિનાઇલ પાયોલિડિન 1.25% વ/વ, કેરિઅર ડાયાટોમેસીઅસ અર્થ 5.00% વ/વ, બાઇન્ડર કોર્ન સ્ટાર્ચઃ પુરતી માત્રા % ભાર/ભાર, **કુલ 100.000% વ/વ, ઉપયોગ અંગે નિર્દેશઃ** વાપરતાં પહેલાં કૃપયા પરિપત્ર વાંચજો. **સાવધાની :** 1. ખાદ્યાખોરાકીથી દૂર, ખાદ્યાખોરાકીનાં ખાલી વાસણો અને પશુચારાથી દૂર રાખવું. 2. મોઢા, આંખો અને ચામડીને અડે નહીં તેની કાળજી રાખવી. 3. ધૂમ્રસેરો શ્વાસમાં ન જાય તેની કાળજી લેવી. 4. છંટકાવ કરી લીધા પછી ખડાયેલાં કપડાં અને શરીરના હિસ્સાઓ સારી રીતે ધોઇ લેવા. 5. છંટકાવ કરતી વખતે ધૂમ્રપાન ન કરવું તેમ જ ખાવું–પીવું નહીં. 6. ભેળવતી વખતે અને છંટકાવ કરતી વખતે પૂર્ણપણે રક્ષણાત્મક પહેરવેશ પહેરવો. 7. મધમાખીઓ માટે આ રસાયણ વિષાક્ત છે, તેથી જ્યારે મધમાખીઓ સક્રિયપણે મધ એકઠુ કરી રહી તે સમયાવધિ દરમિયાન છંટકાવ કરવો નહીં. **વિષમારણ :** કોઈ જ ચિહ્નિત વિષમારણ જાણમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરવી. **પ્રાથમિક સારવાર:** 1. જો ગળી જવાયું હોય તો, ઊલટી કરાવવા પ્રયાસ ન કરવો. મોઢેથી કંઈ જ આપવું નહીં. 2. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થયાં હોય તો, કડાં કાઢી નાખવાં અને દૂષિત ત્વચા પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી તથા સાબુ વડે સાફ કરવી. 3. જો આંખો દૂષ્ટિ થઈ હોય તો, પુષ્કળ સૅલાઇન/ ચોખ્ખા પાણી વડે 10થી 15 મિનિટ મોટે ધોવી. 4. જો શ્વાસમાં ગયું હોય તો, દરદીને તાજી હવામાં લઈ જવો. **ઝેરની અસરનાં લક્ષણોઃ** સ્વયાલિત હલનચલમાં શિથિલતા, ટોનિક કોન્વૂશન્સ, પ્ટોસિસ થવું સંભવી શકે છે. **ભલામણઃ** થિયામિથોક્ઝોમ 25% ડબ્લ્યુજી પેટમાં ઝડપી કૃતિ અને સ્પર્શીય કૃતિ ધરાવતું બહુઆયામી પ્રણાલીગત જંતુનાશક છે અને ડાંગર, કપાસ, કેરી, ઘઉં, રાય, ટમેટા, રીંગણા, ચા, બટેટા, ખાટાં રસનાં ફળ, જીરું, ભીંડાની જીવાતને કાબૂમાં લેવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવા અને ડાંગર અને ટમેટામાં માટી પલાળવાની ભલામણ છે. **સાવચેતીનું નિવેદનઃ** 1. લેબલ અને પત્રકો પર ઉલ્લેખિત સિવાયના પાક અને જંતુઓ પર ઉપયોગ નહીં કરો. 2. લણણી પશ્ચાત છંટકાવ માટે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઇએ. 3. ઉપયોગ પછી ડબ્બા પત્રકમાં નિર્દેશ અનુસાર નાશ કરો, 4. પોલી હાઉસીસ અને બંધિયાર જગ્યા માટે નિર્દેશ અને માત્રા– પત્રક જુઓ.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

टैलेन्ट | ટાલેન્ટ

TALANTE™

Thiamethoxam 25% WG

टॅलेन्ट

थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी

INSECTICIDE
कीटनाशक

Net Content 1 kg
शुध्द मात्रा १ कि ग्रा

ALBAUGH™
your alternative

Regn. No. : CIR-228715/2022-Thiamethoxam (WG) (442)-1199
पंजी. नं. / २ष्ठि.नं.श्रीआयआर–२२८७१५/२०२२–थायामेथोक्साम (डब्ल्यू जी) (४४२)–११९९
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187 **उत्पादन लाइसेंस नं. / ઉ.લા.નં.:** एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता एवं विपणनकर्ता : मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रूज (पू.), बिहाइंड होंडा शोरूम, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८.

Factory : G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.-Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली, जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत.

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date / समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price ₹: inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત ₹: કરવેરા સાથે
Unit Sale price per gm

Net Content : 1 kg **शुध्द मात्रा : १ कि ग्रा**

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

TM - Trademark

Read enclosed leaflet before use.
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढें ।
ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

Re-entry: 24 hours
For agriculture use only.
कृषि उपयोग के लिए।

QR Code
12 x 12 mm

टॅलेन्ट™

थियामेक्सोथाम २५% डब्ल्यूजी

(बहुउपयोगी यंत्रणांतर्गत कीटकनाशक)

थियामेक्सोथाम २५% डब्ल्यूजी हे एक पोटात आणि संपर्कातून काम करणारे बहुउपयोगी यंत्रणांतर्गत कीटकनाशक आहे आणि यावरी शिफारस भातातील खोड पोखरणारा किडा, गाल मिज, पानं दुमडणारी अळी, रोपावर उडया मारणारा तपकिरी किडा (बीएचपी), रोपावर उडया मारणारा पांढऱ्या पाठीचा किडा (डब्ल्यूबीएचपी), पानावर उडया मारणारा हिरवा किडा, थ्रीप्स यांच्या नियंत्रणासाठी केली जाते. त्यात एक किलोग्राम उपयोजना (भार/भार) सक्रिय घटकमध्ये २५० ग्राम थियामेक्सोथाम असते.

शिफारस:

पीक(के)	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर			सेल्टची स्थानपी आणि डाळपीच्या रास्थान काढण्याचा कालावधी (दिवसांत)
		स.घ. (ग्रम)	निमल (ग्राम)	सौम्यीकरण (लीटर) मध्ये	
भात	खोड पोखरणारा किडा, गाल मिज, पानं दुमडणारी अळी, रोपावर उडया मारणारा तपकिरी किडा (बीएचपी), रोपावर उडया मारणारा पांढऱ्या पाठीचा किडा (डब्ल्यूबीएचपी), पानावर उडया मारणारा हिरवा किडा, थ्रीप्स (पेंडामध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात खोड पोखरणारा किडा, गाल मिज सारख्या भातातील कीटकाच्या नियंत्रणासाठी २१-३० डीएटीच्या एक फवारणी आणि जीएलएच, बीपीएच, डब्ल्यूबीएचच्या पंपरे रोपे डीटीओ नियंत्रणा मोठे पानांतील २५-३० दिवसे पहिले खोडाच्या अगे पीएचे खोडाच पात्र डूटप्याना अगे पानांतील ५० ही ५५ दिवसे)	२५	१००	५००-८००	१४
GPH2	ब्रेऱ्येडह, गालमिज, पान पाणी पुणवारी, ब्रॅडॉई डूई (ब्रॅब्रेयी), ब्रॅडे पेंडनां डूईब्रो (डब्ल्यूबीएचब्रो), तीतां पानगं डूईब्रो (जुबोलेब्रो), थ्रिप्स (डांगरगा पाडगां शुरुवातगा तमडसे ब्रेऱ्येडडो, गाल मिज, जुबोलेब्रो, बीपीएचे, डब्ल्यूबीएचे पंपरे रोपे डीटीओ नियंत्रणा मोठे पानांतील २५-३० दिवसे पहेले खोडाच अगे पीएचे खोडाच पात्र डूटप्याना अगे पानांतील ५० ही ५५ दिवसे)	२५	१००	५००-८००	१४

वापरण्याची सूचना : उपयोजनाची आवश्यक रक्कमी मोजून घ्या आणि थोडया पाण्यात ती चांगली मिसळा. मिनिटिनीत केल्यानामणे राहिलेले पाणी सोयीनुसार स्प्रेयरने पीक संपूर्णपणे व्यापे होण्यासाठी द्रावणून घ्या टाका.

रोप संरक्षण उपकरणे - पाठीवर घेण्याचा स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, पाठीवर घेण्याचा कंप्रेशन स्प्रेयर, पाठीवर घेण्याचा बॅटरी स्प्रेयर, बॅटरीवर चालणारा केपॉवर स्प्रेयर आणि एसपीएझ-एचटीपी पॉवर स्प्रेयर.

सावधगिरी: १. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थाचे डबे आणि पशुखाद्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. ३. फवारायचे तुषार श्वासातून आत जाणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे अवयव स्वच्छ धुवा. ५. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, काहीही खाऊ, पिऊ अथवा चावूचा नका. मिश्रण तयार करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षक कपडे घाला.

विषबाधेची लक्षणे: कमी झालेली उत्स्फूर्त हालचाल, टॉनिक कंप्लुप्सन, टॉनिक होज़ क्लवते.

प्रथमोपचार: १. गिळले गेले असल्यास, मानेच्या पाठी गुदगुल्या करून उलटीला उद्युक्त करा. उलटीचा संपूर्ण द्राव बाहेरपडेपर्यंत हे पुन्हा पुन्हा करा. त्या बेशुद्ध असेल तर उलटीला उद्युक्त करू नका. २. कपडे आणि त्वचा दूषित झाली असेल तर, दूषित कपडे ताबडतोब काढा. दूषित त्वचा पाणी आणि साबणाने चांगली धुवा. ३. डाळे दूषित झाले असतील तर, मीठाच्या/स्वच्छ पाण्याने डोळ्यांवर १० ते १५ मिनिटे झ्रळके मारा. ४. श्वासातून आत गेले असल्यास, रुग्णाला ताज्या हवेत हलवा.

उपाय: विशिष्ट उपाय ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १) अधिकांश रसायनी आणि मोठ्यामोठ्या किंवा यांची पर्यावरणाच्या आणि पाण्याच्या प्रदूषणाला प्रतिबंध होईल अशा सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावावी. २) वापरलेली पॉलिथेन् त्यांचा पुन्हा वापर होणे टाळण्यासाठी इलतरांनी फेकू नयेत. ३) पॉलिथेन् मोडून तोडून सखोलीपासून दूर पुरून टाकावीत.

सावधिगाच्या अटी: १) कीटकनाशक असलेली पॉलिथेन् उपयोजकांच्या द्वारा वस्तू सावधिगाच्या असलेल्या खोल्या किंवा जागांपासून दूर ठेवाव्या दिवाणी सावधानीने किंवा तणनाशाचे स्वतंत्र आणि प्रमाण यासह अवलंबून एका स्वतंत्र कपाटात कुलुपबंद ठेवावीत. २) कीटकनाशक साठवणासाठी असलेल्या खोल्या किंवा जागा वांगल्या बांधकामाच्या, वोरळ्या, हवेशीर, भरपूर प्रकाशाच्या आणि वापरले दूषीतकिरण टाळण्यासाठी पुरेसा आकारमानाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचना:

थियामेथोक्साम स.घ.	२५.००० % भार/भार
हिमसिनि एक्सट्रॉसिडिअम	५.००० % भार/भार
लिग्नोसल्फेट वेटिंग एजन्ट सोडियम	३.७५० % भार/भार
लॉयियर सल्फेट प्लॅस्टीसाइजर - ब्युटाइलेटेड पॉलीविनाइल पायरोलिडोन	१.२५० % भार/भार
कॅरियर डायटोमेशियस अर्थ	५.००० % भार/भार
बाइंडर कॉर्न स्टार्च	६०.००० % भार/भार
एकूण	१००.००० % भार/भार

खबरदारी: या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये.

ٹیلنٹ™

تھایامیتھوکسم ۲۵% ڈبلیو جی

(وسیع پیمانے پر کیڑے مار دوا)

تھایامیتھوکسم 25% ڈبلیو جی وسیع پیمانے پر کیڑے مار دوا ہے جو کہ ٹیلنٹ کے نام سے فروخت کی جاتی ہے۔ یہ دوا چاول کی فصل پر تنے کا چھید کرنے والے کیڑے، پتے کا پتنگا، پتے کا لپیٹنے والا کیڑا، بھورا پودا کیڑا، سفید پودا کیڑا، سبز پودا کیڑا، تنے کا کیڑا اور تھرپس کے خلاف استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی ایک کلوگرام تشکیل میں ایک کلوگرام تھایامیتھوکسم 250 گرام (w/w) شامل ہوتا ہے۔

سفارش:

فصل	کیڑے کا عام نام	مقدار/ہیکٹر			آخری چھڑکاؤ اور فصل کاٹنے کے درمیان وقفہ (دن)
		سرگرم جزو (گرام)	سفارش (گرام)	پانی کی مقدار (لیٹر)	
چاول	تنے کا چھید، مونگا مچھر، پتی مروڑ، بھورا پتی ٹڈا، سفید پیٹھ والا ٹڈا، سبز پتی ٹڈا، بھورا (کوئی کے ۲۱-۳۰ دنوں بعد ایک چھڑکاؤ فصل پر لاروے کے ابھرنے کے شروع آنے کیڑوں جیسے کہ تنا چھید، مونگا مچھر وغیرہ کی روکاوٹ کے لیے تھا دوسرا چھڑکاؤ چھوٹی پتی اوسط (کوئی کے ۶۰ سے ۶۱ دنوں بعد) چاول کی فصل پر بعد کی اوسط میں نمایاں کیڑوں جیسے کہ پتا پتی ٹڈا، ڈبلیو بی پی (پتی پودا) کی روکاوٹ کے لیے کام آتا ہے)	۲۵	۱۰۰	۵۰۰-۷۵۰	۱۴

ایپلیکیشن کے لیے ہدایات: کیڑے مار دوا کی مطلوبہ مقدار کو ناپ کر پہلے تھوڑے سے پانی میں ملائیں۔ اس کے بعد باقی بچے ہوئے پانی کو ڈالیں اور اچھی طرح ہلائیں۔ یہ دوا پودے کے تمام حصوں پر اچھی طرح لگتی ہے۔ یہ دوا پودے کے تنے، پتوں اور جڑوں کے ذریعے جذب ہو کر پورے پودے میں پھیل جاتی ہے۔ یہ دوا کیڑوں کے منہ کے حصوں کے ذریعے جذب ہو کر ان کے نظام انہضام میں داخل ہو کر ان کے اعصاب کو متاثر کرتی ہے۔ یہ دوا کیڑوں کے انڈوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔

احتیاطی تدابیر: ۱. کھانے کی اشیاء، کھانے کے برتنوں اور جانوروں کی خوراک سے دور رکھیں۔ ۲. آنکھوں، منہ اور جلد سے رابطہ سے بچیں۔ ۳. آلودہ ہوا میں سانس لینے سے بچیں۔ ۴. چھڑکاؤ کے دوران اور بعد میں کھانا، پینا یا تمباکو نوشی نہ کریں۔ ۵. چھڑکاؤ کرتے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔

زہر کے اثرات: کم سرگرمی، ٹانک کنولشن، پٹھوں کی کمزوری۔

ابتدائی طبی امداد: ۱. اگر نگل لیا جائے تو قے کرائیں۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو قے نہ کرائیں۔ ۲. اگر کپڑے اور جلد آلودہ ہو جائے تو کپڑے اتار دیں اور جلد کو صابن اور پانی سے دھو دیں۔ ۳. اگر آنکھیں آلودہ ہو جائیں تو آنکھوں کو 10 سے 15 منٹ تک پانی سے دھوئیں۔ ۴. اگر سانس لینے سے زہر جسم میں داخل ہو جائے تو مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں۔

تریاق: کوئی مخصوص تریاق نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

استعمال کے بعد کنٹینر کا نمٹان: ۱. کیڑے مار دوا کے خالی کنٹینرز کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔ ۲. کنٹینرز کو ماحول دوست طریقے سے تلف کریں تاکہ ماحول اور آبی وسائل کی آلودگی سے بچا جا سکے۔ ۳. کنٹینرز کو توڑ کر اچھی طرح جلا کر تلف کریں۔

ذخیرہ کرنے کی ہدایات: ۱. پیکیجنگ کو اصل کنٹینر میں ذخیرہ کریں۔ ۲. ذخیرہ کرنے کی جگہ کو خشک، ہوادار اور روشن رکھیں۔ ۳. ذخیرہ کرنے کی جگہ کو کھانے، پینے اور جانوروں کی خوراک سے دور رکھیں۔

کیمیائی ترکیب:

تھایامیتھوکسم a.i.	25.000% w/w
ڈسپرسنگ ایجنٹ سوڈیم لگنوسلفیٹ	5.000% w/w
ویٹنگ ایجنٹ سوڈیم لگنوسلفیٹ	3.750% w/w
پلاسٹیسائزر - بیوٹائلیٹڈ پولی وینائل پائرولیڈون	1.250% w/w
کیریئر ڈائیٹومیسیئس ارتھ	5.000% w/w
بائنڈر کارن اسٹارچ	60.000% w/w
کل	100.000% w/w

احتیاط: اس لیبل/پمفلٹ پر درج شدہ فصلوں کے علاوہ دوسری فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

ટૈલેન્ટ™

થાયામેથોક્ઝેમ ૨૫% ડબ્લ્યુજી

(વિસ્તૃત વર્ણકમનું અંતર્પ્રવાહી કીટકનાશક)

થાયામેથોક્ઝેમ 25% ડબ્લ્યુજી વિસ્તૃત વર્ણકમનું સર્વાંગી કીટકનાશક છે, જે તીવ્ર ઉદરીય અને સંપર્કથી ક્રિયાશીલતા ધરાવે છે અને આવી ભલામણ ડાંગરના પાકમાં પડતી થડચોક્ક, ગાલમિજ, પાન વાળતી જુવાળે, થ્રક્કર્ર ફૂડાં (બ્રેબ્રેયો), સફેદ પીઠનાં ફૂડાંબો (ડબ્લ્યુબીપીબો), લીલાં પાનનાં ફૂડાંબો (જુબોલેબો), ઈપ્રાના નિયંત્રણ માટે વાપરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. સક્રિય ઘટક તરીકે એક કિ.ગ્રા.પ્રોડક્ટમાં થાયામેથોક્ઝેમ 250 ગ્રામ (ગ/ગ) આમાં સમાવિષ્ટ છે.

ભલામણ:

પાક	કીટકોનાં સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર			છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધીનો પ્રતીક્ષા સમય (દિવસો)
		સ.ઘ. (ગ્રામ)	ફૂગ્મ્યુલેશન (ગ્રામ)	મંદ પાડવા પાણી (લીટર)	
GPH2	ભેરુંયેહડ, ગાલમિજ, પાન વાળતી જુવાળે, થ્રક્કર્ર ફૂડાં (બ્રેબ્રેયો), સફેદ પીઠનાં ફૂડાંબો (ડબ્લ્યુબીપીબો), લીલાં પાનનાં ફૂડાંબો (જુબોલેબો), થ્રિપ્સ (ડાંગરગા પાકમાં શરૂઆતના તબક્કે ભેરુંયેહડો, ગાલ મિજ, જુબોલેબો, બીપીએચ, ડબ્લ્યુબીપીએચ વગેરે રોપવે ડીટીઓ નિયંત્રણ માટે પાનદીઠ 25-30 દિવસે પહેલે ખોડાય અને બીજી ખોડાય પાન ફૂટયાના સમયે પાનદીઠ 50 થી 55 દિવસે)	૨૫	૧૦૦	૫૦૦-૮૦૦	૧૪

વપરાશ અને દિશૂચના: પ્રોડક્ટને માપ પ્રમાણે કાઢી અને તેને થોડા પ્રમાણમાં પાણી સાથે ભેળવો. દિશૂચનાનુસાર બાકીનું પાણી ઊમેરો અને સારી રીતે હલાવીને પાકમાં સંપૂર્ણ રીતનો આવરી તે એવરાંનું સ્પ્રાયર તૈયાર કરો.

પી. પી. ઉપકરણો - બેકપેક સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન બેકપેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન બેકપેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન બેકપેક બેટરી સ્પ્રેયર અને કમ્પ્રી-એચટીપી પાવર સ્પ્રેયર.

સાવધાની: ૧. ખાદ્યખોરાકીથી દૂર, ખાદ્યખોરાકીમાં ખાલી પાત્રરો અને પશુચારાથી દૂર રાખવું. ૨. મોઢા, આંખો અને ચામડીને અડે નહીં તેની કાળજી રાખવી. ૩. ધૂમ્રપાનો શ્વાસમાં ન જાય તેની કાળજી રાખી. ૪. છંટકાવ કરી લીધા પછી ખરાબરોને કપડાં અને શરીરના હિસ્સાઓ સારી રીતે ધોઈ લેવા. ૫. છંટકાવ કરતી વખતે ધૂમ્રપાન ન કરવું તેમ જ ખાવું-પીવું નહીં. ૬. લેબલની વાપરે અને છંટકાવ કરતી વખતે પૂરાંધોરો રક્ષણાત્મક પહેરવેશ પહેરવો.

ઝેરની અસરનાં લક્ષણો: સ્વયાલિત હલચલનાં મિશિલતા, ટોનિક કોન્યુલશન્સ, પ્રોસિસ થવું સંભવી શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર: ૧. જો ગળી જવામાં હોય તો, ઊલટી કરાવવા પ્રયાસ ન કરવો. બેહોશી કંઈજ આપવું નહીં. ૨. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થયાં હોય તો, કપડાં કાઢી નાખવાં અને દૂષિત ત્વચા ધુઓ પ્રમાણમાં પાણી તથા સાબુ વડે ત્રણ કરવી. ૩. જો આંખે દૂષિત થઈ હોય તો, પુષ્કળ સેંતાલંત/ચોખા પાણી વડે 10 થી 15 મિનિટ માટે ધોવી. ૪. જો શ્વાસમાં ગયું હોય તો, દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જવો.

વિષમારક: કોઈ જ નિશ્ચિત વિષમારક જાણમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરવી.

વપરાયેલાં કન્ટેઈનરોનો નિકાલ: ૧. નિરાકરણકારક કેમિકલ્સ ઉત્પાદકો તથા ઓર્ગેનોઈ ક્રાફ્ટ રહેલો કે, તેમણે પેકેજીંગ અને વપરાયાં મેટિરિયલ્સ અને માલિક અને કન્ટેઈનરોની ધોવાઈને સુરક્ષિતપણે નિકાલ કે રીતે કરવો કે, પર્યાવરણ તથા જળપ્રદૂષણ થવું નિવારી શકાય. ૨. તેમને કેઈપ્યોગ નિવારવા માટે વપરાયેલાં પેકેજીસને ખાલ કરેલાં અને છોડવાં. ૩. પેકેજીસને તોડી નાખવાં અને વપરાયેલી દૂરની જગ્યાએ દાટી દેવાં.

સંગ્રહ સ્થિતિઓ: ૧. જંતુનાશક ધરાવતા કન્ટેનરને અન્ય વસ્તુઓ, ખાદ્ય કરીને ખાદ્યસામગ્રીઓ સંગ્રહ કરવાની ખોડડીઓ, ખાલમાં ખોડડીઓમાં અથવા જ્યાંથી પ્રાણીઓ ખાઈને અટકા કરાવીને તાળા-ચાવી દ્વારા રાખવા જોઈએ. ૨. જંતુનાશકો સંગ્રહિત કરવાની ખોડડીઓ અલગ જગ્યાએ સારી રીતે બંધાયેલી, સુકી, અને પૂરતી હવા-ઉજવરપાણી અને ધ્રુવકેશથી પ્રકુષ્ટતા ન ફેલાય તેવી પૂરતી મોકળાશવાળી હોવી જોઈશે.

રાસાયણિક સંયોજન:

થાયામેથોક્ઝેમ સ.ઘ.	25.000% ગ/ગ
ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફેટ	5.000% ગ/ગ
વેટિંગ એજન્ટ સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફેટ	3.750% ગ/ગ
પ્લાસ્ટિસાઇઝર - બ્યુટાઇલેટેડ પોલીવિનાઇલ પાયરોલિડોન	1.250% ગ/ગ
કેરિયર ડાયટોમેશિયસ અર્થ	5.000% ગ/ગ
બાઇન્ડર કોર્ન સ્ટાર્ચ	60.000% ગ/ગ
કુલ	**100.000% ગ/ગ**

સાવધાની: આ લેબલ/પત્રિકા પર ઉલ્લેખિત સિવાયના અન્ય પાક પર ઉપયોગ ન કરવો.

टैलेन्ट™

थायामेथोक्साम 25% डब्ल्यू जी

(बहुउपयोगी अंतरप्रवाही कीटनाशक)

थायामेथोक्साम २५ डब्ल्यू जी एक बहुपयोगी अंतर्प्रवाही कीटनाशक है जो तीव्र उदरीय तथा सम्पर्क क्रियाशीलता रखता है तथा इसकी सिफारिश धान की फसल पर लगने वाले तना छेदक, भालू मच्छी, पत्ती मोड़क, भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पीठ्या टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा, बुरुवा की रोकथाम के लिए किया जाता है। इसमें उत्पादन के प्रति किलो (ग/ग) में २५० ग्राम थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व के रूप में है।

ऐप्लीकेशन :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा			अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
		स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (ग्रा.)	पानी की मात्रा (लीटर)	
धान	तना छेदक, भालू मच्छी, पत्ती मोड़क, भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पीठ्या टिड्डा हरा पत्ती टिड्डा, बुरुवा (रोपाई के २५-३० दिनों बाद एक छिड़काव फसल पर लगने वाले कीटों के शुरू आती कीटों जैसे कि तनाछेदक, भालू मच्छी आदि की रोकथाम के लिए तथा दूसरा छिड़काव छोटी पत्ती उत्पन्न (रोपाई के ६० से ५१ दिनों बाद) धान की फसल पर बर्ड की अवस्था में नामेवाले कीटों जैसे कि हरा पत्ती टिड्डा, डब्ल्यू बी पी (पत्ती पौधा) की रोकथाम के लिए करें।)	२५	१००	५००-७५०	१४

उपयोग के लिये निर्देश : कीटनाशक की आवश्यक मात्रा को माप कर पहले थोड़े से पानी में मिलाए। उसके बाद पानी निर्धारित मात्रा मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल तैयार किये उपयुक्त स्प्रेयर की मदद से पूरी फसल पर छिड़काव करें। उपयोग में आने वाले यंत्र - नैपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसेक बैटरी स्प्रेयर, बैटरी से चलने वाला पावर स्प्रेयर और एस.पी.ई - एच .टी.पी. पावर स्प्रेयर।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानिया : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली कॉन्ट और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण : शरीर में ढीलापन झटके (मिर्गी), पुटोसिस हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. पर्यावरण तथा पानी का प्रदूषण बचाने कि लिए डिबे, बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनों की धोवन और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। २. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजो को बाहर न छोड़े देना चाहिए इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है। ३. पैकेजों/डिब्बों को तोड़-मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के स्थान के संग्रहण के लिए प्रयोग किए जा रहे कमरों या झमरतो से दूर अलग कमरों या झमरतों में अथवा अलग से तालाबन्द आलमारियों में कीटनाशक की प्रकृति और मात्रा के आधार पर रखना चाहिए। २. कीटनाशकों के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या झमरतें मजबूत, पुक्ती, भली भांति प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वाष्प न हो सके।

रासायनिक संरचना :

थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व	२५.००० % भार/भार
छितरानेवाले तत्व सोडियम लिगनोसल्फोनेट	५.००० % भार/भार
गीले होने वाले तत्व सोडियम लॉरील सल्फेट	३.७५० % भार/भार
प्लास्टिसायजर ब्यूटीलेटेड पॉली विनाइल पायरोलिडॉन	१.२५० % भार/भार
संवाहक डायओमेशियस अर्थ	५.००० % भार/भार
बाईन्डर कॉर्न स्टार्च	६०.००० % भार/भार
योग	**१००.००० % भार/भार**

चेतावनी : इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

TALANTE™

Thiamethoxam 25% WG

(Broad spectrum Insecticide)

Thiamethoxam 25% WG is broad spectrum systemic insecticide having quick stomach and contact activity and is recommended for its use to to control Stem Borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BHP), While Backed Plant Hopper (WBPH) Green Leaf Hopper (GLH), Thrips, in rice It contains 250g Thiamethoxam as an active in ingredient in a kg of the product (w/w).

Recommendation :

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosages/Ha			Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		A.I. (gm)	Formulation (gm)	Dilution in (Ltr)	
Rice	Stem borer, Gall Midge Leaf Folder Brown Plant Hopper (BPH), White backed Plant Hopper (WBPH), Green leafhopper, Thrips (One spray at 26-30 DAT in the early stage of crop for control of early rice pests such as Stem Borer, Gall Midge & the control of late rice pests such as GLH, BPH, WBPH etc.)	25	100	500-700	14

टैलेन्ट™

थायामेथोक्साम 25% डब्ल्यू जी

(बहुउपयोगी अंतरप्रवाही कीटनाशक)

Manufactured by:
Rotam Crop Protection Private Limited
G-155, Riico Industrial Area, Sanwad,
Fatehnagar, Tal. Mavli, Dist. Udaipur,
Rajasthan-313205, INDIA.

निर्माता:
रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड,
फतेहनगर, ता. मावली, ज़िला उदयपुर,
राजस्थान-३१३२०५, भारत।

Marketed by:
Rotam Crop Protection Private Limited
Regd. Office: 175, Kagalwala House, 2nd Floor,
Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E),
Behind Honda Showroom, Mumbai,
Maharashtra-400098, INDIA.

विपणनकर्ता:
रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
रजि. ऑफिस: १७५, कागलवाला हाऊस,
दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना,
सांताक्रुज (पू.), बिहाइंड होंडा शोरुम, मुंबई,
महाराष्ट्र-४०००९८, भारत.

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 18002008400, Email: contactin@rotam.com

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए

Direction of Use : Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with through agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.
P. P. Equipment - Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, Compression knapsack battery sprayer, Battery operated kpower sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foostuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouths, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning : Decrease spontaneous movement, tonic conulsion, ptosis may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container : 1. Packages or surplus materials and washing from machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environment and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and burned away from habitation.

Storage Conditions : 1. The package containing the insecticide should be stored in original containers inseparate rooms or premises away from rooms or premises used for storing other article particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be built, dry well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Thiamethoxam a.i.	25.000% w/w
Dispersing Agent sodium Lignosulphate	5.000% w/w
Wetting Agent Sodium Lauryl Sulphate	3.750 % w/w
Plasticiser - Butylated Polyvinyl Pyrrolidine	1.250 % w/w
Carrier Diatomaceous earth	5.000% w/w
Binder corn starch	60.000% w/w
Total	**100.000% W/W**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this Label / Leaflet.

READ ENTIRE LEAFLET BEFORE USE.

प्रयोग से पहले पूरी पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़े।

TALANTE™

Thiamethoxam 25% WG

(Broad spectrum Insecticide)

टैलेन्ट™

थायामेथोक्साम 25% डब्ल्यू जी

(बहुउपयोगी अंतरप्रवाही कीटनाशक)

ALBAUGH™
your alternative

ট্যালেণ্ট™

থয়ামেথক্সাম 25% ডব্লুজি
(ৰহল উপযোগৰ অন্তৰ্দ্ৰবাহক কীটনাশক)

থয়ামেথক্সাম 25% ডব্লুজি কণি সিঞ্চন কৰক যাতে সমানে সিঞ্চন হয় আৰু প্ৰতি লিটাৰ পানীত ৪ গ্ৰাম কণি মিহলাব লাগে। কণিত সিঞ্চনীৰ ১০ মিঃ মিঃ পানী যোগ কৰক যাতে ঘননীয়তাৰ সামঞ্জস্য ৰখাব পাৰি। সিঞ্চনীৰ ১০ মিঃ মিঃ পানী যোগ কৰক যাতে ঘননীয়তাৰ সামঞ্জস্য ৰখাব পাৰি।

ক্ৰম(ক্ৰ)	কীটনাশ মাত্ৰাৰ নাম	মাত্ৰা(গ্ৰাম/হেক্টৰ)			আৰ্থিক মূল্য* (টকাত)(প্ৰতি হেক্টৰ)
		এ.ই. (গ্ৰাম/মি)	ডব্লুডব্লুপি (গ্ৰাম/মি)	ডব্লুডব্লুজি (গ্ৰাম/মি)	
1a	ফাৰ্ম ৰোয়া ঘূৰ্ণায়মান, গৰ্ড মিষ্ট, ৰুচি মাছৰি, ৰুচি কাছৰা, মিচু মিচি ঝিঙ্গা মিচু মিচুৱা গৰ ৰুচি, মিচু ৰুচি, ৰুচি মাছৰি, ৰুচি কাছৰা (১০ম প্ৰণয়ন প্ৰজৰি) ফাৰ্ম ৰোয়া ঘূৰ্ণায়মান, গৰ্ড মিষ্ট লাগৰি ইমিডাক্লোপ্ৰিড থায়ামেথক্সাম মিচুমেথিন 25-30 ডব্লিউ ডি পিচৰণ ২.৫ মিচৰণ ৪ মিচৰণ ১ মিচৰণ মিচু লাগৰি 50 মিচৰণ 55 ডিগ্ৰেচ ৰবাৰ মাৰ্ডিগ, জৰ্দৰ্ দ্ৰবিণ মিচৰণ ইমিডাৰ, ৰুচি মাছৰি ৰুচি কাছৰা, ৰুচি মাছৰি ৰুচি কাছৰা, ৰুচি মাছৰি ৰুচি কাছৰা