

PARTY : PRABHUKRUPA
JOB NAME : TOTAPRO MYCLOBUTANIL 10% WP 100 G
DATE : 19.08.2023, 21.08.2023
ARTIST : KP

This JPEG / PRINT may not be mached exactly with our Gravure Cylinder Proof.
While every effort has been made to carry out instruction to the customer's satisfaction, we will not be liable for errors not noted on this print. Customers are requested to check the Artwork along with it's dimensions thoroughly before authorising for Engraving.



TOTAPRO™

Myclobutanil 10% WP
(Systemic Fungicide)

Chemical Composition: Myclobutanil a.i. : 10.00% w/w; Silica : 11.30% w/w; Sodium ligno sulfonate : 6.00% w/w; Alkyl naphthalene sulphonate of sodium : 2.00% w/w; Clay : Q.S.; **Total : 100.00% w/w.** **Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat Symptomatically. **First Aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, irritation to bronchi and lungs tissues may occur. **Recommendations :** It is used to control powdery mildew of Grape, scab of Apple and Powdery mildew, Leaf spot, die back of Chillies. **Cautionary statement :** 1. Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area refer to the leaflet.

टोटाप्रो

माइक्लोबूटानिल १०% धुलनशील पाउडर
(अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक)

रासायनिक संरचना: माइक्लोबूटानिल स.त. : १०.००% भार/भार, सिलिका : ११.३०% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ६.००% भार/भार, एलकाइल नेफथालीन सल्फोनेट ऑफ सोडियम : २.००% भार/भार, क्ले : Q.S.; **कुल : १००.००% भार/भार। उपयोग के लिये दिशा-निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसम्पत्तियों, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, लंबा और आँखों के संपर्क से बचें। ३. छिड़काव की वायु को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचाएँ। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूधित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ घबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनिवारक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाय तो गले के पीछे गुठली करके उल्टी कराएँ यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि निगल बर्तन हो तो उल्टी न करावें। २. यदि कपड़े और लंबा दूधित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूधित लंबा को कपड़े मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ। ३. यदि आँखें दूधित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में साबुन/साफ पानी से लवण १०-१५ मिनिट तक धोएँ। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **संरक्षण:** जी मितलाना, उलटी, पेट में दर्द, दस्त, फेफड़ों और साँस की नलियों में खुजलाहट हो सकते हैं। **उपयोग:** इसका प्रयोग अंगूर के चूर्ण फफूंद, सेब का चामा तथा मिर्च के पर्ण दाग चूर्ण फफूंद व फण्डाट (डाय बेंक) के रोकथाम के लिए किया जाता है। **सावधानी कथन:** १. लेबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें। ३. उपयोग के बाद पत्रक में दिये निर्देशानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें। ४. पॉली हाऊस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश और खुराक पत्रक देखें।

टोटाप्रो

माइक्लोबूटानिल १०% डबल्यूपी
(अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक)

रासायनिक संरचना: माइक्लोबूटानिल स.त. : १०.००% भार/भार, सिलिका : ११.३०% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ६.००% भार/भार, एलकाइल नेफथालीन सल्फोनेट ऑफ सोडियम : २.००% भार/भार, क्ले : Q.S.; **कुल : १००.००% भार/भार। उपयोग के लिये दिशा-निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसम्पत्तियों, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, लंबा और आँखों के संपर्क से बचें। ३. छिड़काव की वायु को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचाएँ। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूधित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ घबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनिवारक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाय तो गले के पीछे गुठली करके उल्टी कराएँ यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि निगल बर्तन हो तो उल्टी न करावें। २. यदि कपड़े और लंबा दूधित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूधित लंबा को कपड़े मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ। ३. यदि आँखें दूधित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में साबुन/साफ पानी से लवण १०-१५ मिनिट तक धोएँ। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **संरक्षण:** जी मितलाना, उलटी, पेट में दर्द, दस्त, फेफड़ों और साँस की नलियों में खुजलाहट हो सकते हैं। **उपयोग:** इसका प्रयोग अंगूर के चूर्ण फफूंद, सेब का चामा तथा मिर्च के पर्ण दाग चूर्ण फफूंद व फण्डाट (डाय बेंक) के रोकथाम के लिए किया जाता है। **सावधानी कथन:** १. लेबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें। ३. उपयोग के बाद पत्रक में दिये निर्देशानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें। ४. पॉली हाऊस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश और खुराक पत्रक देखें।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

टोटाप्रो

टोटाप्रो

TOTAPRO™
Myclobutanil 10% WP

टोटाप्रो

माइक्लोबूटानिल 10% धुलनशील पाउडर



SYSTEMIC FUNGICIDE

अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक

Net Content 100 gm

शुद्ध मात्रा १०० ग्राम



TM - Trademark

Regn. No. : CIR-229982/2022-Myclobutanil (WP) (442)-224
पंजी. नं./रजि. नं.:सीआयआर-२२९९८२/२०२२- माइक्लोबूटानिल (डब्ल्यूपी) (४४२)-२२४
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./G.O.A.N.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

निर्माता और विपणनकर्ता : मेसर्स रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सान्ताक्रुज (पु) बिहाईंड होंडा शोरूम, मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्र
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड फतेहनगर, मावली, जिल्हा उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, इंडिया

Batch No. :
बैच नं. :
वैश्व नं. :

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
G.P.A.E.N तारीख :

Exp. Date :
समाप्त तिथि :
अवधी समाप्ति तारीख :

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹ :

अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :

पधुमां पधु शिवा डिमंत इत्येसा साथे

भारतीय चलधमां ₹ :
Unit sale price per gm ₹ :

Net Content : 100 gm शुद्ध मात्रा : १०० ग्राम

For any Complaint contact Customer care Executive at Registered office, address, Tel.: 180030003335
Email : contactin@albaughllc.com

Read leaflet before use.
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।
उपयोग करता पहिला पत्रिका पांयो.

Re-entry:
24 hours

For Agricultural Use कृषि उपयोग के लिए



