

# ACARAMIK™ 18 EC

**ABAMECTIN PUTIH**  
**TERBARU & TERMURAH DI KELASNYA !!**



**Memiliki kualitas yang handal  
tanpa endapan dan mudah larut**

**PT Rotam Indonesia**  
Palma One Building, 3rd Floor, Unit 302.  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 no. 4,  
Kuningan- Jakarta Selatan  
Telp. 021 52907112- Fax. 021 52907115  
[www.rotam.com](http://www.rotam.com)



Mengapa harus **ACARAMIK® 18 EC**? Lihat metode produksi berikut..

## TEKNIS TANGKI ABAMEKTIN



Dulangan pertama  
95% Abamektin murni

Dulangan kedua  
65% - 70% Abamektin murni

Dulangan ketiga  
25% - 30% Abamektin murni

Sisa endapan dari zat aktif lain



PERHATIAN



Perhatian : Bacalah label kemasan secara seksama sebelum menggunakan insektisida ini.  
Simpan di tempat yang kering dan tertutup, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Tanaman	Hama	Konsentrasi/Dosis Formula Vol Air	Cara dan waktu aplikasi
Cabai	Kutu Daun ( <i>Aphids SP</i> )	0.5 - 1 ml/l (Vol 500-600L)	Aplikasi dilakukan segera setelah serangan hama terlihat, Aplikasi secara berulang dengan interval 5-7 hari saat serangan rendah. Dan dilakukan aplikasi dengan interval 4 hari pada saat serangan tinggi.
	Kutu Kebul ( <i>Bemisia Tabacci</i> )		
	Tungau ( <i>Tetranychus SP</i> )		
Bawang	Kutu Daun ( <i>Aphids SP</i> )	0.5 - 1 ml/l (Vol 500-600L)	
	Ulat Bawang ( <i>Spodoptera Exigua</i> )		
Tomat	Kutu Daun ( <i>Aphids SP</i> )	0.5 - 1 ml/l (Vol 500-600L)	
	Ulat Penggorok ( <i>Liryomiza SP</i> )		
Jeruk	Kutu Daun ( <i>Aphids SP</i> )	0.5 - 1 ml/l (Vol 500-600L)	
Padi	Hama Sundep dan Beluk	1 - 2 ml/l (Vol 250-300 L)	Aplikasi dilakukan pada saat mulai penetasan telur dan imago (Kupu-Kupu) berada di sekitar.