



FUNGISIDA SUPER SISTEMIK CHLOROTALONIL + DIMETOMORPH

CEPAT MELINDUNGI
CEPAT MENGOBATI

COMBO 2 SUPER



01 FUNGISIDA SUPER SISTEMIK,
PROTEKTIF, DAN KURATIF

02 MENGIMUNISASI TANAMAN,
SEHINGGA TANAMAN LEBIH KEBAL
TERHADAP JAMUR DAN BUSUK

03 ANTI SPORULASI SEHINGGA JAMUR
TIDAK DAPAT BERKEMBANG

04 MENGENDALIKAN PENYAKIT DARI
DALAM DAN LUAR JARINGAN TANAMAN

MIXTAN® 600SC memiliki keunggulan:

- Dual bahan aktif, berbeda cara kerja; protektif dan sistemik
- **Dimetamorph** bekerja sistemik anti sporulant, membuat jamur sulit berkembang. Sementara **Chlorotalonil** adalah bahan organik berspektrum sangat luas.
- Mengandalikan penyakit dan mengkokokkan tanaman.
- **Range** pengendalian yang luas, diantaranya untuk tanaman Jagung, Bawang merah, Kubis-kubisan, dan terung-terungan.

MIXTAN® 600SC fungisida combo 2 bahan aktif Chlorotalonil 500 g/l dan Dimetomorph 100 g/l, bekerja sistemik dan protektif berbentuk pekatan berwarna putih yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan penyakit utama kentang, cabai, timun, semangka, dan tomat.

Mixtan adalah merek dagang dari Rotam CropScience Ltd.




MIXTAN® 600SC mengendalikan penyakit-penyakit utama pada cabe, tomat, kentang, semangka, melon, anggur, jeruk, *ornamentals*, tembakau, dan jagung.



Downy Mildew




Downy Mildew



Antracnose



Anthracnose



Black Rot



Late Blight (Pi)

MIXTAN® 600SC diaplikasikan selang 5 hari sejak usia tanaman 40 HST, diselang-seling dengan Fungisida lainnya.

Tanaman	Penyakit	Vol Semprot	Dosis	Waktu Aplikasi
Cabe dan Tomat	Hawar pelelah <i>Rhizoctonia</i>	500-600 L/Ha	0.5-1 gr/L	Pada fase vegetatif tanaman atau sejak awal infeksi, aplikasi dilakukan selang 7 hari
	Antraknosa			
Kentang	Early Blight (Busuk <i>Alternaria Solani</i>)	500-600 L/Ha	0.5-1 gr/L	Sejak umur tanaman 15 hari dan infeksi belum terlihat sebagai perlindungan, dan dianjutkan jika infeksi telah terlihat
	Late Blight (Busuk Lodoh <i>Phytophthora</i>)			
	Bercak Daun (<i>Septoria lycopersicci</i>)			
Semangka, Melon, Anggur, Jeruk, Ornamentals, dan Tembakau	Embun tepung <i>Peronospora</i> (Downy Mildew)	15 L / Pohon	0.5-1 gr/L	Awal infeksi terlihat, aplikasi selang 5 hari
	Bercak Daun (<i>Cercospora sp</i>)			
Jagung	Embun tepung <i>Peronospora</i> (Downy Mildew)	15 L / Pohon	0.5-1 gr/L	Awal infeksi terlihat, dianjurkan pencegahan dengan 2-3 kali penyemprotan semusim

No. Pendaftaran: RI.010202120144998



Perhatian: Bacalah label kemasan produk sebelum menggunakan herbisida ini.
Simpan di tempat kering dan tertutup, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.

PT Rotam Indonesia

Palma One building, 3rd Floor, Unit 302.
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Kuningan - Jakarta Selatan
Telp. 021 52907112 - Fax. 021 52907115
www.rotam.com

