

AFRATRIN

INSETTICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI
Meccanismo d'azione: IRAC 3A

AFRATRIN Registrazione del Ministero della Salute n. 14930 del 27/06/2011

Composizione

LAMBDA-CIALOTRINA pura g. 2,5
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n°

Contenuto netto:
Kg 0,250 - 0,500 - 1 - 5

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

Stabilimenti di produzione:

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Albaugh TKI d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

Jiangsu Rotam Chemisly Co., Ltd.

No. 88 Rotam Road.ETDZ, Kimshan 215301. Jiangsu, Cina

BAC d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto è nocivo per api ed artropodi utili. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Non trattare durante la fioritura. Effettuare lo sfalcio delle infestanti fiorite prima del trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia. sintomatica e di rianimazione.

Avvertenza: Consultare un Centro AntiveleNI.



ATTENZIONE

CARATTERISTICHE

AFRATRIN è un insetticida dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Agisce principalmente per contatto e secondariamente per ingestione; possiede inoltre effetto repellente. AFRATRIN è dotato di rapido potere abbattente e persistente efficacia protettiva.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassita	Dosi d'impiego	Volumi di irrorazione
PESCHE, NETTARINE e PERCOCHE	Afide verde (<i>Myzus Persicae</i>)	0,4-0,8 Kg/ha	800-1200 l/ha
	Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)		
MELO, PERO	Afide verde (<i>Aphis pomi</i>)	40-80 g/hl (0,32-0,80 Kg/ha)	800-1000 l/ha
	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)		
	Psylla del Pero (<i>Cacopsylla piri</i>)		
OLIVO	Tignola (<i>Prays oleae</i>) - interventi nei confronti della generazione antofaga	40-80 g/hl (0,32-0,80 Kg/ha)	800-1000 l/ha
PATATA	Afide verde (<i>Myzus Persicae</i>)	0,4-0,8 Kg/ha	800-1.200 l/ha
	Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)		
TABACCO	Afidi, Mosca bianca	40-60 g/hl (0,28-0,6 Kg/ha)	700-1000 l/ha
	Tripidi, Pulce del Tabacco	60-80 g/hl (0,42-0,8 Kg/ha)	
	Nottue defogliatrici	400-500 g/ha	
FLOREALI e ORNAMENTALI	Afidi, Mosca bianca	40-60 g/hl (0,280-0,6 Kg/ha)	700-1000 l/ha
	Tripidi	100-120 g/hl (0,42-0,8 Kg/ha)	
	Bega del Garofano	80-100 g/hl (0,7-1,2 Kg/ha)	
	Nottue	0,4-0,5 kg/ha	

Adottare le dosi maggiori in caso di forti attacchi.

In tutti i casi effettuare massimo 2 trattamenti all'anno, mantenendo un intervallo di 15 giorni.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, accertarne preventivamente la compatibilità fisica preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare piccole prove di saggio prima del trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 7 giorni prima della raccolta di PESCHE, NETTARINE, PERCOCHE, MELO, PERO; 15 giorni per PATATA; 60 giorni per TABACCO.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO