

PLANTOIL

Olio minerale paraffinico ad azione insetticida Concentrato Emulsionabile

PLANTOIL - Registrazione Ministero della Salute n. 17210 del 12/04/2018

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:	
Olio di paraffina (CAS n° 8042-47-5)	g. 94,0 (= 790 g/l)
(al 98% di insulfonylità)	
Coformulanti q.b. a	g. 100

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

DISTRIBUITO DA: **Jebagro GmbH**

Hanseatic Trade Center - Kehrwieler 11 - 20457 Amburgo (Germania)

Tel +49 (0) 40 / 30 14 01

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: ---

REAZIONE: P301+P310+P331 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito.

CONSERVAZIONE: P405 Conservare sotto chiave.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:

- 5 metri per agrumi e banana;
- 10 metri per pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di 5 metri.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro AntiveleNI.

partita n

Contenuto:

1-5-10-20-25-60 L



PERICOLO

CARATTERISTICHE

PLANTOIL è un prodotto ad alta concentrazione di olio paraffinico. PLANTOIL ha un alto potere insetticida per il controllo di tutti i tipi di cocciniglie e acari. PLANTOIL è anche efficace contro la fumaggine causata da attacchi di cocciniglie. PLANTOIL è indicato per il controllo delle cocciniglie e degli acari.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

AGRUMI (arancio, limone, mandarino, limetta, pompelmo), contro acari (*Panonychus citri*, *Eutetranychus banksi*, *Tetranychus urticae*) e cocciniglie (*Aonidiella aurantii*, *Aspidiotus nerii*, *Lepidosaphes spp.*, *Parlatoria pergandii*). Intervenire alla dose di 1-1,5 L/hL, distribuiti con 1000-2000 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 10-30 L. Effettuare il trattamento (1 per anno) prima dell'invasatura.

POMACEE (melo, pero, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone) contro cocciniglia (*Quadraspidiotus perniciosus*). Intervenire alla dose di 0,75-1 L/hL, distribuiti con 500-1500 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 3,75-15 L. Effettuare il trattamento (1 per anno) prima dell'invasatura.

DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio) contro cocciniglia (*Quadraspidiotus perniciosus*, *Pseudaulacaspis pentagona*). Intervenire alla dose di 0,75-1 L/hL, distribuiti con 500-1500 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 3,75-15 L. Effettuare il trattamento (1 per anno) prima dell'invasatura.

OLIVO contro cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*).

Applicare alla dose di 1,5-3 L/hL, distribuiti con 500-1000 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 15 L, intervenendo prima della fioritura o tra l'allegagione e l'inizio indurimento del nocciolo (BBCH 71-75). Effettuare un solo trattamento per anno.

VITE contro cocciniglie (*Parthenolecanium corni*, *Planococcus citri*), trattamenti invernali in pre-fioritura; contro acari (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*), intervenire alla comparsa degli adulti. Applicare alla dose di 1,5-3 L/hL, distribuiti con 500-1000 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 15 L. Effettuare un solo trattamento per anno.

BANANO contro acari (*Tetranychus urticae*), intervenire in primavera alla comparsa degli adulti; contro cocciniglie (*Dysmicoccus grassii*), intervenire alla comparsa dei grappoli floreali; Applicare alla dose di 1,2-2 L/hL, distribuiti con 1500-2500 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 30 L. Effettuare un solo trattamento per anno.

Utilizzare volumi d'acqua adeguati ad assicurare una completa bagnatura della vegetazione trattata.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Agitare bene prima dell'uso. È consigliabile l'utilizzo di un agente anti-schiuma qualora si formi una quantità eccessiva di schiuma nel serbatoio. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con prodotti a base di zolfo, polisolfuri, captano o folpet.

Non applicare il prodotto prima che siano trascorsi almeno 40 giorni dal trattamento con zolfo, polisolfuri, captano o folpet.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta..

FITOTOSSICITÀ: Non effettuare trattamenti in giornate calde e secche.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO