

NI-TEBUZIM 25 SC-LEAFLET-20150612

SIZE:180(W)X150(H)MM

PNIT16M010160612

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se la de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, el manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza a si mismo la composición química del producto tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

FABRICANTE Y FORMULADOR

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY, CO., LTD.
N° 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu, CHINA.
TEL: 0512 - 5771 - 1988, FAX: 0512 - 5771 - 8696

IMPORTADOR: DISTRIBUIDOR:

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DEL REGISTRO
Nicaragua	ROTA-10N-2014	14/05/2015

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO

TEBUZIM® 25 SC

FUNGICIDA - TRIAZOLE, BENZIMIDAZOL
TEBUCONAZOLE, CARBENDAZIM

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.08 g/ml a 20°C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**



USO AGRONÓMICO

TEBUZIM @ 25 SC es un fungicida formulado con base en tebuconazole y carbendazim, fungicida sistémico, curativo del grupo de los triazoles y benzimidazoles. Actúa con dos mecanismos diferentes: primero inhibiendo la síntesis del ergosterol y segundo inhibiendo la proteína tubulina que es componente vital de las células del hongo e indispensable para la división celular. Actúan sobre una amplia gama de hongos fitopatógenos. Como fungicida sistémico de doble acción, traslaminar y por vía xilema no actúa solamente sobre las partes de los cultivos que reciben la aplicación del producto

EQUIPO DE APLICACIÓN

TEBUZIM @ 25 SC puede ser aplicado con equipo de aspersión terrestre y equipo manual de espalda, utilizando boquillas de cono hueco, indicadas para fungicidas que produzcan gotas finas y una adecuada cobertura. El personal que manipule este producto, deberá utilizar el equipo de protección personal: botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador. Antes de cargar el equipo, cerciorarse que el mismo este en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes de caldos y debidamente calibrado. Este producto no afecta los equipos de aplicación.



PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Se recomienda hacer una premezcla con la dosis a utilizar, luego llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de agitación a funcionar, adicione la cantidad requerida de la premezcla preparada del producto y termine de llenar el tanque con agua limpia. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use la ropa de protección completa. El equipo y los utensilios utilizados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo.

RECOMENDACIONES DE USO: USOS APROBADOS PARA NICARAGUA

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS	INTERVALO DE APLICACIÓN	INTERVALO DE APLICACIÓN
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Añublo del arroz (<i>Rhizoctonia solani</i>) Complejo manchado de grano (<i>Cercospora</i> sp) (<i>Rhynchosporium</i> sp) (<i>Helminthosporium</i> sp) Piricularia del arroz (<i>Pyricularia oryzae</i>)	0,75 - 1,0 L/Ha	Intervalo de un mes.	No aplicar más de 2 veces durante el ciclo de cultivo.

INTERVALO ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 25 Días

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Período de reingreso después de la aplicación 12 horas después de aplicado. En caso necesario de hacerlo antes, deberá usarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos en la dosis y forma de uso aquí indicado.

COMPATIBILIDAD

Utilizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, **TEBUZIM @ 25 SC** es compatible y no causa fitotoxicidad en los cultivos para los cuales fue desarrollado, en todas sus fases de desarrollo. Se puede aplicar en mezcla con otros productos agroquímicos de uso común en agricultura, sin embargo antes de realizar una mezcla por primera vez se recomienda realizar una prueba.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

1. **TEBUZIM@ 25 SC** no se debe transportar ni almacenar junto con productos alimenticios, forrajes ni medicinas, tanto de uso humano como animal.
2. No se debe comer, beber ni fumar durante la aplicación.
3. Lavarse con abundante agua y jabón después de manipular el producto, especialmente antes de comer, beber o fumar.
4. El personal que manipule **TEBUZIM @ 25 SC** debe usar lentes, guantes y máscara.
5. Evitar el contacto con la piel y una prolongada exposición, al aplicar el producto.
6. Antes de usarlos para aplicar otros pesticidas, lavar bien los equipos con agua y detergente.
7. Evite el derrame del producto. Si se derrama recoger con algún material absorbente como aserrín y colocar en un recipiente cerrado.
8. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación. Luego destrúyalo.
9. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO COMER, NI BEBER, NI FUMAR DURANTE SU UTILIZACIÓN
USE INDUMENTARIA PROTECTORA ADECUADA
BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA**



**TÓXICO POR INHALACIÓN, POR INGESTIÓN Y EN CONTACTO CON LA PIEL
IRRITA LOS OJOS, LA PIEL, EVITASE EL CONTACTO, EN CASO DE CONTACTO
CON LA PIEL, LÁVESE ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y JABÓN. POSIBLE
RIESGO DURANTE EL EMBARAZO DE EFECTOS ADVERSOS PARA EL FETO**

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Algunos síntomas por contacto directo irritación de ojos y piel. Por ingestión puede causar náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. El alcohol propilenglicol presente en la formulación es neurotóxico, depresor del sistema nervioso central.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No induzca el vómito. Obtenga atención médica inmediata.
POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar bien aireado y manténgalo en reposo. Cobijelo si siente frío. En casos graves use respiración artificial.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua durante 15 minutos.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Retire las prendas de vestir y realice baño con agua y jabón.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, ACÚDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y
MUÉSTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE.**

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO

No tiene antídoto específico. Trate sintomáticamente.

En caso de ingestión realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario, hasta que el agua salga sin olor al tóxico, luego administrar carbón activado a dosis de 1g/kg de peso en adultos y 0.5 g/kg de peso en niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existe diarrea).

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIONES

PAÍS

Nicaragua

INSTITUCIÓN

Centro de Prevención y
Control de Sustancias Tóxicas

TELÉFONO

2289-4700 Ext: 1294
8755-0983

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.
TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE CAUSAR EFECTOS
NEGATIVOS A LARGO PLAZO EN EL MEDIO ACUÁTICO.**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS, ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO
O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES

En el caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y para productos sólidos recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor. Prohibido disponer los remanentes o empaques de **TEBUZIM @ 25 SC** en vertederos, botaderos y/o relleno sanitario autorizados o ilegales. En Nicaragua estos sitios son para desechos sólidos domiciliarios no peligrosos.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**LOS ENVASES VACÍOS DEBEN LAVARSE TRES VECES;
EL AGUA DEL LAVADO DEBERÁ AGREGARSE A LA MEZCLA.**

NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DRENAJE.

**ELIMÍNESE LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO Y SUS RECIPIENTES CON TODAS
LAS PRECAUCIONES POSIBLES.**

ELIMÍNESE EL PRODUCTO Y SU RECIPIENTE COMO PRODUCTO PELIGROSO.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

