

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O  
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

LER O RÓTULO ANTES DE UTILIZAÇÃO.

**Titular da Autorização de Venda:**

Albaugh TKI d.o.o.  
Grajski trg 21, 2327 Rače, Eslovenia.

**LOTE E DATA DE FABRICO:**  
CONSULTE A EMBALAGEM



Aconselhamento sobre emergências  
médicas, incêndios e grandes derrames:  
+44 (0) 1235 239 670.  
24 horas por dia. Todas as línguas da UE.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em  
sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado;  
as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

**ATENÇÃO**



# SAVVY®

**HERBICIDA**

**GRUPO 2B HERBICIDA**

**Grânulos dispersíveis em água (WG) contendo  
200 g/kg ou 20% (p/p) de metsulfurão-metilo**

**Herbicida de pós-emergência** para o controlo de infestantes de folha larga em  
Cereais de Inverno (Trigo, Cevada, Centeio e Triticale) e de Primavera (Cevada).

Autorização de venda n.º 0269 concedida pela DGAV

Conteúdo: **100gr**

® TM trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

**ALBAUGH®**  
your alternative

**GRUPO 2B HERBICIDA**

O SAVVY é um herbicida de pós-emergência, para aplicação foliar, sistêmico e residual. É composto pela substância ativa metsulfurão-metilo pertencente à família química das sulfonilureias. Possui absorção foliar e radicular. Translocação rápida para os tecidos meristemáticos. O seu modo de ação caracteriza-se pela inibição da biossíntese dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina (inibindo a atividade da enzima acetolactato sintase, ALS) - grupo B do HRAC.

**DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**

Utilizado contra infestantes dicotiledóneas.

**Trigo mole de inverno, trigo duro de inverno, cevada de inverno, centeio, triticale e cevada de inverno:** Aplicar 30 g/ha. Realizar uma aplicação desde o início ao fim do alongamento do colmo (BBCH30 a BBCH 39). Utilizar contra infestantes dicotiledóneas pouco desenvolvidas e em crescimento ativo.

Intervalo de segurança coberto pela época de aplicação.

**Criptomeira:** Aplicar 15-30 g/ha.

Aplicar 15 a 30 mg de produto em 10 m<sup>2</sup> (*Hedychium gardnerianum* e *Phytolacca americana*).

Aplicar 15 a 20 mg de produto em 10 m<sup>2</sup> (*Acacia melanoxylon*)

Pulverização dirigida às infestantes pouco desenvolvidas e em crescimento ativo.

**APLICAÇÃO DE PRIMAVERA**

**Trigo mole de inverno, trigo duro de inverno, cevada de inverno, centeio, triticale e cevada de inverno:** Aplicar 25 g/ha.

**Cevada de primavera:** Aplicar 20 g/ha.

Realizar uma aplicação desde o início ao fim do afilhamento da cultura (BBCH 20 a BBCH 29). Utilizar contra infestantes dicotiledóneas pouco desenvolvidas e em crescimento ativo.

Intervalo de segurança coberto pela época de aplicação. Utilizar apenas em aplicação de Primavera.

**INFESTANTES SUSCEPTIVEIS**

Falsa-salsa (*Aphanes arvensis*), amio-maior (*Ammi majus*), margação (*Anthemis arvensis*), erva-estrelada (*Arabidopsis thaliana*), fidalguinhos (*Centaurea cyanus*), bolsa-de-pastor (*Capsella bursa-pastoris*), orelha-de-rato (*Cerastium glomeratum*), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), cicuta-menor (*Aethusa cynapium*), gerânio (*Geranium sp.*), serralha-áspera (*Sonchus asper*), lâmio-roxo (*Lamium purpureum*), margaças (*Matricaria sp.*), morrião (*Anagallis arvensis*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), miosótis (*Myosotis arvensis*), violetas (*Viola sp.*), saramago

(*Raphanus raphanistrum*), patalôco (*Ranunculus arvensis*), corriola-bastarda (*Polygonum convolvulus*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), agulha-de-pastor (*Scandix pecten-veneris*), tasneirinha (*Senecio vulgaris*), morugem branca (*Stellaria media*), veronica-da-pérsia (*Veronica persica*), cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*).

### **PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS**

- A aplicação repetida nas mesmas áreas de produtos à base de substâncias activas da mesma família química ou apresentando o mesmo modo de acção pode conduzir ao surgimento de espécies resistentes. Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se alternar ou associar herbicidas contendo substâncias activas de famílias diferentes ou com diferentes modos de acção, tanto no decorrer de uma campanha como em rotação cultural.
- Tratar culturas em bom estado vegetativo. Não aplicar SAVVY em searas que apresentem sinais de stress decorrente de escassez ou excesso de água, baixas temperaturas, ataque de doenças ou pragas, carência mineral ou qualquer outro factor limitante do normal desenvolvimento.
- Não tratar cereais semeados conjuntamente com outra cultura.
- Certas culturas limítrofes (beterraba, ervilheira, girassol, colza, cenoura, alface, tomateiro, entre outras culturas dicotiledóneas) podem mostrar-se particularmente sensíveis a este produto, sendo recomendável a tomada de

medidas que previnam o risco de arrastamento.

- Não aplicar em dias com vento a fim de evitar o contacto do herbicida com culturas sensíveis.
- Aplicar sobre vegetação seca.

### **SEGURANÇA PARA CULTURAS SEGUINTE**

Na sequência de uma aplicação com SAVVY na dose recomendada, é possível semear as culturas seguintes, no âmbito de um programa de rotação:

- No Outono seguinte à colheita do cereal tratado - cereais, colza, ervilha de inverno, gramíneas forrageiras, fava miúda, cobertura de pousio.
- Na Primavera seguinte à colheita do cereal - beterraba, endívia, feijão, linho, milho, ervilha proteagínosa, batateira, soja, sorgo, girassol.

Para a sementeira de culturas não mencionadas, observar um período de espera de 16 meses após a aplicação de SAVVY.

Respeitar um prazo de 120 dias entre a interrupção da cultura e nova sementeira ou plantação, excepto para as culturas para as quais o metsulfurão-metilo está autorizado.

### **MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA**

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o

volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

### **MODO DE APLICAÇÃO**

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a  $2 \text{ kg/cm}^2$  e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Volume de calda a utilizar: 100 a 400 L/ha.

### **LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO**

Para evitar danos subsequentes em culturas não cerealíferas, o equipamento de pulverização deverá ser cuidadosamente limpo imediatamente após a aplicação do produto, usando um líquido de limpeza para uso com sulfonilureias (uma solução de 1 litro de amoníaco do utilizado normalmente em casa por cada 100 litros de água), e de acordo com o seguinte procedimento:

1. Imediatamente após o tratamento, esvaziar completamente o depósito. Lavar com água limpa qualquer contaminação exterior do pulverizador.
2. Enxaguar o interior do depósito com água limpa e esvaziar pelo menos um décimo do volume do tanque através da barra e mangueiras. Esvaziar o tanque completamente.
3. Encher metade do depósito com água limpa e adicionar a quantidade adequada da solução de limpeza indicada para utilização com sulfonilureias. Agitar e de seguida enxaguar a barra e mangueiras com a solução. Encher completamente o depósito com água e manter a agitação durante 15 minutos. Fazer circular a solução de limpeza mais uma vez através da barra e das mangueiras e esvaziar completamente o tanque (se não for possível esvaziar o tanque totalmente, repetir a etapa 3).
4. Remover os bicos e os filtros e colocá-los num recipiente contendo o líquido de limpeza para uso com sulfonilureias na mesma concentração que a utilizada na limpeza do pulverizador.
5. Enxaguar novamente o depósito com água limpa e esvaziar pelo menos um décimo do volume do tanque através da barra e das mangueiras. Esvaziar o tanque completamente.

## COMPATIBILIDADES

Apenas poderão ser utilizadas as misturas autorizadas. Todas as misturas devem ser previamente testadas.

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- P261 - Evitar respirar a nuvem de pulverização.
- P262 - Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- P391 - Recolher o produto derramado.
- P501a - Eliminar o conteúdo embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.
- SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- SPe3PT2 - Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas não cultivadas ou utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 75 % de redução no arrastamento da

### ATENÇÃO



calda pulverizada durante a aplicação do produto.

- SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.
- SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

**ARMAZENAMENTO:** Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV),  
Telef.: 800 250 250**

### NOTA:

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela acção de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O  
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

LER O RÓTULO ANTES DE UTILIZAÇÃO.

**Titular da Autorização de Venda:**

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, 2327 Rače, Eslovenia.

**LOTE E DATA DE FABRICO:**  
CONSULTE A EMBALAGEM



Aconselhamento sobre emergências  
médicas, incêndios e grandes derrames:  
+44 (0) 1235 239 670.  
24 horas por dia. Todas as línguas da UE.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



ATENÇÃO



# SAVVY®

HERBICIDA

GRUPO 2B HERBICIDA

**Grânulos dispersíveis em água (WG) contendo  
200 g/kg ou 20% (p/p) de metsulfurão-metilo**

Herbicida de pós-emergência para o controlo de infestantes de folha larga em Cereais de Inverno (Trigo, Cevada, Centeio e Triticale) e de Primavera (Cevada).

Autorização de venda n.º 0269 concedida pela DGAV

Conteúdo: **100gr**

TKI-PT\_SAVVY\_100G\_BS\_26-10-23

® TM trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company





# SAVVY®

**HERBICIDA**

**GRUPO 2B HERBICIDA**

**Grânulos dispersíveis em água (WG) contendo  
200 g/kg ou 20% (p/p) de metsulfurão-metilo**

**Herbicida de pós-emergência** para o controlo de infestantes de folha larga em Cereais de Inverno (Trigo, Cevada, Centeio e Triticale) e de Primavera (Cevada).

**Conteúdo: Caixa de 10x100gr**

Autorização de venda n.º 0269 concedida pela DGAV

® TM trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

 **ALBAUGH®**  
your alternative

**ATENÇÃO**



**PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**

**H410:** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

**P261:** Evitar respirar a nuvem de pulverização.

**P262:** Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

**P270:** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

**P391:** Recolher o produto derramado.

**P501a:** Eliminar o conteúdo embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

**EUH210:** Ficha de segurança fornecida a pedido.

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO  
PROFISSIONAL.**

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE  
HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS  
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.**

**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Aconselhamento sobre emergências médicas, incêndios e grandes derrames: +44 (0) 1235 239 670.  
24 horas por dia. Todas as línguas da UE.

**Titular da Autorização de Venda:**  
Albaugh TKI d.o.o.  
Grajski trg 21, 2327 Rače, Eslovenia.

**LOTE E DATA DE FABRICO:**  
CONSULTE A EMBALAGEM



TKI-PT\_SAVVY\_10x100G\_26-10-23