

B RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo.
Instrucciones de uso: ALTITUD es un fungicida sistémico, para el control de un amplio rango de enfermedades fungosas. Actúa inhibiendo la respiración mitocondrial de los hongos a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre el mitocondrio b y el citocromo c.

Cultivo	Enfermedad		Dosis
	Nombre Común	Nombre Científico	
Trigo (<i>Triticum aestivum</i>)	Mancha parda	<i>Drechslera tritici repentis</i>	0,3 L/ha
Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)	Septoriosis	<i>Septoria tritici</i>	0,5 L/ha

Desde encañazon hasta 10 -20 dias despues de floración

Soja (<i>Glycine max</i>)	Mancha ocular	<i>Cercospora sojina</i>	0,35 L/ha
	Mancha purpura	<i>Cercospora Kikuchi</i>	

Aplicar a la aparición de síntomas o cuando el cultivo está en floración y las primeras vainas tienen 2 cm de longitud (R4) hasta el 50 % del llenado de vainas (R5,4)

Arándanos (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	Antracnosis de los arándanos	<i>Colletotrichum acutatum</i>	500-750 cc/ha
Vid (<i>Vitis vinífera</i>)	Antracnosis	<i>Elsinoe ampelina</i>	80 cc/100L
	Excoriosis	<i>Phoma reniformis</i>	
	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	
	Oidio	<i>Uncinula necator</i>	

Aplicar en forma preventiva.- Para mildiu por alarma o cada 10 a 12 días. En alta presión de enfermedad, reducir el intervalo entre aplicaciones a 8 días. No aplicar más de 3 veces seguidas.

Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	30 - 50 cc/100L
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)			160-320 cc/ha

Aplicar a la aparición de síntomas y no más de 3 veces por ciclo de cultivo. Usar las dosis menores para acción preventiva y las mayores para curativa.

Modo de preparación y técnica de aplicación.

Llenar el tanque del equipo de aplicación con agua hasta la mitad de su capacidad.- Con el sistema de agitación en funcionamiento verter lentamente en el tanque la cantidad requerida de este producto. Completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria manteniendo el agitador o retorno en funcionamiento hasta lograr un caldo homogéneo.

Prohibido llenar con agua las maquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

El producto preparado debe ser utilizado antes de las 24 horas. Si queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el agitador o retorno durante algunos minutos, antes de recomenzar la aplicación.

Puede aplicarse con cualquier equipo de pulverización o atomización, de alto o bajo volumen, terrestre ó aéreo siempre y cuando se asegure una cobertura adecuada del cultivo a tratar.

Las dosis por 100 L especificadas en esta etiqueta, se refieren a dosis del producto para aplicaciones en alto volumen.

Cuando se empleen equipos aplicadores de bajo volumen se deberá calibrar el equipo de aplicación para mantener la misma cantidad de producto comercial por unidad de superficie.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 m de cualquier zona urbana sub urbana, centro poblado y centro educativo. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y centro educativo.

Prohibido aplicar en forma aérea en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 m de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes de agua superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

Prohibido aplicar con maquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 m de cualquier corriente natural de agua.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones .- Las aplicaciones deben hacerse en forma sucesiva y no más de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo

Compatibilidad y Fitotoxicidad.

Cuando no se conozca la compatibilidad o fitocompatibilidad con otros fitosanitarios, antes de la aplicación efectuar una prueba en pequeña escala con los productos que se combinará para conocer la compatibilidad y la fito compatibilidad en especial al mezclar este producto con polvos mojables.- Incompatible con productos alcalinos.-En tomate no aplicar en invernáculo con altas temperaturas.-

Tiempo de espera Trigo: 30 días.- Tomate: 3 días.- Papa: 7 días.- Soja: 20 días.- Vid 7 días.

Tiempo de reingreso al cultivo. - No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado.

Otras informaciones necesarias respecto al uso:

Para prevenir la generación de resistencia combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción.- Limitar el número de aplicaciones a no más de 2 a 3 aplicaciones por temporada.-

**PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA**

“USO AGRICOLA”

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.