

B RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

Instrucciones de uso: COMBI PRO es un fungicida e insecticida mezcla sistémico, con prolongado efecto residual, para el control de enfermedades a hongos que afectan la semilla e insectos de suelo. Evita resiembras producidas por aparición de estas plagas. Aumenta el stand y vigor de las plántulas. No afecta el poder germinativo de la semilla.

Modo de acción: Imidacloprid Actúa como agonista sobre el receptor nicotínico de la acetilcolina del sistema nervioso central, primero estimulando las membranas postsinápticas y después paralizando la conducción nerviosa. Bloquea los ganglios en los receptores postsinápticos de los insectos de forma similar a la nicotina. No inhibe la colinesterasa.. Tebuconazol actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol.

Cultivo	Enfermedad/Plaga	
	Nombre Común	Nombre Científico
Trigo	PLAGAS Isoca	<i>Diloboderus abderus</i> , <i>Dyscinetus gagates</i>
	ENFERMEDADES Carbón cubierto Carbón hediondo Carbón volador	<i>Ustilago hordei</i> <i>Tilletia caries</i> <i>Ustilago nuda</i>

DOSIS: 200 cc/100 kg de semilla

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Se aplica a la semilla previo a la siembra.

Compatibilidad: Es compatible con fungicidas curasemillas en general. Si la compatibilidad es desconocida, o si se tienen dudas sobre la mezcla, probar en una pequeña escala, tanto para compatibilidad física como para fitocompatibilidad. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto acompañante; si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla. **Fitotoxicidad:** No es fitotóxico para los cultivos y dosis recomendados.

Tiempo de espera: No corresponde por el modo de uso

Tiempo de reingreso al cultivo: No corresponde por el modo de uso

Cualquier información que complete el conocimiento del modelo de uso

No debe usarse para tratar granos destinados a alimentación humana o animal ni para la industrialización. El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada

Modo de preparación.

La aplicación se realiza con tratadoras mecánicas en plantas de tratamientos de semilla o con maquinas manuales a campo (tambor rotativo), o con una mezcladora de hormigón tratando de evitar la aplicación "a pala", que no logra una buena distribución del producto. Se sugiere diluir la dosis recomendada en un volumen de agua de 1,0 a 1,5 litros por cada 100 kg de semilla

C PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: **Clase III (tres) (IPCS/OMS, 2006)**

Producto ligeramente peligroso.

Antídotos: No tiene antídoto.

D LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA
--

<u>“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.</u>
--

<u>“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722”.</u>

<u>“CONCURREN AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.</u>
--

<u>“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.</u>

<u>“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.</u>

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

<u>“USO AGRICOLA”</u>

<u>“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.</u>
--

<u>“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.”</u>
--